



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>

NYPL RESEARCH LIBRARIES



3433 06633422 2



*J. Boyer*

---

# Histoire des Mathématiques

*Bibliothèque générale des Sciences*

201-2-15  
35



809

174570




1851



1. 511.  
5 fig. (portraits, fac-similes de  
manuscripts)







1851



St. Str.

35 fig. (portraits, fac-similes de  
manuscrits)

74370



1851



1. 511.

5 fig. (portraits, fac-similes de  
manuscripts)



1851



51. 521.  
35 fig. (portraits, fac. similes, de  
manuscripts)

1. 1. 1. 1. 1.





BIBLIOTHÈQUE  
DE LA REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

---

HISTOIRE  
DES  
MATHÉMATIQUES







CONSTRUCTION et Usage des INSTRUMENS de  
MATHÉMATIQUE.

(Estampe du xvii<sup>e</sup> siècle.)

HISTOIRE  
DES  
MATHÉMATIQUES

PAR  
JACQUES BOYER

---

*Illustrée de fac-similés de manuscrits et de portraits.*



PARIS  
GEORGES CARRÉ ET C. NAUD, ÉDITEURS  
3, RUE RACINE, 3  
—  
1900  
Tous droits réservés.



## PRÉFACE

---

Dans ce livre, nous nous sommes proposé de suivre l'évolution des mathématiques chez les divers peuples, depuis l'origine de la civilisation jusqu'à la fin du xix<sup>e</sup> siècle. C'est dire assez, vu l'ampleur du sujet traité, combien de recherches intéressantes mais de second ordre toutefois, nous avons été obligé d'omettre. Aussi nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé une matière à laquelle Montucla au xviii<sup>e</sup> siècle, et Moritz Cantor, tout près de nous, ont consacré de gros volumes. Notre but est d'ailleurs différent : ces auteurs s'adressent à ceux qui savent, nous demandons simplement que ceux qui apprennent nous lisent. Nous avons donc banni de ces pages tout luxe d'érudition, nous n'avons donné de renseignements biographiques que pour les principaux mathématiciens, nous bornant pour ceux de moindre importance à faire figurer, dans une table placée à la fin du volume, leur date de naissance et de mort. Surtout, nous nous sommes efforcés de rester très *élémentaire*, en évi-

tant, autant que possible, de surcharger notre récit de formules ou d'équations.

Malgré cela, on trouvera dans notre histoire certaines nouveautés. On rencontrera des noms que des ouvrages beaucoup plus complets n'ont même pas cités, et, on constatera l'omission de plusieurs autres dont la réputation surfaite par leurs contemporains peut être appréciée plus justement par la postérité.

Un mot encore sur l'illustration. Nous l'avons voulu exclusivement *documentaire*. Les fac-similés de manuscrits, d'ouvrages anciens ou de portraits sont des reproductions *photographiques* des originaux existant dans des collections publiques ou privées. Les historiens de la science s'inquiètent souvent très peu de ces détails qui, à notre avis, ont leur importance. En particulier, pour les portraits, ils adoptent la première gravure venue, sans s'enquérir de son authenticité. Nous avons jugé utile de procéder différemment : tous ceux qui figurent dans notre volume ont été soigneusement contrôlés, et nous avons toujours indiqué leurs sources.

Enfin, c'est pour nous un agréable devoir de remercier tous ceux qui nous ont aidé : M. Rebière, examinateur à l'École de Saint-Cyr, qui a mis libéralement à notre disposition les ressources de sa bibliothèque si riche en livres d'histoire scientifique ; M. Gino Loria, professeur de l'Université de Gênes, M. Dikstein, de Varsovie ; M. Paul Tannery, si compétent en ce qui touche la période hellène et M. Enestrom, l'aimable directeur de la *Bibliotheca Mathematica* de Stockholm. Ces savants nous ont

communiqué de précieux documents qui ont facilité singulièrement notre tâche. De son côté, M. le commandant Brocard, de Bar-le-Duc, dont l'érudition n'a d'égale que la complaisance, a bien voulu nous aider dans la correction des épreuves. Qu'il nous soit permis d'assurer ces divers mathématiciens de notre profonde gratitude.

Paris, le 2 août 1899.



# HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES

---

## CHAPITRE PREMIER

### **Les Mathématiques chez les anciens peuples de l'Orient.**

Indiquer d'une manière précise l'origine des mathématiques, serait téméraire. Si l'on veut entrer dans cette voie, on se trouve réduit à formuler des conjectures plus ou moins plausibles, à édifier des théories douteuses que des textes postérieurs permettent toujours de justifier en les tourmentant savamment. Nous laisserons donc érudits ou philosophes dissenter sur ce sujet, et dans cette histoire nous ne remonterons pas au delà des premiers documents authentiques.

Autrefois, la Chine passait pour le berceau des mathématiques comme des autres sciences ; mais, d'après les récents travaux des sinologues, on peut avancer avec certitude que la géométrie et l'arithmétique des Chinois de l'antiquité étaient bien rudimentaires. Ils connaissaient peut-être, depuis une époque fort reculée, les éléments de l'arpentage, et ils paraissent même avoir découvert, indépendamment des Grecs, les propriétés du triangle rectangle quand les côtés sont entre eux dans un rapport simple comme 3, 4 et 5. Pour calculer, ils représentaient les nombres au moyen de cailloux arrangés par séries, sorte d'abaque embryonnaire. T. " fut leur science pendant plus de deux mille

l'arrivée des Européens, et surtout des astronomes arabes de Mérageh (xin<sup>e</sup> siècle), pour que la mécanique, la navigation, la gnomonique, fissent quelque progrès dans le Céleste-Empire.

Les Hindous semblent également, comme nous le verrons plus loin, avoir usurpé leur réputation d'inventeurs de nos chiffres. Quant aux monuments laissés par les Chaldéens, les Phéniciens et les Babyloniens, ils sont assez rares, mais ils suffisent à prouver que le niveau mathématique de ces peuples était peu élevé.

Voici, d'après les orientalistes contemporains, la notation des nombres, en écriture cunéiforme :

$$Y = 1 \quad < = 10 \quad Y > = 100$$

En outre, les deux principes de représentation des nombres (additif et multiplicatif) apparaissent pour la première fois dans leur système. Les nombres plus petits que 100 sont exprimés par les symboles d'addition. Ainsi ils écrivaient :

$$YY = 2 \quad YYY = 3 \quad Y_Y Y_Y = 5$$

$$<< Y = 21 \quad <<< = 30$$

Pour les centaines, ils indiquaient par un coefficient plus petit, placé à gauche de 100, combien de fois ce dernier était multiplié.

$$< Y > = 1000 \quad << Y > = 2000$$

D'autre part, les Babyloniens ne savaient pas écrire des nombres supérieurs à 1.000.000; du moins on n'en a pas encore rencontré dans les inscriptions déchiffrées jusqu'ici. Les plus anciens documents ma-

thématiques qui les concernent, sont *deux tablettes* trouvées récemment<sup>1</sup>.

L'une d'elles, datant d'une époque comprise entre 2300 et 1600 ans avant notre ère, contient une table des carrés des nombres entiers jusqu'à  $60^2$ . Les nombres 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 sont indiqués respectivement comme étant les carrés des sept premiers nombres. Il semble donc qu'ils connaissent le système de *numération décimale*. Mais les carrés suivants s'y lisent ainsi :  $1.4 = 8^2$ ;  $1.21 = 9^2$ ; etc., ce qui reste inintelligible, à moins qu'on ne suppose les chiffres écrits dans la notation *sexagésimale*, où  $1.4 = 60 + 4 = 8^2$ ;  $1.21 = 60 + 21 = 9^2$ , etc.

La seconde tablette se rapporte à l'Astronomie. Elle donne la grandeur de la portion illuminée du disque lunaire pour chaque jour, de la nouvelle à la pleine lune, le disque entier étant supposé partagé en 240 divisions. Les parties éclairées pendant les cinq premiers jours y sont représentées par la progression géométrique 5, 10, 20, 40, 1.20 (80); puis les termes suivants d'une progression arithmétique : 1.20, 1.36, 1.52, 2.8, 2.24, 2.40, 2.56, 3.12, 3.28, 3.44, 4, fournissent les illuminations du cinquième au quinzième jour.

Ces découvertes archéologiques montrent que les Babyloniens possédaient certaines notions arithmétiques, en particulier le principe de position qui nous sert actuellement, car mettre 1.4 pour 64 c'est supposer que 1 représente 60, l'unité de second ordre, en vertu de sa position par rapport à 4, — fait digne de remarque, cette règle ayant été seulement introduite dans l'arithmétique moderne vers le v<sup>e</sup> ou vi<sup>e</sup> siècle de notre ère. Maintenant, comment arrivèrent-ils à la conception du système sexagésimal? Mystère. Si le choix de la base 10 s'explique parce qu'il correspond au nombre de doigts, celui du nombre 60 s'interprète

(1) F. CAJORI. *A history of mathematics*. New-York, 1895.

moins facilement. La question n'est pas résolue, même après les travaux des orientalistes allemands, que nous ne suivrons pas sur ce terrain où tant d'hypothèses sont permises.

Quant aux connaissances géométriques des Babylo-niens, elles se réduisaient à quelques constatations expérimentales. Les triangles et les quadrilatères leur étaient familiers, mais ils en ignoraient probablement les propriétés. Ils savaient diviser la circonférence en différentes parties, au moyen de ses rayons. Comme les Hébreux, ils prenaient pour valeur de  $\pi$  le nombre 3.

Leur Astronomie était plus savante, ainsi que deux calendriers déchiffrés il y a quelques années l'indiquent. Somme toute, en se plaçant à notre point de vue spécial, ces peuples possédaient un médiocre degré de culture, bien inférieur à celui des Égyptiens, desquels datent véritablement les Mathématiques.

Le *papyrus* de la collection Rhind, conservé au British Museum de Londres, et publié par M. Eisen-lohr<sup>(1)</sup>, appuie cette thèse. Ce manuscrit, écrit 1000 ans environ avant Jésus-Christ, par un prêtre nommé AHMES, serait la copie d'un original plus ancien remontant à 3400 ans avant notre ère. Il renferme une collection de problèmes arithmétiques et géométriques avec réponses mais sans indication du procédé ayant permis de les obtenir. La première partie traite de la réduction de certaines fractions à une somme d'autres fractions ayant pour numérateur l'unité. Dans la seconde, se trouvent quelques exemples de division et de soustraction. Puis viennent divers problèmes se ramenant à la résolution d'une équation numérique. En voici un exemple, pour montrer leur genre. Trouver un nombre tel que lui-même augmenté de son septième soit égal à 19. La réponse donnée :  $16 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}$  est exacte.

---

(1) EISENLOHR. *Ein mathematisches Handbuch der alten Egypter*. Leipzig, 1877, 1 vol. in-4° et atlas.

Enfin plusieurs questions d'Algèbre élémentaire terminent l'opuscule. Parmi celles-ci une ou deux se rattachent aux progressions arithmétiques, et elles semblent indiquer qu'ils savaient les sommer.

Un autre *papyrus*, découvert dans la nécropole d'*Akhmim* (ancienne Panopolis) et qui est aujourd'hui au Musée de Gizeh, nous renseigne sur les artifices de calcul usités. C'est le plus ancien document, actuellement connu, sur l'enseignement pratique de l'Arithmétique chez les Grecs. D'après M. Baillet<sup>1</sup> il est antérieur à l'invasion arabe, et son auteur paraît être un chrétien vivant probablement au VIII<sup>e</sup> siècle; mais on peut le considérer comme représentant la science égyptienne à une époque bien antérieure. Il roule sur la numération fractionnelle. On y considère toujours les fractions comme des parties aliquotes de l'unité, et à part  $\frac{2}{3}$  aucune expression fractionnaire dont les numérateurs diffèrent de l'unité n'y figure. Tout cela est donc absolument conforme à ce que nous savons des principes de la numération des Égyptiens par le papyrus d'Ahmes<sup>2</sup>. D'autre part, la fraction est figurée par le seul chiffre que nous désignons aujourd'hui sous le nom de dénominateur, et on la note par la sigle du nombre entier correspondant légèrement modifiée, par exemple au moyen d'un double accent placé à droite. Les nombres ordinaux sont symbolisés par les mêmes caractères que les fractions, le nombre fractionnaire est caractérisé d'une manière analogue, en écrivant à la suite, sans aucun signe, les quantités qui s'additionnent, et les opérations à effectuer sont indiquées par les mots consacrés écrits parfois en abrégé.

(1) *Mémoires publiés par les membres de la Mission archéologique française au Caire*, t. IX. J. BAILLET. *Le papyrus mathématique d'Akhmim* (texte et traduction). Paris, 1892. Nous devons à l'obligeance de M. Leroux de pouvoir reproduire le fragment ci-joint.

(2) MORITZ CANTOR. *Vorlesungen über Geschichte der Mathematik*, t. I. Leipzig, 1880.

Les premières pages du papyrus d'Akhmim sont occupées par les tables de multiplication des nombres entiers par des fractions, tables destinées à faciliter les calculs. Mais la partie la plus intéressante du manuscrit renferme cinquante problèmes avec leur solution. Ils se rapportent tous aux fractions, et sont rangés par ordre de difficulté. Leur variété est assez grande. Tantôt les données, tantôt les solutions changent, tantôt deux questions identiques sont résolues par des procédés différents. Cependant on ne se trouve pas en présence d'un ouvrage didactique composé par un professeur, certaines fautes semblent prouver que c'est un exercice d'enseignement, quelque chose comme le cahier d'un bon élève. Nous reproduisons ci-contre un fac-similé d'une partie du manuscrit. Voici la traduction du premier problème indiqué dans cette page :

« *Ex. 1.* — Il y avait une citerne ronde : le périmètre supérieur était de 20 coudées, le périmètre inférieur de 12 coudées, la profondeur de  $6 \frac{1}{2}$  coudées.

« *Sol.* — De même 20 et 12 font 32 ; la  $\frac{1}{2}$  de 32 fait 16. De même 16 [multiplié] par 16 font 256. De même 256 par  $6 \frac{1}{2}$  font 1664. De même divisez 1664 en 36, en sorte que [le résultat] est  $46 \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{18}}$  »

D'après ce texte et la figure qui l'accompagne, il s'agit évidemment de chercher la contenance de la citerne. En effet, l'auteur fait la somme des deux périmètres, en prend la moitié et l'élève au carré, puis multiplie le résultat par la profondeur. Il assimile donc le volume du tronc de cône à celui d'un cylindre de même hauteur ayant pour base le cercle de rayon moyen, approximation permise. Mais le carré du périmètre d'une circonférence  $4 \pi^2 R^2$  n'est pas la surface de cette figure  $\pi R^2$ , base du cylindre. Il fallait diviser le résultat obtenu par  $4 \pi$  ou par 12, si l'on s'en tient à la valeur approchée  $\pi = 3$ . Au lieu d'une division par

12 nous sommes en présence d'une division par 36, soit un nombre trois fois trop fort. L'auteur a commis là une erreur flagrante, ou encore il y a un changement d'unité non annoncé.



Fig. 1. — Le papyrus mathématique d'Akhmim.

(Fac-similé de la page 6, d'après l'original conservé au Musée de Gizeh.)

Les Égyptiens furent donc bien les initiateurs des Grecs en Arithmétique. Ces derniers, tout en inventant une numération écrite plus perfectionnée, en simplifiant les procédés de multiplication et de division, conservèrent les méthodes qui avaient d'abord fleuri sur les

rives du Nil. Elles survécurent durant de longs siècles, elles furent même enseignées exclusivement dans les écoles élémentaires jusqu'aux derniers jours de l'empire byzantin.

---

## CHAPITRE II

### Les Écoles Ionienne et Pythagoricienne

La science hellène est facile à suivre dans son évolution. Elle prit naissance sur la terre des Pharaons d'où les philosophes, qui allèrent s'instruire auprès des prêtres égyptiens, en rapportèrent les principes élémentaires. Le courant se propagea ensuite en Sicile et dans le sud de l'Italie, repassa à nouveau la mer Égée pour s'arrêter enfin à Alexandrie qui fut pendant longtemps la lumière du Monde

Le premier qui introduisit la Géométrie en Grèce fut THALÈS, de Milet. Il vivait au VII<sup>e</sup> siècle avant Jésus-Christ. Parcourant l'Égypte, en négociant sagace, il sut y glaner les connaissances scientifiques alors conservées si jalousement dans les temples. Puis, une fois de retour dans sa patrie, après avoir abandonné affaires et charges publiques pour se livrer entièrement aux spéculations philosophiques, aux observations astronomiques et aux Mathématiques, il fonda la célèbre école Ionienne. On lui attribue la découverte de plusieurs théorèmes relatifs aux triangles, et de certaines propriétés du cercle. Mais il est difficile de se prononcer avec certitude, à cause des opinions contradictoires des auteurs anciens. En particulier, la proposition suivante : l'angle inscrit dans un demi-cercle est droit, serait de lui. Il aurait même, au dire de Diogène de Laerte, été si content de l'avoir trouvée, qu'il aurait, sur-le-champ, sacrifié un bœuf aux dieux immortels. D'autre part, Plutarque nous apprend

que Thalès étonna le roi Amasis en calculant la hauteur des Pyramides par la dimension de leur ombre.

À sa mort, le plus savant de ses disciples, ANAXIMANDRE lui succéda à la tête de l'École. Ce fut le premier qui rédigea un *Traité de Mathématiques*. Selon les maigres renseignements qu'on possède sur cet ouvrage, connu simplement par une mention de Suidas, il est à croire qu'il comprenait un cours d'astronomie appliquée et de philosophie. En outre on y trouvait, paraît-il, plusieurs propriétés de la sphère ignorées avant lui.

Ses continuateurs furent ANAXIMÈNE et son élève ANAXAGORAS qui occupa les loisirs de sa captivité<sup>1</sup> en cherchant la *quadrature du cercle*.

Ce fameux problème, basé sur la détermination de la valeur exacte de  $\pi$ , le rapport de la circonférence au diamètre, occupa bien des cerveaux. Les Chinois, les Égyptiens et les Babyloniens connaissaient déjà une valeur approchée de cette quantité, dès le VI<sup>e</sup> siècle au moins avant notre ère, mais la méthode pour arriver à démontrer son incommensurabilité, et par conséquent l'impossibilité de trouver un carré équivalent à un cercle donné, devait être seulement une conquête toute moderne.

Son élève, DÉMOCRITE d'Abdera, écrivit des traités *Sur le contact du cercle et de la sphère*, sur les lignes incommensurables et sur la perspective. Mais aucun ouvrage du disciple d'Anaxagoras n'est parvenu jusqu'à nous. Esprit encyclopédique, internationaliste aux idées les plus larges, il combattait déjà le jingoïsme quand il reprochait aux Grecs leur préjugé nationaliste qui les empêchait de considérer « le monde entier comme leur patrie ».

Vers la même époque florissait un indépendant, CÉNOPIDES, de Chios, mort vers 430 avant Jésus-Christ. Selon

---

(1) Le gouvernement Athénien l'avait, en effet, incarcéré pour avoir tenté des explications rationnelles de phénomènes considérés jusque-là comme dus à l'intervention divine.

Proclus, il aurait résolu les questions suivantes : d'un point pris sur une droite mener une perpendiculaire à une ligne donnée et construire une droite qui fasse avec une autre ligne un angle égal à un angle donné.

Les astronomes Xénophane et Phérécydes ne méritent pas de nous retenir. D'ailleurs, les mathématiciens ioniens, pendant cent ans et plus, n'ont pas contribué à augmenter beaucoup le bagage intellectuel que leur avaient légué les Égyptiens. On a voulu voir dans leurs travaux la conséquence d'un enseignement rationnel, le produit d'une « École ». C'est un mot bien ronflant, pour une si petite chose ! Conservons le terme puisque l'usage l'a consacré, mais apprécions-le à sa juste valeur. Dans l'antiquité comme de nos jours, bon nombre d'établissements officiels étaient tout en surface.

Les progrès réalisés par PYTHAGORE et ses successeurs immédiats furent plus importants. La vie de ce philosophe, né à Samos vers 569 avant Jésus-Christ, n'est qu'un tissu de légendes. On n'est guère mieux renseigné sur l'étendue de ses connaissances mathématiques. Il aurait fait ses premières études sous Phérécydes à Lesbos, et sous Anaximandre à Milet, puis il voyagea en Égypte où il passa de longues années à Thèbes et à Memphis s'initiant aux secrets des prêtres. Il séjourna ensuite en Asie Mineure, revint dans sa ville natale où il donna sans grand succès des leçons et émigra vers 529 afin de s'établir en Sicile. Après avoir abordé à Sybaris et professé quelque temps à Tarente, il fonda enfin à Crotone, dans la maison de Milon, l'école qui devait immortaliser son nom. Là il enthousiasma, toujours au dire de la tradition, non seulement ses contemporains, mais il sut gagner le cœur d'une de ses auditrices la jolie Théano, la fille de son hôte. Malgré la disproportion d'âge elle l'épousa.

Plutôt philosophe, Pythagore ne mérite pas moins de figurer ici, car sa doctrine reposait sur les mathématiques. Ses disciples, selon leurs aptitudes et

le but qu'ils se proposaient, étaient partagés en deux groupes. Les auditeurs ou *Pythagoristes* n'approfondissaient pas les doctrines du Maître. L'enseignement qu'ils recevaient se bornait à la musique — la « médecine de l'âme » comme l'appelait le professeur de Samos, — et à des notions sommaires de calcul. Les seconds, dits « mathématiciens » ou *Pythagoriens*, étaient dans le secret des Dieux. Leurs cours duraient trois ans. C'était




Fig. 2. — Le *pentagone étoilé*,  
signe de ralliement des Pytha-  
goriciens.

une sorte de noviciat ayant beaucoup d'analogie avec celui des prêtres égyptiens. Ils recevaient les conseils de Pythagore lui-même, et sous sa direction observaient et cherchaient. Ils ne devaient pas révéler l'enseignement qu'on leur confiait. Une fois leurs études terminées, ils avaient encore un signe de ralliement : le *pentagone étoilé*, dont les angles étaient désignés par les lettres du mot ὑγίειν (la diphtongue ει étant remplacée par un θ) qui correspond au terme français : « Salut ».

Vu le mutisme volontaire de ses disciples, il est difficile de distinguer, à la lueur des trop rares fragments qui nous sont parvenus, ce qui revient en propre à Pythagore. Au milieu de ces maigres renseignements il paraît hors de doute qu'il a le premier essayé d'associer la géométrie et l'arithmétique. Quant au théorème qu'on lui attribue : dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, il semble que les Égyptiens le connaissaient avant lui. La démonstration qu'on en donne aujourd'hui est due en tout cas à Euclide. Enfin la *table de multiplication*, ne lui appartient pas davantage.

Ses élèves perpétuèrent oralement sa doctrine, celui-ci n'ayant laissé aucun écrit. Il avait seulement confié ses commentaires à une de ses filles, Damo, avec défense formelle de les communiquer aux profanes : quoique femme et pauvre elle tint, dit-on, sa promesse. Mais PHILOLAUS n'agit pas de même. Dans son *Système de la nature*, il divulgua le premier les grandes lignes de l'enseignement pythagoricien. Le secret toutefois avait duré plus d'un siècle. Ce savant émettait dans son ouvrage bon nombre d'idées plus ou moins fantaisistes sur le pouvoir des nombres. Toutefois sa cosmogonie, bien qu'elle ait essuyé les critiques d'Aristote, était plus exacte que ses théories arithmétiques et il connaissait l'existence des cinq polyèdres réguliers sur lesquels sa philosophie reposait en partie.

Son disciple ARCHYTAS, de Tarente, qui naquit vers 428 avant Jésus-Christ, se livra aux recherches scientifiques au milieu des préoccupations des fonctions publiques. Il passe pour avoir appliqué à la Mécanique les connaissances géométriques qu'on possédait alors, et il découvrit une ingénieuse solution de la duplication d'un cube<sup>1</sup>. La méthode qu'il emploie indique qu'il avait des vues exactes sur la génération des cônes et des cylindres. Il ramène le problème à celui de deux moyennes proportionnelles, au moyen d'une *courbe à double courbure*, qu'il construit ainsi. Sur le diamètre de base du cylindre droit circulaire il mène un demi-cercle dont le plan est perpendiculaire à celui de la base du cylindre donné. Puis il fait tourner le diamètre autour d'une de ses extrémités. Dans ce mouvement ce demi-cercle rencontre dans chacune de ses positions successives la surface du cylindre en un point. L'ensemble de ces points forme la ligne cherchée. Le savant grec coupait alors cette courbe par un cône de

---

(1) BRETSCHNEIDER. *Die Geometrie und die Geometer vor Euklides*. Leipzig, 1870, in-8°.

révolution autour de l'arête cylindrique menée par l'extrémité fixe du diamètre du demi-cercle mobile. Le point d'intersection répondait à la question posée.

Au sujet de l'*infini*, il le considère comme les mathématiciens le font, en somme, aujourd'hui : c'est pour lui une chose n'ayant aucune grandeur assignable.

Pendant longtemps Milet et Tarente furent à la tête des nations civilisées, sinon à un point de vue général au moins en ce qui concerne la philosophie et les mathématiques. Néanmoins, il serait inexact de se figurer que c'étaient là les seules villes du monde hellénique où existaient des institutions florissantes. Peu de colonies importantes en manquaient.

Cnide s'honorait d'avoir donné le jour à EUDOXE, vers l'an 408 avant notre ère. Plus jeune que Platon d'une vingtaine d'années<sup>1</sup>, il se rendit à Athènes, vers 386, pour suivre les leçons du fondateur de l'Académie, voyagea ensuite en Sicile et en Égypte, s'établit à Cyzique puis à Athènes afin de s'y poser en rival de Platon, mais l'hostilité de ce dernier le força à s'en retourner quelque temps avant sa mort, survenue en 355, au cours d'un voyage sur les bords du Nil.

Si sa carrière fut agitée, elle eut la plus heureuse influence sur le progrès scientifique. Il découvrit la plus grande partie du 1<sup>er</sup> livre des *Eléments* d'Euclide<sup>2</sup>, consacré à la théorie de la proportionnalité. Ses travaux sur les incommensurables sont des plus importants, et il démontra plusieurs théorèmes sur la mesure des solides, tels les suivants : la pyramide est le tiers du prisme de même base et de même hauteur ; le cône est le tiers du cylindre de même base et de même hauteur.

A Chios, on célébrait le mérite d'HIPPOCRATES, qu'on

(1) *Revue des questions scientifiques*, 2<sup>e</sup> série, t. XV, Louvain, 1899, in-8°.

(2) PAUL TANNERY. *La Géométrie grecque*. Paris, 1887, in-8°.

doit se garder de prendre pour son illustre homonyme le médecin de Cos.

Né vers 470 avant Jésus-Christ, il établit pour ainsi dire la transition entre les Pythagoriciens et Platon. Il commença par exercer la profession d'armateur; mais un de ses navires ayant été pris par des pirates il se rendit à Athènes pour recouvrer son bien et demander justice : aussi eut-il de nombreux loisirs pour suivre les cours des philosophes. A son tour il ouvrit une école dont les revenus, en le faisant vivre, le dédommagèrent de la capture de son vaisseau. Peu à peu il devint une autorité en mathématique, et écrivit le premier traité d'où sont sortis les « *Éléments* » d'Euclide. On lui attribue en outre *l'introduction des lettres aux points principaux des figures*, pour faciliter les démonstrations; toutefois ce n'est pas l'avis de M. Cantor, qui fait honneur de cette invention aux Pythagoriciens<sup>1</sup>. Ainsi que nous l'avons vu plus haut, ceux-ci représentaient par chacune des lettres  $\nu$ ,  $\gamma$ ,  $\iota$ ,  $\theta$ ,  $\alpha$  les sommets du pentagone étoilé. Mais cet exemple isolé, dit avec juste raison M. Rouse Ball, ne prouve pas l'universalité de la méthode<sup>2</sup>.

Hippocrates s'occupa également des figures semblables, et découvrit plusieurs propriétés relatives aux cercles. Parmi celles-ci signalons les suivantes :

Tous les angles inscrits dans un même segment de cercle sont égaux ;

Un angle inscrit dans un segment est aigu, droit ou obtus, suivant que ce segment est supérieur, égal ou inférieur à un demi-cercle ;

Deux cercles sont entre eux comme les carrés de leurs diamètres.

C'est aussi à ce savant qu'on doit le mode de démonstration dit : « de réduction », par lequel on

(1) MORITZ CANTOR. *Loc. cit.*, t. I.

(2) WALTER W. ROUSE BALL. *A short account of the history of mathematics*. Londres, 1888, in-12.

ramène la connaissance d'une question à celle d'autres choses dont elle est la conséquence nécessaire. Peut-être avant lui avait-on employé ce procédé dans quelques cas particuliers, mais il eut le mérite d'en signaler l'importance, et d'en généraliser l'application.

Ses autres travaux se rattachent à la quadrature du




Fig. 3. — Lunules d'Hippocrates.

cercle, ce problème qui tint une si grande place dans les préoccupations des mathématiciens grecs. Pour tourner la difficulté, Hippocrates essaya d'abord de carrer la *lunule* ou aire comprise entre deux arcs de cercles inégaux. Il n'atteignit nécessairement pas le but qu'il poursuivait, mais il arriva à ce théorème important : Si sur les trois côtés d'un triangle rectangle ABC pris comme diamètre on décrit des demi-circonférences, la somme des surfaces des deux croissants M et N (lunules), égale l'aire du triangle T. C'était le premier exemple d'un espace rectiligne démontré égal à celui d'une figure curviligne.

### CHAPITRE III

#### Les Écoles d'Athènes et de Cyzique : Platon, ses disciples et leurs contemporains.

La science mathématique de PLATON est loin d'atteindre sa renommée philosophique. Né à Athènes en 429, ce brillant élève de Socrate n'aurait même jamais cultivé cette branche des connaissances humaines tant méprisée par son maître, si après la mort de ce dernier il n'eût voyagé en Égypte, dans l'Italie méridionale et la Sicile où il recueillit l'enseignement des Pythagoriciens. A son retour dans sa patrie, lorsqu'il fonda « l'Académie », il était converti, et plus tard quand on lui demandera quelles sont les occupations de la Divinité, il répondra : « Elle géométrise perpétuellement » ; il inscrira même au seuil de sa demeure : « Que nul n'entre sous mon toit, s'il est ignorant en Géométrie ». La lecture du *Timée* montre d'ailleurs qu'il connaissait les propriétés essentielles des progressions. Mais que de subtilités arithmétiques, de divagations plus ou moins bizarres sur les nombres, ne renferme pas ce livre ! Aussi, suivre les érudits modernes dans leurs commentaires ne serait ici qu'un hors-d'œuvre inutile. D'autre part, ses idées cosmogoniques n'intéressent pas cette Histoire.

On attribue à ce grand philosophe la découverte des *lieux géométriques*, c'est-à-dire d'un ensemble de points jouissant de la même propriété. Platon eut en

outre le mérite d'observer l'influence des mathématiques sur la rectitude du jugement, et si ses recherches originales sont de minime importance, il fit progresser les méthodes, précisa les définitions du point, de la ligne, des surfaces et des volumes, qu'Euclide devait donner après lui presque sans changement. Il faut également lui savoir gré d'avoir dirigé quelques-uns de ses disciples vers l'étude des sections coniques. Enfin, dernier et précieux service rendu à la Géométrie, il inventa l'*analyse* comme mode de démonstration. C'est Proclus qui lui attribue cette découverte ; toutefois on en retrouve seulement les premières traces dans les livres d'Euclide.

Ce procédé consiste à établir une suite de propositions commençant au théorème qu'on veut démontrer, pour se terminer à une proposition connue, et telles qu'en partant de la première, chacune entraîne l'exactitude de la suivante. Il s'ensuit alors que la première, conséquence de la dernière, est vraie comme celle-ci.

Platon avait donné par son enseignement une forte impulsion à la science, aussi les mathématiciens contemporains ne manquent pas. Le sophiste ANTIPHON nous retiendra tout d'abord. Il s'ingénia à trouver la solution du problème de la *quadrature du cercle*. Pour y parvenir il inscrivait un carré dans un cercle, puis il déterminait le milieu des arcs sous-tendus par chaque côté et réunissant au moyen de droites les points ainsi déterminés il formait de la sorte un octogone. Il continuait ensuite à inscrire des polygones réguliers dont le nombre des côtés augmentait indéfiniment. Cette construction aurait pu être un trait de lumière pour Antiphon, mais il ne sut pas en profiter. Le génie d'Archimède devait cependant en déduire des résultats aussi imprévus qu'importants. Du reste, vers la même époque, BRYSON d'Héraclée avait fait avancer cette fameuse question en circonscrivant des polygones en même temps qu'il en inscrivait. Toutefois il se trompa en pensant que l'aire d'un cercle est la moyenne arith-

métique entre les polygones circonscrit et inscrit.

Il faut voir dans les travaux de ces deux savants les débuts de la *méthode d'exhaustion*, c'est-à-dire d'une manière logique de prouver l'égalité de deux grandeurs en démontrant que leur différence est plus petite que toute quantité donnée.

Un autre philosophe, HIPPIAS d'Élée, qui florissait vers 420 avant notre ère, est connu pour s'être occupé de la *trisection des angles*. Il aurait même inventé, toujours d'après Proclus, une courbe transcendante lui permettant de diviser tout angle rectiligne en un certain nombre de parties ayant entre elles un rapport donné. Malheureusement le commentateur nous renseigne incomplètement sur ce travail.

Aucun ouvrage de son contemporain THÉÉTÈTE, d'Athènes, ne nous est parvenu. Nous savons seulement le titre de l'un d'eux. C'était un traité *Sur les cinq solides*, dont Euclide s'est servi pour composer le XIII<sup>e</sup> livre de ses *Éléments*. Enfin ce savant aurait ébauché la théorie des grandeurs incommensurables.

Parmi les autres recherches dues à des membres des écoles d'Athènes et de Cyzique nous ne citerons que celles de MÉNECHME et de son frère DINOSTRATE. Au dire d'Eratosthène, le premier naquit aux environs de l'année 375 avant Jésus-Christ. Après avoir suivi les leçons de Platon et d'Eudoxe, il s'acquit dans l'empire grec une assez grande réputation pour être nommé précepteur d'Alexandre. On rapporte qu'à une demande de son illustre élève le priant de lui indiquer les moyens les plus rapides pour apprendre la géométrie, il aurait répondu : « Dans le domaine mathématique, prince, il n'y a pas de chemin à l'usage des rois <sup>1</sup>. »

Ménechme s'occupa des sections coniques avec

---

(1) « *Non est regia ad mathematicam via.* » Inutile d'ajouter que cette anecdote, comme beaucoup de mots historiques, est plus ou moins vraie. Certains auteurs attribuent une réponse identique à Euclide dans un entretien avec Ptolémée Soter.

succès<sup>1</sup>. Il les aurait partagées en trois classes, et il recherchait leurs propriétés en prenant non pas différentes sections planes dans un cône fixe, mais en choisissant un plan et en le coupant par divers cônes. Il fit voir que la section d'un cône droit par un plan perpendiculaire à une génératrice est une *ellipse* si l'angle au sommet est aigu, une *parabole* si ce dernier est droit, et une *hyperbole* s'il est obtus. Toutefois il est difficile de dire au juste la part qui revient à Ménechme dans cette classification et dans la découverte des principaux théorèmes relatifs aux sections coniques, dont un avenir lointain devait seul dévoiler toute la fécondité. Étaient-elles connues avant lui? A-t-il seulement trouvé le moyen mécanique pour les réaliser expérimentalement? Mystère qui a peu de chances d'être éclairci.

De son côté, Dinostrate découvrit une courbe particulière, la *quadratrice*, que l'on attribue également à Hippias. C'est la courbe transcendante la plus anciennement connue, et il pensait la faire servir à une prétendue solution du problème de la quadrature du cercle. De là vient son nom.

Quant au grand ARISTOTE, s'il ne fut guère un professionnel de la Mathématique, il eut cependant quelque influence sur son développement, en apportant des clartés inattendues là où les défauts fourmillaient. En particulier par ses *Questions mécaniques*, il dirigea l'attention de ses contemporains vers les principes initiaux de cette science, et c'est lui qui eut l'idée d'employer les lettres pour représenter les grandeurs. On rencontre enfin dans cet ouvrage — à côté d'erreurs que l'autorité de son nom rendra si tenaces — un aphorisme remarquable pour son temps : les chocs de deux corps produisent le même effet si ceux-ci sont inversement proportionnels à leurs vitesses.

(1) ALLMAN. *Greek Geometry from Thales to Euclid*. Dublin, 1889; PAUL TANNERY. *La Géométrie grecque*. Paris, 1887; ROUSE BALL. *Loc. cit.*

Ses successeurs, THÉOPHRASTE d'Erèse et EUDÈME, avaient écrit des *Histoires de la Géométrie, de l'Arithmétique et de l'Astronomie*, qui malheureusement ne nous ont pas été conservées. Quant au commentateur du philosophe de Stagyre, ALEXANDRE d'Aphrodisie, il s'occupa des nombres cycliques ou circulaires sur la nature desquels on n'est pas bien fixé.

---

## CHAPITRE IV

### **Fondation de l'Ecole d'Alexandrie. Œuvres d'Euclide et d'Archimède.**

En l'année 331 avant notre ère, un petit bourg riverain du Nil fut transformé en une ville immense par la volonté d'Alexandre, habilement secondé par Dinostates, l'architecte du temple de Diane à Ephèse. Sous cette impulsion, de grandioses monuments s'élevèrent comme par enchantement, on créa un port magnifique qui ne tarda pas à accaparer le commerce du globe, et ce village naguère ignoré devint bientôt le centre intellectuel de l'Univers. Toutes les religions, toutes les races se fondirent, s'amalgamèrent dans cette merveilleuse cité, dans Alexandrie où la civilisation grecque désormais transplantée allait puiser une sève vigoureuse et rayonner encore sur le monde pendant près de dix siècles.

Après la mort du grand conquérant (323 av. J.-C.), un de ses lieutenants Ptolémée, eut l'Égypte en partage, et une fois qu'il eut assuré l'avenir de sa dynastie par la force, il voulut occuper les dernières années de son règne à organiser ses états. Il y attira les savants les plus renommés, il fonda ce Museum où toutes les connaissances humaines, les Mathématiques entre autres, eurent de remarquables interprètes, et enfin il édifia cette fameuse Bibliothèque, qui sous Démétrius de Phalère possédait plus de 400 000 rouleaux.

Dans le premier siècle de son existence, l'Ecole d'Alexandrie compta les trois plus illustres mathématiciens de l'antiquité : Euclide, Archimède et Apollonius. Remarquons aussi qu'à partir de cette époque les documents historiques vont perdre le caractère hypothétique qu'à de rares exceptions près nous leur avons trouvé jusqu'ici. Dorénavant nous n'apprécierons plus les savants dont nous analyserons les œuvres sur des rapprochements de passages isolés mais d'après leurs livres mêmes. Si parfois encore les détails biographiques sont maigres ou contradictoires, nous connaissons, au moins dans leurs grandes lignes, les travaux les plus importants de cette période si féconde.

D'après les sources arabes, EUCLIDE serait né en Syrie d'un père grec nommé Naucrates, originaire de Damas mais fixé à Tyr. Celui-ci envoya probablement son fils faire ses études à Athènes, et il est certain que vers la fin du règne de Ptolémée Soter, roi d'Égypte (323-283 av. J.-C.), Euclide avait déjà effectué des recherches mathématiques assez remarquables, puisque ce prince l'appela à Alexandrie pour y professer la Géométrie et l'Arithmétique. L'éclat de son enseignement avait donc dû l'y précéder. En tous cas, il reçut un accueil des plus flatteurs, et fut chargé de composer un traité sur la science qu'il devait inculquer à ses disciples. C'est là l'origine des *Eléments*. Si toutes les propositions énoncées dans ce livre ne lui appartiennent pas en propre, s'il est plausible même d'en attribuer une bonne partie à Pythagore, à Hippocrate de Chios, à Eudoxe et à Ménechme, on ne peut lui contester le mérite d'avoir coordonné les théorèmes, simplifié les démonstrations, réduit le nombre des vérités primordiales admises jusqu'à lui comme axiomes et donné en plusieurs endroits des méthodes souvent élégantes et faciles pour un débutant là où ses prédécesseurs s'étaient servis de raisonnements compliqués. Aussi, malgré les défauts que les modernes ont trouvé à leur reprocher,

les *Eléments* constituaient une œuvre géniale pour l'époque. Ce qui le prouve d'ailleurs mieux que tout le reste, c'est qu'après vingt siècles leur succès n'est pas épuisé. Les savants les plus célèbres les ont couverts d'éloges, depuis Archimède jusqu'à Descartes, depuis Apollonius et Pappus jusqu'à Newton et Lagrange. Que de professeurs les ont enseignés ! Que d'élèves les ont appris ! Que de commentateurs et de traducteurs n'ont-ils pas eus !

Cependant, parmi les critiques qu'on leur adresse, quelques-unes sont fondées. Ainsi certaines propositions données comme axiomes ne sont pas évidentes par elles-mêmes. Il n'y a pas d'efforts pour généraliser les résultats. Exemple : l'angle n'est pas envisagé dans le cas où il devient plus grand que deux droits. La classification est parfois imparfaite, et l'ouvrage un peu diffus. Enfin l'auteur se sert très rarement de la superposition des figures comme mode de démonstration. Tout récemment, en se plaçant au point de vue pédagogique, on a tenté des réformes pour modifier l'aridité rebutante sous laquelle se présentait jadis la Géométrie dans les collèges <sup>1</sup>. On peut citer comme types de cette catégorie en France l'ouvrage de Rouché et Comberousse, et en Italie celui de Lazzeri et Bassani dont une seconde édition a paru l'an dernier.

Mais revenons à l'antiquité. Il paraît vraisemblable qu'au milieu du v<sup>e</sup> siècle avant notre ère existait, sous le nom de Pythagore, un traité de Géométrie dont le cadre se rapprochait beaucoup de l'ouvrage d'Euclide. Trois ou quatre auteurs, dont un seul, Hippocrate de Chios, nous est connu, avaient déjà composé des livres analogues aux *Eléments* au moins quant au fond. Que contenaient-ils au juste ? Il est malaisé de le savoir puisque leurs travaux sont perdus. On trouve seule-

---

(1) Voir à ce sujet LAISANT. *La Mathématique. Philosophie. Enseignement*. Paris. Georges Carré et C. Naud, éditeurs, 1898.

ment des mentions succinctes relatives à certains d'entre eux, comme Theudios de Magnésie et Hermotime de Colophon, dans le résumé historique de Proclus<sup>1</sup>. D'autre part, Eudoxe, sans avoir composé d'ouvrages didactiques, semble avoir fait progresser la science d'une manière très importante. Il inventa la théorie des proportions et les théorèmes qui se rapportent à la mesure de la pyramide et du cône.

La Géométrie plane d'Euclide se différencie du reste de nos traités modernes. La théorie de la similitude suit l'étude du triangle, du parallélogramme, du cercle et du polygone régulier. Après avoir trouvé les propriétés essentielles de ces derniers, il démontre à part ce qui a trait aux figures semblables, en ne s'appuyant nullement sur celles-ci dans les raisonnements des théorèmes dont l'énoncé ne les comporte pas. Il arrive à ce résultat en employant dès le début l'artifice suivant qui remplace souvent dans ses *Éléments* la notion de similitude.

Soit le parallélogramme ABCD. Si par un point quelconque P pris sur une diagonale AC on mène des




Fig. 4.

parallèles aux côtés, la figure sera divisée en deux parallélogrammes *péridiamétraux* CB'PC' et AA'PD

(1) Procli Diadochi in primum Euclidis Elementorum librum commentarii. Edition Friedlein, Leipzig, 1873.

semblables, et en deux autres parallélogrammes *parapléromes*  $PD'DC'$  et  $PA'BB'$  équivalents dont les côtés sont alors réciproques. Une fois ceci démontré, Euclide se sert de ce moyen pour construire par exemple une quatrième proportionnelle comme second côté d'un paraplérome dont le premier côté ainsi que le paraplérome correspondant sont donnés. Il n'y a plus, en effet, qu'à terminer la construction du parallélogramme. Cette particularité ferait donc supposer que la géométrie pythagoricienne se rapprochait plus de la nôtre en tant que succession des théorèmes, et qu'entre l'époque où vivait le philosophe de Samos et celle d'Euclide la Géométrie fut profondément remaniée à la suite des travaux d'Eudoxe sur les proportions.

Les *Eléments* sont trop connus pour qu'il soit nécessaire de les analyser longuement. Esquissons-en seulement les grandes lignes, la marche générale. Ils commencent par des définitions. D'abord le point : « ce qui n'a pas de parties » ; la ligne : « longueur sans largeur » ; le rectangle, le « rhombe » ou losange, le trapèze, le cercle, etc. Nous donnons ci-contre le fac-similé de la page d'un manuscrit qui reproduit précisément le début des *Eléments*.

Ensuite on passe aux dix postulata fondamentaux tels que celui-ci par exemple : tous les angles droits sont égaux. Puis viennent les notions communes ou « axiomes » comme : le tout est plus grand que la partie ; deux lignes droites ne renferment point un espace...

Les propositions qui se rattachent aux notions précédentes, découlent les unes des autres. Chacune d'elles se divise en quatre parties : l'exposition ou donnée, la construction, la démonstration (pour laquelle l'auteur a souvent recours à la méthode dite de « réduction à l'absurde ») et la conclusion. Cette façon logique de procéder fait converger les vérités acquises précédemment vers le théorème important, mais ce luxe de

[illegible]

Fig. 5. — Manuscrit des *Éléments* d'EUCLIDE.

(Bibliothèque Nationale de Paris, Fonds grec n° 2344, fol. 17, XII<sup>e</sup> siècle.  
Fac-similé du début : définitions du point, de la ligne, etc.)

preuves, cette surabondance de détails, fatigue quelque peu l'esprit du lecteur.

Une fois ces préliminaires achevés, Euclide entre dans le vif de son sujet qu'il traite en treize livres, mais si l'on examine le plan que l'auteur paraît s'être tracé, on reconnaît sans peine dans son œuvre quatre sections bien marquées. Dans la première (livres I à VI) le sagace mathématicien étudie les figures planes, les quantités proportionnelles et leur application à celles-ci. La seconde (livres VII, VIII et IX) est consacrée aux propriétés des nombres, principalement à leur emploi en Géométrie pour mesurer des rapports de longueur ou de surface. Ici s'introduit la notion d'incommensurabilité, car on rencontre dans les spéculations géométriques des figures qui n'ont aucune grandeur commune avec d'autres de même nature. En conséquence, Euclide s'en occupe dans le livre X. Enfin les derniers chapitres roulent sur les plans et les solides.

Dans les éditions des *Eléments* on ajoute parfois deux livres sur les cinq polyèdres réguliers, mais cette partie doit être attribuée à HYPsicLÈs, qui vivait, croit-on, un siècle et demi plus tard.

Un autre ouvrage d'Euclide faisait suite pour ainsi dire au précédent, c'était les *Données*, recueil propre à faciliter les applications. Les géomètres grecs ramenaient, en effet, la résolution des problèmes à des *Δεδομένα* ou résultats immédiats de constructions connues. Exemples : un triangle dont on avait déterminé chaque angle était « donné de grandeur » ; une ligne dont on fixait l'inclinaison avec une autre était « donnée de position » ; un triangle dont on connaissait la valeur respective des angles et les rapports des côtés entre eux était « donné d'espèce ».

La singularité la plus remarquable de ce livre est qu'on peut déduire facilement de quelques-unes de ses propositions la résolution des équations du second degré. Nous retrouverons plus loin la même constata-

tion pour Archimède et Apollonius. Si ces mathématiciens ne se sont pas servis de formules, il faut l'attribuer uniquement au but qu'ils poursuivaient. Ils raisonnaient toujours sur les grandeurs elles-mêmes, et non sur leur mesure. L'absence d'une langue algébrique pour exprimer ces dernières ne les gênait donc pas. Cependant certaines constructions, telles que la division d'une droite en moyenne et extrême raison illustrent trop les relations des racines des équations du second degré, pour qu'ils ne les aient pas aperçues.

Quant aux *Porismes* d'Euclide sur lesquels on a beaucoup discuté, ils ne nous sont point parvenus. Tout ce que nous en savons est dû à Pappus<sup>1</sup>, qui en parle d'une manière assez obscure. Plusieurs savants ont cherché à restituer cet ouvrage, entre autres Robert Simson au XVIII<sup>e</sup> siècle, et plus près de nous Chasles. Ce dernier a publié, en 1880, un essai de divination de l'œuvre perdue, mais c'est plutôt ce « qu'aurait pu laisser » le géomètre alexandrin, que ce qu'il a véritablement composé.

Un certain nombre d'écrits, tels que des *Principes de Musique*, une *Optique* et un abrégé d'Astronomie intitulé les *Phénomènes*, sont attribués à Euclide, mais ils ne paraissent pas lui appartenir. Enfin plusieurs autres ne nous sont connus que par leurs titres. Les plus importants se rapportaient à la *Perspective* et aux *Sections coniques*. Il avait également publié un traité de pédagogie géométrique ayant pour but d'éviter aux débutants les raisonnements inexacts, les pétitions de principes et les manques de logique analogues, si familiers aux jeunes étudiants.

En résumé, jamais traité didactique n'eut une vogue comparable au chef-d'œuvre d'Euclide. Pendant toute la période du Moyen Age et de la Renaissance, on le

---

(1) GINO LORIA. *Le Scienze esatte nell antica Graecia*, libro II. Modena, 1895.

commenta. Ce fut le pain quotidien des mathématiciens d'alors. Cependant l'Occident ne connut d'abord les *Eléments* que tronqués. Ils lui parvinrent au <sup>v</sup><sup>e</sup> siècle, grâce à Boèce, qui confondra d'ailleurs le professeur d'Alexandrie avec le philosophe de Mégare et cette erreur subsistera longtemps. De plus, on supposait qu'Euclide avait seulement laissé des définitions. On regardait Théon comme l'auteur des démonstrations.

Au <sup>xii</sup><sup>e</sup> siècle, Athelard de Bath les traduira pour la première fois de l'arabe en un latin barbare, car depuis Honeïn-ben-Ishak, mort vers 870, les disciples de Mahomet possédaient dans leur langue les *Eléments*. Les Persans eux-mêmes, grâce à l'astronome Nasir-Ed-Din, purent apprendre, dès 1260, la Géométrie dans Euclide.

Lors de l'invention de l'imprimerie, la popularité de ce livre ne fit que grandir. L'édition latine *princeps* fut publiée à Venise en 1482. Son auteur Erhard Ratholt annonce dans sa préface que la difficulté d'impression des images avait été jusque-là un obstacle pour la circulation des ouvrages de ce genre. Cet obstacle, dit-il, vient d'être heureusement vaincu, et on peut donner maintenant « les figures géométriques avec autant de facilité que les caractères ». Toutes les illustrations sont, en effet, exécutées en marge, et, ce qui est curieux, semblent gravées sur métal. Le texte grec, accompagné du Commentaire de Proclus, parut pour la première fois à Bâle, en 1553, grâce aux soins de Grynæus.

Depuis cette époque, maintes éditions d'Euclide se succédèrent. Parmi les plus célèbres on cite celle de Rome (1594), celle d'Oxford (1703), une des plus luxueuses, et la grecque-française-latine de Peyrard, imprimée à Paris en 1814, d'après un très ancien manuscrit provenant de la Bibliothèque du Vatican. Mais la plus intéressante et la plus correcte, scientifiquement parlant, est celle récemment mise au jour, à Leipzig, par Heiberg et Menge (1881-1896).

Quant à Conon et Dosithée, les successeurs immé-

diats d'Euclide à Alexandrie, ils n'ont pas laissé grandes traces dans l'histoire des Mathématiques, et l'amitié d'ARCHIMÈDE a surtout sauvé leur nom de l'oubli. Ce grand homme, dont les travaux vont nous occuper maintenant, a ouvert bien des routes dans le domaine scientifique. Né en l'an 287 avant Jésus-Christ, il était, si nous en croyons Plutarque, apparenté à Hiéron, roi de Syracuse. Nous n'insisterons guère ici sur toutes les inventions plus ou moins fabuleuses qu'on attribue à son puissant génie, ni sur ses découvertes relatives aux lois de l'équilibre des corps plongés dans des fluides, et nous parlerons encore moins des fantaisistes légendes mises sur son compte. Mais exposons rapidement, avant de passer à l'analyse de ses œuvres, les particularités les plus authentiques de sa vie.

Pendant le siège qu'eut à soutenir sa patrie contre les Romains, l'ingéniosité d'Archimède se donna libre carrière, et il construisit des catapultes gigantesques pour détruire la flotte ennemie qu'il aurait même fini par incendier. A ce propos, on n'ignore pas qu'en 1777 Buffon, suivant point par point la description du procédé imaginé par le sagace Syracusain, fit construire un miroir métallique, et répéta cette expérience. Il réussit à enflammer du bois à une distance de 150 pieds, et à fondre du plomb à 140.

Archimède ne put cependant empêcher les ennemis de s'emparer de la ville par surprise, et il mourut sous le fer d'une brute soldatesque en 212. Ses compatriotes ne tardèrent pas à l'oublier, si bien que Cicéron, un siècle et demi après, alors qu'il était questeur de Sicile, eut grand'peine à découvrir son tombeau disparu sous les broussailles. Le philosophe raconte le fait dans ses *Tusculanes*, et il ajoute mélancoliquement : « Ainsi la plus noble et jadis la plus docte des cités grecques ignorerait encore la place du tombeau du plus illustre de ses enfants, si un homme d'Arpinum ne la lui avait enseignée ». Il l'avait retrouvé surmonté, conformément

aux désirs d'Archimède, d'une sphère inscrite dans un cylindre, afin de schématiser aux yeux des profanes sa découverte des relations respectives entre les volumes et les surfaces de ces deux figures.

Quoi qu'il en soit de ces détails anecdotiques, Archimède, à son retour d'Égypte où il suivit les leçons de Conon et de Dosithée, commença ses travaux, et il rendit de précieux services à la Science, en créant la Mécanique et la Géométrie supérieure.

La plus importante de ses productions est son traité *De la sphère et du cylindre* dans lequel se trouvent énoncés les principaux théorèmes relatifs aux rapports existant entre le cylindre, le cercle et la sphère. En voici quelques-uns :

La surface d'un cylindre droit quelconque, la base exceptée, est égale à celle d'un cercle dont le rayon est moyen proportionnel entre le côté du cylindre et le diamètre de sa base.

La surface d'un cône droit quelconque, la base exceptée, est égale à celle d'un cercle dont le rayon est moyen proportionnel entre le côté du cône et le rayon du cercle de base du cône.

La surface d'une sphère quelconque est quadruple de celle d'un de ses grands cercles.

La surface d'un segment sphérique quelconque est égale à un cercle qui a pour rayon une droite menée du sommet du segment à la circonférence du cercle qui est la base du segment, etc.

Pour la démonstration de ces théorèmes, Archimède s'appuie sur quelques principes qu'il pose au début de son ouvrage. Il montre d'abord que la ligne droite est la plus courte de toutes celles qui ont les mêmes extrémités. Il passe ensuite à la définition des lignes et des surfaces « concaves d'un même côté », puis il formule les deux propositions suivantes : si deux lignes concaves d'un même côté possèdent les mêmes extrémités et que l'une soit « comprise tout entière par l'autre »,

l'entourante est plus grande que l'entourée. Il en est de même pour les surfaces : si deux surfaces concaves d'un même côté se terminent à la même ligne dans un plan, et que l'une entoure l'autre, l'étendue de la surface enveloppante sera plus grande que celle de la surface enveloppée.

A l'aide de ces principes qui précisaient nettement les figures courbes et qui tenaient lieu de définitions impossibles à donner sans faire intervenir les notions infinitésimales, Archimède arrivait aux plus fines démonstrations. Ces découvertes arrachèrent plus tard à Leibniz cet aveu : « ceux qui peuvent comprendre Archimède admirent moins les découvertes des modernes. » Tel est le contenu du premier livre *De la sphère et du cylindre*. Le second renferme uniquement des problèmes du genre de ceux-ci :

Couper une sphère par un plan, de façon que les surfaces des segments aient entre elles une raison donnée.

Couper une sphère par un plan, de manière que les segments aient entre eux une raison donnée.

La solution de ces questions était fort ardue, vu les ressources qu'Archimède avait à sa disposition<sup>1</sup>. Cette dernière, entre autres, exigerait la résolution d'une équation du 3<sup>e</sup> degré.

Un autre de ses écrits *Des conoïdes et des sphéroïdes*, montre avec quel talent il savait manier les transformations de figures. Archimède nomme « conoïdes » les corps engendrés par la révolution d'une hyperbole autour de son axe transverse, ou d'une parabole autour de son diamètre, et « sphéroïde » le solide décrit par une ellipse tournant autour d'un de ses axes. Si la révolution s'opère autour du grand diamètre, le sphéroïde est dit « allongé » ; si elle a lieu autour du petit on le qualifie d'« aplati ». Plusieurs propositions de ce livre

(1) NESSELMANN, *Die Algebra der Griechen*. Berlin, 1842.

sont souvent usitées, et l'une d'elles : l'aire de l'ellipse est à celle du cercle circonscrit, dans le rapport du petit au grand axe, a de multiples applications en Astronomie.

Mais le plus connu des ouvrages d'Archimède est le traité *De la mesure du cercle* qui renferme seulement trois propositions : il n'en a pas moins contribué à rendre immortel son auteur.

Le génial géomètre part de cet énoncé : un cercle quelconque égale le triangle rectangle dont un des côtés de l'angle droit a la même longueur que le rayon et dont l'autre cathète<sup>1</sup> est égale à sa circonférence. Voici en substance son raisonnement. Le cercle ne peut pas être supérieur au triangle rectangle dont un des côtés de l'angle droit égale la circonférence, et dont l'autre égale le rayon du cercle. Il fait voir ensuite que la même figure ne peut pas être plus petite, et il en déduit qu'en définitive le cercle et le triangle sont de même surface.

Une fois ce résultat acquis, il établit qu'un cercle est au carré construit sur son diamètre à peu près comme 11 est à 14. Enfin, serrant le problème de plus près, il arrive au but : la circonférence d'un cercle est égale au triple du diamètre réuni à une portion du diamètre, qui est plus petite que le septième de ce diamètre et inférieure à ses  $\frac{10}{71}$ . Il parvint à cette valeur en traçant deux polygones de 96 côtés inscrits et circonscrits au même cercle. Comme la circonférence doit être naturellement comprise entre eux deux, il établit empiriquement la longueur de cette courbe en calculant leurs dimensions respectives, c'est-à-dire ses limites inférieure et supérieure. C'était un remarquable procédé pour un savant qui vivait près de deux mille ans avant les Leibniz et les Newton!

---

(1) Le mot *cathète* désigna pendant longtemps le côté de l'angle droit d'un triangle rectangle. On le trouve employé encore dans certains traités mathématiques du XVII<sup>e</sup> siècle.

Archimède trouva ainsi le rapport approché de la circonférence au diamètre, et montra qu'en choisissant celui-ci comme unité cette courbe est plus grande que  $3\frac{10}{71}$  et plus petite que  $3\frac{10}{70}$ . Malheureusement nous ignorons le mode de calcul employé par Archimède pour parvenir à ce résultat. A-t-il procédé par tâtonnements dans l'extraction des racines? Tout porte à le croire puisqu'il se contente simplement d'énoncer les diverses racines des nombres sans fournir de plus amples explications sur les moyens de vérification de sa formule.

Dans un autre champ de recherches le savant syracusain fut moins heureux.

Conon, s'était principalement occupé de rechercher les propriétés de l'hélice, mais il décéda vers 220 avant Jésus-Christ, sans démontrer les théorèmes qu'il avait formulés. Aussi un des premiers soins d'Archimède fut-il de compléter l'œuvre inachevée de son ami. Il donna d'abord la définition précise de la courbe. L'hélice est engendrée par un point qui se déplace sur une droite d'un mouvement uniforme, la droite tournant elle-même d'un mouvement identique autour d'un de ses points. Quant aux démonstrations qu'il fournit elles sont compliquées, et les procédés géométriques employés actuellement ont permis de les rendre beaucoup plus simples. Si donc les solutions sont originales, elles ont beaucoup diminué d'intérêt.

Un livre plus remarquable est celui *De l'équilibre des plans ou de leur centre de gravité*. Archimède s'y révèle le véritable créateur de la Mécanique. Non seulement les centres de gravité d'un grand nombre de figures géométriques simples y sont déterminés, mais on y trouve ceux plus compliqués des segments de parabole à une ou à deux bases. Le tout est démontré avec concision, et s'appuie sur certaines propriétés insérées dans l'ouvrage sur la *Quadrature de la parabole*. Il parvint à cette dernière découverte, comme il l'explique lui-

même dans sa dédicace à Dosithée son maître, au moyen de deux méthodes : l'une indirecte ou mécanique, l'autre géométrique. Nous insisterons sur celle-ci, la meilleure à notre avis. Après un rappel de quelques propriétés « établies par ceux qui ont vécu avant lui », il inscrit dans la courbe un triangle ayant pour base celle du segment et pour sommet le point de contact de la tangente parallèle à la base. Ce triangle est plus grand que la moitié de ce segment. Puis il en inscrit un autre dans chacun des segments fractionnels. Il en résulte qu'en continuant de la sorte cette bissection, la figure polygonale obtenue différera d'au moins un peu qu'on le dési-




Fig. 6.

rer, du segment. D'autre part ayant démontré que  $ABC = 4(ADC + BEC)$  et ainsi de suite, il en conclut que chaque triangle est quadruple des deux secondaires suivants. Or comme la somme des triangles inscrits tend vers la surface de la parabole, celle-ci se compose donc du triangle inscrit, du quart de celui-ci, du seizième du même, etc. Tout revient alors à sommer une progression géométrique dont la raison est un quart. La parabole est en définitive les  $\frac{4}{3}$  du triangle inscrit. Aujourd'hui cette démonstration nous paraît aisée, une simple application d'une formule algébrique; il n'en était pas de même du temps d'Archimède, et pour avoir l'occasion d'admirer une fois de plus son habileté, relatons la méthode générale à laquelle il eut recours pour y parvenir.

Soient par exemple A, B, C, D... des grandeurs dont chacune est un carré ayant pour côté la moitié du précédent. Supposons P, P', P''... représentant respectivement le tiers de B, C, D... alors  $P + B$  sera le tiers de A;  $P' + C$  celui de B;  $P'' + D$  celui de C, etc. D'où  $B + C + D + \dots + P + P' + P'' + \dots$  égalera le tiers de  $A + B + C + \dots$ ; mais  $P + P' + P'' + \dots$  étant le tiers

de  $B + C + D + \dots$  sera le tiers de  $A$ . Donc  $A + B + C + \dots$  aura pour mesure les quatre tiers de  $A$ .

Ses vues sur l'arithmétique n'étaient pas moins ingénieuses. Dans *L'arénaire* il se propose de trouver un nombre supérieur à celui des grains de sable renfermés dans un globe dont le rayon serait égal à la

distance du centre de la Terre à la voûte céleste. Dans notre système de numération l'expression de ce chiffre, quelque considérable qu'il soit, n'offrirait aucune difficulté, mais il n'en était pas de même dans la notation grecque, qui n'allait que jusqu'à mille myriades ( $10^8$ ). Aussi, Archimède dut-il proposer de nouvelles




Fig. 7.

règles pour résoudre la question, et voici la conception qu'il imagina.

De son temps, les divers ordres d'unités (monades, décades, hécatontades...) formaient une progression dont les termes étaient :  $10$ ,  $10^2$ ,  $10^3 \dots 10^7$ ,  $10^8$  correspondant à nos unités, dizaines, centaines... La première série s'étendait alors jusqu'à 100 000 000. Elle constituait ses nombres du premier ordre. La série suivante de  $10^8$  à  $10^{16}$  forma ceux du second ordre ; la troisième comprenant ceux de  $10^{16}$  à  $10^{24}$  figura le troisième ordre, et ainsi de suite jusqu'au 8<sup>e</sup>, le dernier terme étant  $10^{56}$ .

Une fois parvenu à ce chiffre, le sagace arithméticien constitua, grâce à ces ordres de nombres, une nouvelle catégorie d'unités qu'il nomma « première période » suivie d'une division nouvelle constituant la « deuxième période », etc. <sup>1</sup>. Il parvenait de la sorte à une nomenclature qui n'était sans doute pas d'une rigoureuse logique mais qui, en empruntant seulement le vocabulaire exis-

(1) HOFER. *Histoire des mathématiques*. 3<sup>e</sup> édit., Paris, 1886.

tant, exprimait des nombres jusqu'à 10 à la trillionième puissance.

Nous ne parlons que pour mémoire ici de ses découvertes hydrostatiques et des *Lemmes* dont le texte original est perdu. Telle fut l'activité scientifique d'un des plus grands mathématiciens dont l'antiquité puisse s'honorer. La « méthode d'exhaustion » fut, en somme, le fil conducteur qui le guida dans ses mémorables travaux. Ce principe, dont l'analyse de son traité sur la quadrature de la parabole a permis de nous rendre compte, a beaucoup d'analogie avec notre procédé actuel des limites. Pour arriver à bon nombre de ses démonstrations, il concevait une grandeur comme comprise entre deux autres, de manière que celles-ci s'en approchent indéfiniment sans jamais l'atteindre. La circonférence par exemple est la limite des périmètres des polygones inscrits et circonscrits dont le nombre des côtés double indéfiniment. D'Alembert, Leibniz et Carnot considèrent d'ailleurs cette doctrine comme l'origine de l'Analyse infinitésimale : les principes sont identiques, le but poursuivi est le même. On cherche par induction certaines relations, on s'en rapproche par degrés, grâce à l'élasticité du système et on n'a plus qu'à vérifier les déductions, — ce qu'Archimède fait souvent en se servant de la réduction « ab absurdo ».

---

## CHAPITRE V

### Les travaux d'Apollonius et le développement des Mathématiques appliquées.

L'âge d'or de la science grecque se continue avec APOLLONIUS, le troisième grand mathématicien de la première Ecole d'Alexandrie. Plus jeune de beaucoup que son illustre prédécesseur, il était né à Perga, aujourd'hui Kara-Hissar, vers 260 avant Jésus-Christ, mais il passa la plus grande partie de sa vie en Égypte. Pappus nous le dépeint comme un homme vain, jaloux de la réputation des autres, et plus prompt à les dénigrer qu'à les applaudir. Nous n'en savons guère davantage sur sa biographie. Quant à l'époque de sa mort, on peut la fixer approximativement à 210, tablant sur ce fait avéré qu'il était contemporain de Ptolémée Philopator. Heureusement ses ouvrages nous ont été mieux conservés que le souvenir des particularités de son existence.

Son grand traité des *Sections coniques* est le summum de la Géométrie antique, le fronton de l'édifice dont Euclide avait solidement posé les bases. Dans Archimède on admirait surtout l'ingéniosité des démonstrations, les merveilleuses ressources d'un esprit toujours prêt à surmonter les difficultés imprévues qu'il rencontrait dans l'enfantement de son œuvre. Dans Apollonius il faudra principalement louer l'unité de vues, l'habileté avec laquelle il fera un tout homogène de théorèmes épars avant lui, car l'idée fondamentale qui perce dans

le cours de cet écrit, est de relier entre elles les sections diverses du cône qu'antérieurement, on avait considérées séparément et indépendamment l'une de l'autre. L'un s'occupe presque exclusivement de la Géométrie de la mesure, l'autre s'inquiète de celle de forme et de position.

Apollonius considéra le premier les sections faites dans un cône oblique, et fit rouler tout son ouvrage sur une propriété de ces courbes tenant à la nature même du solide qui les a engendrées et qu'on peut résumer comme il suit.

Soit un cône oblique à base circulaire, le plan mené par son axe normalement au plan de la base coupe le cône suivant deux arêtes, et détermine dans le cercle un diamètre. Il nomme « triangle par l'axe », celui qui a pour base ce diamètre et pour côtés les deux arêtes. Le géomètre alexandrin forme alors ses sections coniques en menant un plan perpendiculaire à celui du « triangle par l'axe ». Les points où ce plan rencontre les deux côtés de ce triangle sont les « sommets » de la courbe. Le diamètre qui joint ces deux points est le « *latus transversum* ». Concevons maintenant que par un de ces sommets on mène une perpendiculaire au plan du triangle précédent, ce sera le « *latus rectum* » ou paramètre, dont la longueur est déterminée par certaines expressions géométriques <sup>(1)</sup>. Si par l'extrémité de cette ligne on trace une droite à l'autre sommet de la section conique, et que par un point choisi arbitrairement sur la courbe on élève une « ordonnée », le carré de cette dernière comprise entre la courbe et le diamètre égalera le rectangle construit sur la portion de l'ordonnée s'étendant entre le diamètre et la droite.

(1) Telle est la suivante due à JACQUES BERNOULLI : Mener un plan parallèle à la base du cône, et à la même distance de son sommet que le plan de la section conique donnée, ce plan sectionnera le cône suivant un cercle dont le diamètre sera précisément le « *latus rectum* » de la conique considérée. Il sera facile, d'après cette considération, de placer, dans certains cas, une conique proposée sur un cône choisi. *Acta Eruditorum*. Leipzig, An. 1689.

Au début de son traité, Apollonius commence par définir le cône à base circulaire, et indique la façon dont sa surface est engendrée; puis il poursuit, dans le reste du premier livre, la génération des trois genres de sections coniques, et étudie les principales propriétés de chacune d'elles, entre autres celle qui lui servira de point de départ. On peut la traduire ainsi en langage moderne : Dans la *parabole*, le carré de l'ordonnée égale le rectangle ayant pour côtés l'abscisse et le paramètre. Dans l'*ellipse*, ce carré est plus petit, et dans l'*hyperbole* il est plus grand.

Les trois livres suivants sont consacrés aux diamètres, aux axes, aux asymptotes; et quelques-uns des théorèmes énoncés ont servi de bases à d'intéressantes recherches effectuées au cours de notre siècle; l'un d'eux a été l'origine de très intéressants travaux sur les points *harmoniques*.

Ce sont là les seuls fragments des *Sections coniques* qui soient parvenus jusqu'à nous dans leur langue originale. Les livres V à VIII ne nous ont été conservés que par une traduction arabe. Apollonius s'occupe dans le premier de ceux-ci de sujets importants. Les problèmes de maxima et de minima s'y trouvent envisagés. Il détermine, en effet, « les plus grandes et les moindres » lignes joignant le périmètre d'une section conique à un point donné, dans les divers cas qui peuvent se présenter suivant la position de ce dernier. A ce propos, il donne des solutions aussi aisées qu'élégantes. Si nos méthodes analytiques actuelles nous ont fait découvrir bien d'autres propriétés de ces courbes, on ne saurait oublier que, sans leur secours, ce sagace géomètre est allé fort loin. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, la détermination des développées s'y rencontre déjà.

L'étude de la similitude des sections coniques est faite dans le sixième livre, et diverses autres questions dans le genre de la suivante : Couper un cône de façon

que la section ait des dimensions données, y sont également traitées. Le livre VII renferme des théorèmes roulant sur les propriétés des axes et des diamètres conjugués ; en particulier, cette proposition fondamentale : dans l'ellipse ou l'hyperbole, la somme ou la différence des carrés des axes égale la somme ou la différence des carrés de deux diamètres conjugués. Halley, astronome anglais, s'est inspiré de ces passages pour restituer le huitième et dernier livre qui, dans sa pensée, continue directement le précédent et qu'on ne possédait que tronqué. Aussi sa belle édition d'Apollonius publiée à Oxford en 1710 est-elle très recherchée. Un érudit allemand, Heiberg, en a édité une nouvelle réimpression qui a paru à Leipzig, en 1891-93, accompagnée d'une traduction latine. Elle comprend les quatre premiers livres, les fragments et les commentaires de Pappus et d'Eutocius.

On attribue au savant géomètre alexandrin un *De sectione rationis* et un *De tactionibus* que Viète au xvi<sup>e</sup> siècle a essayé de restaurer d'après quelques passages isolés. Il contenait le célèbre problème : Trois cercles étant donnés, trouver un quatrième qui les touche tous les trois. Il avait été proposé par le génial algébriste au Hollandais Adrianus Romanus. Par l'intersection de deux hyperboles, celui-ci détermina le centre cherché, mais Viète répondit simplement en s'adressant à la Géométrie ordinaire.

Robert Simson a tenté de reconstituer d'après certaines données un autre ouvrage perdu : le *De sectione determinata*, et Fermat le *De locis planis* dont on ne connaissait guère que le titre. Mais laissons là cette gymnastique intellectuelle. Apollonius a composé son admirable livre des *Sections coniques* sur lequel tant de ses successeurs ont vécu : cela suffit à sa gloire.

Après lui, l'École d'Alexandrie s'oriente vers un but moins spéculatif, en cherchant à appliquer les découvertes mathématiques aux progrès de la Mécanique et de l'Astronomie. Dans la période que nous allons par-

courir, la Science va revêtir un caractère de plus en plus utilitaire.

Archimède avait déjà inauguré ce genre de recherches. Son successeur immédiat ÉRATOSTHÈNE, né en 275 avant Jésus-Christ, le continua. Originaire de Cyrène, celui-ci fit son éducation à Alexandrie et à Athènes, puis revint dans la ville des Ptolémée, où il fut élevé très jeune au poste de Conservateur de la célèbre Bibliothèque. Génie encyclopédique, à la fois orateur et mathématicien, géographe et archéologue, philosophe et poète, il ne dédaigna même pas les sports, puisqu'on lui décerna le titre de : « Pentathlos », nom donné à l'athlète vainqueur dans les cinq luttes des Jeux Olympiques.

Nous laisserons de côté, dans son œuvre, la partie astronomique, de beaucoup cependant la plus importante puisqu'il parvint à déterminer avec une approximation suffisante la longueur du méridien terrestre, et qu'il dota l'observatoire du Musée d'instruments assez parfaits pour servir, durant plusieurs siècles, aux savants d'Alexandrie.

D'abord nous mentionnerons ses travaux relatifs aux *nombres premiers*, sur lesquels Euclide avait déjà fait quelques remarques. L'élimination des nombres pairs, tous aisément reconnaissables, est aisée mais avec les nombres impairs les difficultés commencent. Aussi, pour effectuer le triage dans la série naturelle des nombres, Ératosthène eut l'idée de son *crible*. Il écrivit tous les nombres impairs à partir de 3, puis observant que de 3 en 3, de 5 en 5, de 7 en 7 etc., les nombres rencontrés sont multiples de 3, 5, 7, ou, d'une façon générale, si on désigne par  $2p + 1$  la série des nombres impairs tous ceux qui dans cette liste se trouvent au premier rang doivent être barrés. Ils ont, en effet, d'autres diviseurs qu'eux-mêmes et l'unité : ils ne sont donc pas premiers. Mais une fois cette séparation effectuée, les nombres restants le sont.

Cette méthode indirecte est facile pour les nombres

usuels, mais elle se complique lorsqu'on parvient aux chiffres élevés. Ainsi on a calculé qu'il faudrait dix à douze jours de travail<sup>1</sup> pour composer la table des nombres premiers de 1 à 1 000 000. Malgré les tentatives faites jusqu'ici on n'a pas encore su découvrir un procédé direct plus expéditif. Notons cependant que la règle suivante permet d'abrégier la formation du crible d'Ératosthène. Il suffit de s'arrêter lorsqu'on est conduit à effacer les multiples d'un nombre premier dont le carré est supérieur à la limite proposée. Si par exemple on désire simplement avoir la série des nombres premiers inférieurs à 100 comme  $7^2 = 49$  et  $11^2 = 121$ , l'opération sera terminée lorsqu'on aura supprimé les multiples de 7. Cette remarque, datant seulement du xvi<sup>e</sup> siècle, est basée sur le théorème : un nombre est premier quand il n'est divisible par aucun des nombres premiers dont les carrés sont moindres que ce nombre.

Ératosthène aurait encore composé, d'après Pappus, un traité de la duplication du cube dont il ne nous reste rien. Enfin, devenu aveugle à la suite d'une ophthalmie, ce savant se laissa mourir de faim peu de temps après.

Avec lui se termine la belle période de la Science hellène ouverte par Euclide, continuée par Archimède et Apollonius. Nous n'aurons plus que quelques noms véritablement remarquables à opposer à ces génies immortels. Un géomètre, Pappus, les astronomes Hipparque et Ptolémée qui jetteront les bases de la Trigonométrie ; enfin Diophante qu'on a l'habitude de considérer comme inventeur de l'algèbre. Confinés par la tradition dans les méthodes particulières, les Grecs, comme leurs successeurs du moyen âge, manquèrent de l'esprit de généralisation. Il nous faudra attendre la venue des Viète, des Fermat et des Descartes, pour voir une nouvelle ère de prospérité se lever sur les Mathématiques.

---

(1) BOSSUT. *Histoire générale des mathématiques*, t. I. Paris, 1810.

Passons en revue maintenant les savants qui eurent une certaine célébrité parmi leurs contemporains.

HYSICLÈS ajouta aux Éléments d'Euclide un quatorzième livre, se rapportant aux solides réguliers. NICOMÈDE, qui, si l'on en croit Eutocius et Proclus, florissait à l'époque d'Ératosthène, découvrit la *conchoïde*<sup>1</sup> dont voici la définition. Si d'un point fixe P on trace une ligne coupant une droite donnée fixe en Q, et si S est pris sur PQ de façon que la longueur QS soit constante, le lieu du point P est la conchoïde. Ce mathématicien s'en servait pour résoudre par un procédé mécanique le problème des deux moyennes proportionnelles et celui de la duplication du cube. A la fin du XVII<sup>e</sup> siècle et dans la première moitié du XVIII<sup>e</sup> cette courbe redevint à la mode. De La Hire et de Mairan en France s'en occupèrent d'une manière particulière, et en Angleterre Newton l'appliqua à la recherche des propriétés des courbes du troisième et du quatrième degré.

La *cissoïde* fut trouvée à peu près vers la même époque par DIOCLÈS<sup>2</sup>. D'après Eutocius, ce dernier la définissait ainsi : AOA', BOB' sont deux diamètres fixes d'un cercle se coupant à angle droit. On mène deux cordes CC', DD' parallèles à BOB' et à égales distances de cette droite. Le lieu des intersections de AC et DD' sera la courbe en question qu'il employait pour résoudre le problème des deux moyennes proportionnelles entre deux longueurs données. A l'aide des sections coniques, Dioclès trouva également la solution de la question suivante. Tracer un plan qui partage la sphère en deux parties dont les volumes soient entre eux dans un rapport donné.

Vers ce temps, vivait probablement PERSEUS de Citium. Selon Geminus il aurait inventé les *spiriques*,

(1) Voir au sujet de cette courbe et des suivantes, les excellentes *Notes de bibliographie des courbes géométriques* par H. Brocard. Bar-le-Duc, 1897-99.

(2) SUTER. *Geschichte der mathematischen Wissenschaften*, 2<sup>e</sup> édit. Zurich, 1873.

courbes engendrées par les sections d'un solide formé par la révolution d'un cercle tournant autour d'une de ses cordes comme axe.

Un peu après nous trouvons ZÉXODORE qui s'occupa d'un sujet neuf, les *figures isopérimétriques*. Deux mathématiciens grecs, Pappus et Théon, nous ont conservé quelques-uns des théorèmes qu'il découvrit. Parmi ceux-ci citons les suivants, élémentaires aujourd'hui :

Le cercle a une plus grande surface qu'un polygone régulier quelconque d'un égal périmètre.

De tous les polygones isopérimétriques d'un nombre  $n$  de côtés, le polygone régulier est le plus grand.

Des segments de cercle ayant des arcs égaux, le demi-cercle est le plus grand.

De tous les solides ayant des surfaces égales, la sphère est celle qui a le plus grand volume.

Mais si le commencement du  $11^{\text{e}}$  siècle fut, somme toute, assez pauvre au point de vue scientifique, l'astronome HIPPARQUE va lui redonner quelque lustre à son déclin. Ses observations ne sont pas de notre ressort. Examinons toutefois ceux de ses travaux qui ont exigé l'emploi de nouvelles méthodes mathématiques.

Né à Nicée, en Bithynie, il vécut plusieurs années à Alexandrie, mais il passa à Rhodes la plus grande partie de son existence que Delambre<sup>1</sup>, par une sagace interprétation d'un passage de son livre, a fixée au  $11^{\text{e}}$  siècle.

Presque tous les ouvrages du savant nicéen sont aujourd'hui perdus; aussi nous en sommes réduits pour l'exposé de ses découvertes à ce que Ptolémée,

---

(1) DELAMBRE. *Histoire de l'astronomie ancienne*, t. I. Paris, 1817. En effet, Hipparque dit en un endroit de son livre, que la longitude d'une étoile ( $\gamma$  du Chien) avait  $90^{\circ}$  au moment où il la détermina. Admettons l'exactitude de ce chiffre — et on peut le faire quand il s'agit d'un observateur aussi consciencieux — comme en 1750 la même coordonnée était de  $116^{\circ}4'10''$  et comme le premier point d'Aries recule de  $50'',2$  par an, il est aisé de fixer à 120 ans avant Jésus-Christ, l'époque où la détermination a été effectuée. ROUSE BALL. *A short account of the History of Mathematics*. Londres, 1888.

Théon d'Alexandrie et Pline le naturaliste nous apprennent. Son court *Commentaire d'Aratus* nous est seul parvenu, mais il est peu important puisqu'il s'y borne à rectifier les erreurs de ce poème astronomique.

Parmi ses découvertes rappelons-en quelques-unes. Il détermina la durée des révolutions de la Lune, calcula l'excentricité de son orbite, l'inclinaison de celle-ci sur l'écliptique, et remarqua les mouvements inverses des lignes des apsides et des nœuds de notre satellite. Il fixa également l'excentricité de l'orbite solaire à  $\frac{1}{24}$  mais surtout il découvrit la précession des équinoxes. Enfin, sans insister sur ses hypothèses pour expliquer le mouvement lunaire et sur la série de ses observations planétaires, disons que Ptolémée n'eut guère qu'à perfectionner et à étendre les méthodes indiquées par Hipparque pour composer son immortel *Almageste*. Du reste la Mécanique céleste progressa peu de cette époque jusqu'à Copernic.

Pour obtenir dans ses observations une si merveilleuse précision et en tirer de si justes déductions, Hipparque avait eu besoin de connaître et de démontrer les principales formules de Trigonométrie rectiligne et sphérique. C'était sans doute l'objet des 12 livres de sa *Table des cordes*. Malheureusement nous ne pouvons que faire des conjectures sur ce point.

Une autre branche des Mathématiques appliquées, la *Géodésie*, prit naissance vers cette époque. Nous possédons, en effet, six à sept recueils de questions métriques sous le nom de HÉRON d'Alexandrie, mais leur rédaction appartient certainement à des époques différentes<sup>1</sup>. Le fond tout au plus serait le bien de ce géomètre, et nous serions en présence de textes rajeunis au fur et à mesure des besoins. On lui attribue également un livre *Sur la Dioptre*, dont l'authenticité paraît mieux établie. Il y décrit un appareil destiné à mesurer les

---

(1) PAUL TANNERY. *La Géométrie grecque*. Paris, 1887.

angles, puis il termine par une table des poids et mesures.

Entre autres particularités dignes de remarque, on rencontre dans cet ouvrage la plus ancienne démonstration de la formule qui donne l'aire d'un triangle en fonction de ses côtés.

Héron avait aussi composé un traité sur les *Pneumatiques* et les *Automates*. Ce dernier est fort intéressant, car on y rencontre des objets d'amusement, de véritables jouets scientifiques dans le genre de ceux qui devaient vingt siècles plus tard immortaliser Vaucanson. On y voit même une description d'une machine à vapeur rudimentaire qui probablement resta simplement à l'état de modèle; en tous cas elle ne semble pas avoir servi dans la pratique après la mort de son inventeur.

Un autre savant, DIONYSIORE dirigea aussi ses recherches vers un but utilitaire. Né à Emèse, en Syrie d'après Strabon, et à Mélos suivant Pline, il s'acquît auprès de ses concitoyens une grande réputation en Géométrie. Son nom est resté attaché à une des meilleures déterminations anciennes du rayon terrestre qu'il estimait à 42.000 stades, soit une longueur trop courte de 800 kilomètres environ. On lui doit encore une solution du problème d'Archimède, consistant à diviser un hémisphère, par un plan parallèle à sa base, en deux parties dont les volumes soient entre eux dans un rapport donné.

Les Mathématiques pures n'étaient d'ailleurs pas complètement dédaignées dans le siècle qui précéda l'ère chrétienne. Quelques savants, en dehors de l'École d'Alexandrie, s'y adonnèrent. Citons les plus marquants.

THÉODOSE, de Tripoli, nous a laissé trois livres sur *Les sphériques*, dans lesquels se trouvent plusieurs théorèmes continuellement usités aujourd'hui. Peut-être étaient-ils connus avant lui? Se trouve-t-on en présence d'une compilation? Question délicate à trancher.

Voici toujours quelques-unes des propositions qu'ils renferment :

Tout cercle dont le plan passe par le centre de la sphère est un grand cercle. Une ligne droite tracée du centre de la sphère normalement au plan d'un petit cercle, passe par le centre de ce dernier et par son pôle. Tout grand cercle qui en coupe un autre orthogonalement passe par ses pôles, et réciproquement.

Quant à GEMINUS, astronome et mathématicien, il semble même avoir une certaine valeur pour l'époque. On ignore l'endroit où il vécut, mais on doit fixer la composition de son *Introduction aux phénomènes* aux environs de notre ère. C'est un traité de Cosmographie : il ne doit donc pas nous retenir. Dans un autre travail, il a le premier étudié le classement philosophique des Mathématiques, et bien que cet ouvrage ne nous ait pas été conservé, nous possédons, grâce à Proclus, assez de renseignements pour suivre la filiation de ses idées.

Geminus considère d'une part la science qui s'occupe seulement « des choses intelligibles », et d'autre part celle qui concerne « les choses sensibles ». La première est constituée par l'Arithmétique et la Géométrie; la seconde par la Mécanique, l'Astrologie, l'Optique, la Géodésie, la Canonique et la Logistique.

A son tour, la Géométrie se divise en théorie du plan et en Stéréométrie, car, en général, son but est de construire des figures planes et solides, ou bien de comparer et de diviser les figures construites. On partage de même l'Arithmétique en théorie des nombres linéaires, plans, solides; c'est-à-dire que, dans cette branche des mathématiques, on considère les « espèces du nombre en elles-mêmes dans leur progression à partir de l'unité, la génération des nombres semblables et dissemblables [*carrés* ou *hétéromèques* de forme  $p(p + 1)$ ], et les augmentations suivant la troisième dimension [*cubes*] ».

La Géodésie et la Logistique sont analogues aux deux parties précédentes de la science, mais au lieu de traiter des nombres ou des figures intelligibles elles s'occupent des choses sensibles correspondantes. L'Optique dérive comme la Canonique, de la Géométrie : celle-là emploie les lignes de la vision et les angles qu'elle forme ; celle-ci étudie les rapports expérimentaux des longueurs harmoniques, et recherche les dimensions des canons, c'est-à-dire les règles qui servent à déterminer les cordes de la lyre. La Mécanique considère les objets matériels. Elle se sectionne en plusieurs branches : l'*organopéique* ou construction des engins de guerre, la *thaumatopéique* ou composition d'artifices merveilleux. Envisagée à d'autres points de vue, la Mécanique comporte la connaissance de l'équilibre, la *sphérogée* qui imite les révolutions célestes, en un mot la cinétique de la matière. Enfin l'Astrologie traite du système du monde, de la grandeur et de la forme des astres, de leur distance à la Terre, etc. Elle comprend la Gnomonique qui enseigne la détermination des heures, la *météoroscopique* ou calcul des hauteurs des corps célestes, et la Dioptrique qui s'occupe de fixer leurs positions à l'aide d'instruments appropriés.

Cette classification, malgré ses imperfections, était préférable à celle des Pythagoriciens.

Les derniers mathématiciens dont nous venons de passer en revue les œuvres n'ont guère contribué à augmenter le nombre des découvertes de leurs prédécesseurs. D'ailleurs, au moment où l'Ecole d'Alexandrie commençait à languir, une révolution politique s'accomplissait. En l'an 30 avant notre ère, César-Auguste détrône les successeurs de Ptolémée. Dès lors l'Égypte n'est plus une nation, c'est une simple province de l'Empire administrée par un gouverneur. Aussi son Université va-t-elle se ressentir de ces commotions, et la chute des Lagides marquera pour la Mathématique

une nouvelle ère. L'Astronomie s'élèvera encore avec Ptolémée. Diophante créera l'Algèbre, mais la Géométrie n'aura plus à opposer aux chefs-d'œuvre des Euclide, des Archimède et des Apollonius, que les utiles mais pâles commentaires de Pappus. L'âge d'or de la science grecque est bien fini.

---

## CHAPITRE VI

### **Les Mathématiques en Égypte et en Grèce, du I<sup>er</sup> au V<sup>e</sup> siècle. — Établissement de la Trigonométrie sphérique, et naissance de l'Algèbre.**

Sans fermer ses portes, l'Ecole d'Alexandrie se modifia profondément. Ses nouveaux maîtres et l'introduction du christianisme <sup>1</sup> bouleversèrent son enseignement. Les idées de Platon et de Pythagore se fondirent avec la doctrine naissante, voilà pourquoi on a l'habitude de considérer les savants alexandrins de cette période comme formant une seconde Ecole. Si au point de vue de l'histoire philosophique cette distinction a sa raison d'être, il ne saurait en être de même pour la science dont nous esquissons ici les étapes ; nous avons donc jugé inutile de nous en inquiéter.

En passant sous silence les commentateurs d'Archimède et d'Apollonius, le premier auteur que nous puissions citer est le Lesbien SÉRÉNUS, originaire

---

(1) Au sujet de l'influence du christianisme sur les mathématiques, voici l'opinion de M. PAUL TANNERY, ce juge si compétent dans ce qui touche l'histoire de la science hellène : « Si l'on compte comme chrétiens, ainsi que j'ai indiqué qu'on pouvait le faire, Diophante, Anatolius, Eutocius, avec Jean Philopon et l'Ecole d'Anthémius, si l'on considère Pappus comme partagé entre le christianisme et le paganisme, il ne reste à l'actif de cette dernière religion, pendant la même période, que Théon d'Alexandrie, sa fille Hypatia, avec Porphyre, Jamblique et l'Ecole d'Athènes pour les commentateurs sur Euclide et Nicomaque. En faisant la balance, on trouvera sans peine que les travaux les plus importants, ceux où il y a plus de vie et d'idées neuves, sont du côté du christianisme ». *Annales de philosophie chrétienne*, 66<sup>e</sup> an., t. XXXIV. Paris, 1896.

d'Antissa. Il composa deux livres *Sur les sections du cylindre et du cône*, où il enseigne d'abord à résoudre le problème : étant donné un cône, trouver un cylindre de telle sorte que les sections des deux par le même plan soient des ellipses semblables. Puis il se livre à d'intéressantes considérations sur ce sujet, et en particulier il formule la proposition suivante qui peut être considérée comme la base de

la théorie moderne des harmoniques. Énonçons-la ainsi. Si d'un point P on trace une ligne PEF coupant le triangle ABC, et si on prend un point F




Fig. 8.

sur cette droite de façon que  $\frac{PE}{PD} = \frac{EF}{FD}$  et si on mène la ligne BF, chaque transversale issue de P, telle que PK, sera divisée par BH dans le rapport  $\frac{PG}{PK} = \frac{HG}{HK}$ .

Avec MÉNÉLAUS nous entrons dans une nouvelle phase de l'histoire mathématique, la Trigonométrie sphérique est érigée en corps de doctrine. Ce géomètre, qui florissait à Alexandrie à la fin du 1<sup>er</sup> siècle de notre ère, avait écrit un traité intitulé *Des sphériques*, dont l'original grec ne nous est pas parvenu mais dont nous possédons une traduction latine faite par Halley sur des versions hébraïques et arabes et publiée à Oxford en 1758. On y rencontre l'important théorème, fondement de cette partie de la Science chez les Anciens, à savoir la propriété des six segments déterminés sur les trois côtés d'un triangle sphérique, par un arc de grand cercle.

Pour démontrer la « règle d'intersection », comme les Arabes appelèrent cette proposition, Ménélauus procéda par analogie, en s'appuyant sur le lemme suivant de Ptolémée : quand une transversale coupe les trois côtés d'un triangle, le produit des segments n'ayant pas d'extrémités communes égale le produit des trois autres. Dans notre siècle, Carnot, en faisant de ce théo-

rème la base de sa théorie des transversales, lui a donné une réelle importance.

Nous ne nous appesantirons guère sur NICOMAUQUE et THÉON, deux mathématiciens sans grande originalité. Le premier naquit à Gérase vers l'an 50, et son *Introduction arithmétique* a joui pendant longtemps d'une grande autorité. C'est un memento des idées pythagoriciennes sur ce sujet. Remaniée et abrégée par BOËCE, cette compilation de connaissances acquises antérieurement fut le vade-mecum de tous ceux qui, au Moyen Age, se livraient aux études mathématiques. Parmi le petit nombre des propositions qui semblent appartenir à l'auteur, on range la suivante : les cubes sont toujours égaux à la somme des nombres impairs successifs. Par exemple,  $8$  ou  $2^3$  égale  $3 + 5$  ;  $27$  ou  $3^3$  égale  $7 + 9 + 11$ , et de la sorte jusqu'à l'infini.

Comme son prédécesseur, Théon, né à Smyrne dans la première moitié du II<sup>e</sup> siècle de notre ère, nous a laissé dans ses *Choses qui sont utiles pour la lecture de Platon*, des études sur les nombres. Après un discours sur l'Histoire des Mathématiques, contenant divers préceptes aussi bien sur la Musique et la Géométrie que sur la peste et les moyens de la faire disparaître, l'auteur aborde l'Arithmétique, la « première des sciences » à son avis ; puis il entretient son lecteur de l'unité. Il classe ensuite les nombres, et leur découvre de singulières propriétés. Relatons-les, car l'historien doit non seulement parler des brillantes découvertes, mais s'inquiéter encore des travaux oiseux ou négatifs qu'il rencontre.

Les nombres premiers sont dits indécomposables, linéaires, euthymétriques et impairement impairs. Nous glisserons sur ces définitions. Les « composés » mesurent un autre nombre. On les nomme « plans » quand ils ont longueur et largeur. (Ex. :  $6 = 2 \times 3$ ) et « solides » lorsqu'ils possèdent les trois dimensions (Ex. :  $30 = 2 \times 3 \times 5$ ). Si nous passons aux catégories, les nombres

pairs pourront être « pairement pairs » (Ex. :  $8 = 2 \times 4$ ) ou « pairement impairs » (Ex. :  $6 = 2 \times 3$ ). Nous voyons encore les « æqualiter æqualibus » (Ex. :  $4 = 2 \times 2$ ), les « inæqualiter inæqualibus » décomposables en nombres inégaux (Ex. :  $6 = 2 \times 3$ ), les nombres « altera pars longiores » comme 12 dont la longueur 4 dépasse la largeur 3 de l'unité. Ceux-ci sont toujours pairs, car si l'une de leurs dimensions ne l'est pas, l'autre l'est. L'arithméticien d'Alexandrie donne enfin les formules pour sommer les  $n$  premiers nombres pairs ou carrés, mais sans fournir aucune démonstration.

Restons-en là. Cela nous suffit pour montrer, selon une expression contemporaine, « l'état d'âme » des Pythagoriciens en ce qui concerne l'Arithmétique. On comprend alors pourquoi les géomètres grecs traitaient avec tant de mépris la science des disciples de Pythagore, et si, comme le remarque avec juste raison M. Paul Tannery, la forme de l'exposition est la propriété de ces deux commentateurs, elle constitue un irrécusable symptôme de décadence.

Abordons maintenant l'œuvre du grand PTOLÉMÉE, de celui qui redonna quelque lustre à l'Ecole d'Alexandrie.

Comme il cultiva beaucoup plus l'Astronomie que la Mathématique, nous n'aurons à nous occuper ici que de la plus faible partie de son labeur, et cependant la moisson sera encore ample. Ce qu'on sait de sa biographie est court. Toutefois les historiens s'accordent pour fixer les premières observations rapportées dans son *Almageste*, à l'an 125, et les dernières à l'an 150. Il observait avec les instruments du Musée, qu'il perfectionna. Sans doute il emprunta pas mal à Hipparque et à ses prédécesseurs alexandrins; mais bien des idées neuves sur la Mécanique céleste lui sont dues. Voici le fondement de son système. La Terre occupe le centre de l'univers; les planètes et le Soleil tournent autour d'elle. Jusqu'à Copernic il régna avec une autorité incontestée. Il fut pour les astronomes ce qu'Aris-

tote était pour les philosophes. Après on le décria, autant qu'on l'avait loué.

Nous pouvons être plus justes. Si ses hypothèses sont compliquées, elles sont marquées au coin de la plus grande originalité et il prépara les voies à Képler qui les aplanit lui-même à Newton. Au point de vue spécial des Mathématiques pures, il apporta d'importants perfectionnements à la Trigonométrie sphérique. D'autre part, si la méthode sexagésimale de division du cercle remonte aux Babyloniens, si Geminus et Hipparque s'en sont servis, le procédé de calcul, pour déduire des cordes de deux arcs les cordes de leur somme ou de leur différence, appartient à Ptolémée. Il considéra le premier les trois axes rectangulaires que nous employons actuellement en Géométrie analytique pour fixer la position d'un point dans l'espace. En outre, on le regarde comme l'inventeur des projections stéréographiques et comme le pionnier des théories de la vision et de la réfraction atmosphérique. Résumons-nous donc. Ptolémée, quelle que soit sa part personnelle dans l'*Almageste*, eut l'incontestable mérite d'appliquer d'une façon méthodique la Géométrie et la Trigonométrie à l'Astronomie. Malgré cela, il n'eut pas d'imitateurs dans la route qu'il avait si remarquablement ouverte. Un siècle et demi sera stérile, car les écrits d'Anatolius qui occupa la chaire de l'enseignement aristotélique à Alexandrie, et devint plus tard évêque de Laodicée, pas plus que ceux du philosophe Plotin, de son disciple Phorphyre et de son contemporain Jamblique n'apportèrent de contributions utiles à l'évolution des Mathématiques.

Il nous faut arriver à PAPPIUS pour rencontrer un homme de quelque envergure scientifique. Les renseignements biographiques le concernant sont très succincts. On sait simplement qu'il vivait à Alexandrie au IV<sup>e</sup> siècle. Un seul de ses ouvrages, les *Collections mathématiques*, nous est parvenu et, autant qu'on peut

en juger par la lecture, le but qu'il se propose était d'initier, grâce à des commentaires, les géomètres de son époque aux travaux antérieurs les plus arides. Huit livres, dont le premier et une partie du second, sont aujourd'hui perdus, les composaient.

Parmi les propositions y insérées, citons le théorème connu aujourd'hui sous le nom de Guldin parce que ce savant jésuite le redécouvrit au  $xvii^e$  siècle : le volume engendré par la révolution d'une courbe plane complètement située d'un même côté de son axe de rotation, égale le produit de la surface plane génératrice par la circonférence que décrit son centre de gravité. Puis la recherche des propriétés de la *quadratrice* de Dinostrate l'occupe aussi. Il donne à ce propos deux modes de construction de cette courbe, dont voici le premier. Soit une hélice tracée sur un cylindre droit circulaire. De chaque point de celle-ci on abaisse des perpendiculaires sur l'axe du cylindre. On forme ainsi la surface hélicoïde rampante. Un plan passant par une de ces droites et faisant un angle convenable avec la base du cylindre, coupe la surface hélicoïde suivant une ligne dont la projection orthogonale sur la même base est la quadratrice cherchée.

Un peu plus loin il étudie encore la spirale sphérique obtenue par le mouvement uniforme d'un point sur un grand cercle de la sphère, ce dernier tournant lui-même autour de son diamètre. Il exprime l'aire de la portion de surface comprise entre cette courbe et sa base ; c'est donc Pappus qui donna le premier exemple de la quadrature d'une surface courbe.

Notons qu'on rencontre dans les *Collections mathématiques* la relation fondamentale du rapport anharmonique de quatre points, devenue entre les mains de Chasles la base des théories modernes de l'homographie et de l'involution. Une autre question, célèbre dans l'antiquité et à laquelle Newton et Descartes ont redonné plus tard un regain d'actualité, s'y trouve

également. On la désigne sous le nom de « problème de Pappus », et elle peut s'énoncer ainsi : Plusieurs droites étant données, trouver le lieu géométrique d'un point tel que les perpendiculaires (ou d'une façon plus générale les obliques inclinées sous certains angles) satisfassent à la condition que le produit de certaines d'entre elles soit dans un rapport constant avec le produit de toutes les autres. Ce théorème, qui se rattache à la théorie des transversales, avait été résolu par Euclide et Apollonius seulement dans le cas de trois ou quatre droites. Le lieu est alors une conique. Il découle de ce résultat la propriété remarquable de ce genre de courbe : quand un quadrilatère quelconque est inscrit à une conique, le produit des distances de chaque point de celle-ci à deux côtés opposés du quadrilatère, est au produit des distances du même point aux deux autres côtés, dans un rapport constant. Cette proposition a très utilement guidé Pascal et Desargues, et elle est regardée par Chasles comme « la plus universelle et la plus féconde de toutes les propriétés »<sup>(1)</sup> des coniques.

Bien d'autres sujets sont envisagés au cours des *Collections mathématiques*, mais nous sommes forcés d'y renvoyer le lecteur. Signalons toutefois, pour terminer, un exposé très net du but de l'analyse et de la synthèse. L'auteur donne parfois deux solutions du même problème, par l'une ou l'autre de ces méthodes.

Avec Pappus disparaît le dernier grand géomètre de l'antiquité. Une longue période s'écoulera avant que la Géométrie ne fasse de nouveaux progrès. Nous apercevrons çà et là quelques commentateurs des Euclide ou des Archimède, mais pas de découvertes originales. Cependant cette suite de siècles ne sera pas complètement stérile dans toutes les parties des Mathématiques, puisqu'une nouvelle science va naître avec DIOPHANTE.

---

(1) CHASLES. *Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en Géométrie*, 3<sup>e</sup> édit. Paris, 1889.

Mais pour prendre son merveilleux essor, l'algèbre devra attendre que le génie des Viète, des Descartes, des Leibniz et des Newton l'ait fécondée.

L'inventeur de ce puissant instrument de progrès, mourut à Alexandrie au commencement du v<sup>e</sup> siècle de l'ère chrétienne. Il était âgé de 84 ans. A la vérité, Ahmes, dans le papyrus conservé au British Museum de Londres, employa, selon le mot de Nesselmann, une « rhétorique algébrique »<sup>1</sup>, il raisonnait au moyen de mots sans faire usage de symboles, Pappus se servit de-ci de-là de quelques notations où le savant professeur de Heidelberg M. Moritz Cantor veut voir l'embryon de l'algèbre. Dans un papyrus grec très ancien on trouve des signes de l'addition et de la soustraction, et d'autre part, au dire de certains érudits, Diophante n'aurait eu que le facile mérite de systématiser des connaissances familières aux mathématiciens de son temps<sup>2</sup>. Il est donc peu commode de choisir au milieu de tant d'opinions contradictoires, et de fixer avec précision le degré d'originalité de son *Arithmétique*. Constatons donc qu'il s'y sert d'une nouvelle langue, qu'il en fit usage non seulement pour les questions déjà connues, mais qu'il sut également l'appliquer à de nombreux problèmes insolubles avant lui. Malgré cela, ses écrits eurent peu de vogue de son temps. Après sa mort on les oublia durant de longs siècles, et en 1460 seulement Régiomontanus les révéla au monde savant, une fois qu'il eut pris connaissance des fragments conservés dans un manuscrit du Vatican. Depuis lors on l'étudia, on le traduisit à plusieurs reprises, et le grand Fermat lui-même le commenta.

Contrairement à ce qu'à la vue de son titre des lecteurs modernes peuvent supposer, l'*Arithmétique* est presque uniquement consacrée à l'Algèbre, et en voici

(1) NESSELMANN. *Die Algebra der Griechen*. Berlin, 1842.

(2) COSSALI. *Origine, trasporto in Italia, primi progressi in essa dell' algebra*, t. I, Parme, 1797; CANTOR. *Vorlesungen über Geschichte der Mathematik*, t. I, Leipzig, 1880.

l'économie générale. D'abord sa notation diffère de la nôtre. Pour représenter la quantité inconnue il se sert du symbole  $\zeta'$  ou  $\zeta^{o'}$  et il la nomme  $\delta \acute{\alpha}\rho\iota\theta\mu\acute{o}\varsigma$ . Il appelle son carré  $\delta\acute{\omicron}\nu\alpha\mu\iota\varsigma$  et son cube,  $\kappa\acute{\upsilon}\beta\omicron\varsigma$ . Dans les calculs ces derniers sont désignés par leurs initiales  $\delta$  et  $\kappa$  combinées avec la seconde lettre  $\nu$  surmontée d'une barre horizontale et ainsi de suite jusqu'à la sixième puissance, l'auteur n'allant pas plus loin. Ci-joint le tableau résumant ces abréviations :

NOMS DES PUISSANCES DE L'INCONNUE	PREMIÈRE	CARRÉ	CUBE	CARRÉ- CARRÉ	CARRÉ- CUBE	CUBE- CUBE
SYMBOLES	$\zeta' \text{ ou } \zeta^{o'}$	$\delta \bar{\nu}$	$\kappa \bar{\nu}$	$\delta \delta \bar{\nu}$	$\delta \kappa \bar{\nu}$	$\kappa \kappa \bar{\nu}$

Une quantité déterminée est formée, d'après Diophante, d'un certain nombre d'unités ( $\mu\omicron\nu\acute{\alpha}\delta\epsilon\varsigma$ ) et il la note par le symbole  $\mu^o$ . Les coefficients des inconnues sont toujours des nombres. Il les place immédiatement après la quantité qu'ils multiplient. Aujourd'hui nous procédons d'une manière contraire. Quant aux signes des opérations, ils ne ressemblent pas non plus aux nôtres. Pour indiquer l'addition de deux termes on les juxtapose simplement. S'il s'agit, de les soustraire on place entre les deux une sorte de  $\frac{1}{2}$  renversé qui se rapporte à toutes les quantités qui le suivent. Les multiplications et les divisions n'ont pas d'indications propres; pourtant les Grecs mettaient fréquemment le dividende et le diviseur sous forme de fraction; enfin l'égalité se représente comme dans la figure particulière qu'on voit ci-dessous.

Les deux lignes suivantes montrent, en effet, la même équation, écrite dans la notation de Diophante et en caractères algébriques actuels :

$$\kappa^2 \bar{\alpha} \overline{\varsigma \varsigma} \bar{\eta} \text{ } \phi \text{ } \delta \bar{\delta} \bar{\epsilon} \text{ } \mu^o \bar{\alpha} \text{ } \iota \text{ } \varsigma \bar{\alpha}$$

$$(x^2 + 8x) - (5x^2 + 1) = x.$$

Ce qui précède, indique combien la langue algébrique a dû subir de perfectionnements avant de devenir le clair et simple langage d'aujourd'hui.

Dans son *Arithmétique*, Diophante constate aussi qu'un nombre négatif multiplié par un autre nombre négatif donne un nombre positif. Il applique ce principe à la multiplication de  $x-1$  par  $x-2$  par exemple ; cependant il ne concevait pas un nombre négatif existant par lui-même. Ainsi il considérerait comme un non-sens la différence  $3x-5$  dans laquelle  $3x$  aurait été moindre que 5. D'autre part, il ne formule pas son procédé de résolution de l'équation du second degré, il ne semble pas s'être rendu compte de la double racine car il rejette toujours, dans ses réponses, une quantité irrationnelle ou négative ; enfin, parmi les 130 problèmes qui nous sont parvenus, quelques-uns sont déterminés du premier ou du second degré, mais le plus grand nombre est indéterminé. Quant aux solutions, Diophante les obtient d'ailleurs à l'aide d'artifices de calcul, et il n'a pas en vue la généralisation des méthodes.

Tel est dans son ensemble l'*Arithmétique* de Diophante qu'HYPATIA avait commentée. Malheureusement ce travail ne nous est pas parvenu. Au dire des anciens, cette paraphrase ainsi que les notes écrites par la savante sur les Coniques d'Apollonius étaient remarquables. Fille de Théon, notre mathématicienne vit le jour à Alexandrie vers l'an 375 de notre ère<sup>1</sup>. Après avoir appris de son père la Géométrie, et des professeurs du Musée les rudiments des autres sciences, elle se rendit à Athènes où l'enseignement public jetait ses dernières lueurs, puis revint en Egypte professer dans la chaire qu'avait occupée Plotin. Son éloquence, son talent, sa beauté et ses vertus groupèrent autour d'elle de nombreux disciples venus de tous les points du monde. Malheureusement, elle eut une fin tragique.

---

(1) REBIÈRE. *Les femmes dans la Science*, 2<sup>e</sup> édit. Paris, 1897.

Au iv<sup>e</sup> siècle Alexandrie était partagée en trois camps rivaux : les païens, les juifs et les chrétiens dont la victoire commençait seulement à se dessiner. Hypatia était païenne. De là naquit une lutte entre le patriarche Cyrille et le préfet nommé Oreste qui, admirant son génie, suivait souvent ses conseils. Sur ces entrefaites, au mois de mars 415, un certain Hiérax, maître d'école chrétien, périt de mort violente, et ses amis répandirent le bruit qu'il avait été tué à l'instigation de la philosophe et du gouverneur. Alors des fanatiques ayant à leur tête Pierre, lecteur d'une église, arrachèrent un jour Hypatia de son char et la trainèrent dans Césarée où, après l'avoir dépouillée de ses vêtements, ils la lapidèrent, portant ensuite ses membres sanglants au Cinaron.

Ainsi mourut le dernier professeur qui illustra la chaire de Mathématiques de l'école d'Alexandrie. A partir de cette époque, leur enseignement va se concentrer à Athènes. Quelques noms seuls émergent de cette foule de compilateurs.

Proclus, le chef de l'école néo-platonicienne, écrivit, sur le premier livre d'Euclide, un commentaire précieux pour l'histoire de la Géométrie chez les Grecs. Il florissait vers le milieu du v<sup>e</sup> siècle. Parmi les successeurs de ce philosophe, qui cultivèrent la Science, un seul a une certaine importance : c'est Eutocius dont les annotations sur Apollonius et Archimède nous révèlent l'existence d'auteurs plus anciens, et nous ont permis d'en parler. Quant à Anthémios, l'architecte de l'église Sainte-Sophie de Constantinople, né à Trallès en Lydie, on croit qu'il professait les Mathématiques quand l'empereur Justinien le chargea de construire le monument qui devait le rendre plus célèbre que ses leçons.

Les mathématiciens athéniens de ce temps occupent donc une bien petite place dans l'histoire.

---

## CHAPITRE VII

### Les Mathématiques chez les Romains.

Pendant longtemps les Mathématiques ne pénétrèrent pas chez les Romains. Les conquérants du monde n'avaient guère le loisir de s'arrêter aux spéculations scientifiques. Pline ou Varron nous donnent seulement quelques lignes sur leur numération dactylique. Par différentes combinaisons des doigts et des phalanges de la main gauche, ils comptaient jusqu'à 99. Les mêmes signes répétés par leur dextre devenaient des centaines. Ainsi le petit doigt et l'annulaire repliés vers la paume de la main gauche, représentaient 2, à la droite il signifiait 200, et ainsi de suite. C'était là toute leur Arithmétique. La Géométrie enseignée dans les écoles de Rome ne s'élevait guère plus haut. Elle se bornait aux notions nécessaires aux arpenteurs (*agrimensores*). Les Italiens qui voulaient pousser plus loin leurs études dans cette voie, devaient se rendre à Alexandrie. C'est pourquoi nous ne nous appesantirons pas beaucoup sur les ouvrages relatifs à cette période. Ils ne nous sont d'ailleurs parvenus qu'en petit nombre ; et à quoi bon surcharger de noms obscurs une Histoire dans laquelle nous nous inquiétons avant tout de la filiation des idées et des méthodes ? Nous ne signalerons donc aucun mathématicien avant CASSIODORE, né vers 570 à Squillace (Calabre). Il devint successivement ministre de plusieurs rois des Ostrogoths, et se distraya des

affaires publiques en écrivant un traité *De institutione divinarum litterarum*, ou exposé des règles d'enseignement du *trivium* (Grammaire, Rhétorique, Logique) et du *quadrivium* (Arithmétique, Géométrie, Astronomie et Musique). Ce livre sans grande valeur scientifique a cependant été le vade-mecum de beaucoup d'étudiants au moyen âge. Quant aux Martianus Capella, aux Victorius et aux Priscien, nous les mentionnerons simplement sans nous y arrêter.

Les travaux de BOËCE dont nous allons nous occuper maintenant, offrent plus d'intérêt. Il appartenait à une des plus anciennes familles de l'aristocratie romaine. Après avoir commencé ses études à Rome, il alla les continuer à Athènes, et devint à son tour membre du Sénat. Lors de l'entrée de Théodoric dans la Ville Éternelle, il sut gagner ses bonnes grâces, et devint un de ses favoris.

Tout en remplissant les charges les plus importantes, il étudiait les ouvrages d'Aristote et de Platon. Mais son érudition, sa haute culture morale, bien au-dessus de son époque, ne pouvait être apprécié de ses barbares contemporains, et ses rivaux l'accusèrent de comploter avec l'empereur Justinien pour ruiner la domination des Ostrogoths, et affranchir Rome de leur joug. Théodoric, plus intelligent que ses conseillers, résista quelque peu, mais il finit par leur céder. Boèce fut emprisonné à Pavie, et étranglé en 526. Sa femme avait partagé son exil, comme le prouve une épitaphe conservée à Saint-Pierre de Rome <sup>1</sup>.

Parmi ses œuvres, son *Arithmétique* n'est qu'une copie, mal digérée d'ailleurs, de celle de Nicomaque. Son *Ars geometriæ*, dont nous donnons ci-contre le fac-similé d'une page, est plus curieux. C'est lui qui fit connaître aux Latins la science euclidienne. Il débute par une traduction littérale ou peu s'en faut des définitions des quatre premiers livres du mathématicien grec, mais les

(1) HEILBRONNER. *Historia Matheseos universae*. Leipzig, 1742.

Circulus circuli n̄ contingere dī. q̄ aī circuli tūgit. in utraq̄ cuncta parte n̄ sicut circuli. Circuli inuicē contingere dicunt. q̄ tangen-tes tēse inuicē faciunt.

Recte linee in circulo equalit̄ a centro distare dicunt. quando a centro in ipsas ducte ppendiculares inuicē sibi sunt equalit̄. Plus ū ā circulo distare dī linea. in qua ppendicularit̄ longior cadit.

Portio circuli ē figura. quē sub recta linea & circuli circūferen- tia aliquid puncti. & ab eodē puncto ad lineę terminos duc recte lineę subiunguntur. Angulus circuli dī. qui sub duob; subiunctis lineis tenetur. quando lineę quę adiungunt̄ aliqua circūferentia comprehendunt partem. ut in ea angulus consistere phibeatur. Sector circuli ē figura. quē sub duob; a centro ductis lineis & sub circūferentia q̄ ab eisdē cōphenduntur continetur.

Similes circulay portiones dicunt. q̄ eīles suscipiunt angulū. & quib; q̄ inscribunt anguli sibi inuicē sunt equalit̄.

Figura una figura dī inscribi. quando ea quę inscribit̄ ei inq̄ inscribit̄ latera unoq̄ suo angulo ab utroque parte ctingit.

Figura ū figurę circūscribi phibeatur. quent̄ ea quę circūscribit̄ figurę ei cui circūscribit̄ suis omib; laterib; omis angulū tangit.



Supra dictā rectā lineā terminatā. tangulū q̄ latera cōstruere. Ad datū punctū datę lineę. equalē rectā lineā collocare. Duab; rectis lineis in q̄ lib; datis. a maiore minore equalē rectā lineā abscide.

Si duo trianguli duob; laterib; habent equa alterū alteri. & angulū angulū habent equū. cū q̄ sub equalib; rectis lineis cōnectur. & huiusmodi equalē habebunt. & tangulū tangulo equū erit. & reliq̄ angulū reliq̄ angulū erit equalit̄ alt̄ alteri. sub q̄b; equalia latera suspenduntur. Si triangulū equalia latera habent. q̄ sub ei huiusmodi tangulū

Fig. 9. — Manuscrit de l'Ars geometriæ de Boëce.

(Bibliothèque Nationale de Paris, fond. latin n° 7377, fol. 41 verso.  
Propositions sur le cercle et les angles.)

démonstrations sont omises. Puis viennent des extraits de Balbus Mensor, arpenteur romain, continués par une compilation dont les éléments sont puisés dans les écrits d'autres agrimenseurs, tels Hyginus, Frontinus, Epaphroditus et Nipsus. L'authenticité de cet ouvrage, qui eut une grande vogue pendant tout le Moyen Age, est mise en doute par certains érudits modernes. M. Paul Tannery l'estime indigne de Boèce, et croit « qu'on se trouve en présence de l'œuvre d'un faussaire ignorant et maladroit qui était probablement un arpenteur de profession vivant au plus tôt dans le ix<sup>e</sup> ou le x<sup>e</sup> siècle ». M. Cantor pense que le fond lui appartient bien, mais que le style a été défigurés par des copistes.

L'intérêt de la controverse réside surtout dans le passage suivant de la *Géométrie*, où l'on trouve attribués aux Pythagoriciens les *apices* ou prototypes de nos chiffres. Nous croyons devoir le rapporter ici, d'après M. Chasles <sup>1</sup>.

« Les anciens avaient coutume d'appeler *digits* toute espèce de nombre au-dessous de la première *limite*, c'est-à-dire ceux que nous comptons depuis un jusqu'à dix, qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ils appelaient : *articulés* tous ceux de l'ordre des dizaines, et des ordres suivants à l'infini ; nombres *composés* tous ceux qui sont compris entre la première et la seconde limite, c'est-à-dire entre dix et vingt, et tous les autres suivants, excepté les limites ; et nombre *incomposés* tous les digits et toutes les limites...

Dès Pythagoriciens, pour éviter de se tromper dans leurs multiplications, divisions et mesures (car ils étaient en toutes choses d'un génie inventeur et subtil), avaient imaginé pour leur usage un *tableau*, qu'ils appelèrent en l'honneur de leur maître *table de Pytha-*

---

(1) CHASLES. *Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en Géométrie*, 3<sup>e</sup> édit. Paris, 1889.

gore, parce qu'ils en tenaient la première idée du philosophe. Les modernes l'ont appelé *abacus*.

Par ce moyen, ce qu'ils avaient trouvé par un effort d'esprit, ils pouvaient en rendre plus aisément la connaissance visuelle et générale, en le montrant pour ainsi dire à l'œil. Ils donnaient à ce tableau une forme assez curieuse, qui est représentée ci-dessous. »

Ce tableau d'ailleurs n'était point la table de multiplication telle que nous la connaissons, mais répondait à la figure ci-contre, et sur les portions de ligne horizontale étaient inscrits, allant de droite à gauche, les chiffres romains un, dix, cent, mille, dix mille, etc.

X.I.M.I.	I.M.I	C.M.I	X.M.I	M.I	C	X	M	C	X	I

Voici comment, grâce à ce procédé, ils pouvaient effectuer des calculs dans le système de numération que Boèce expose de la sorte :

« Ils avaient des *apices* ou caractères de diverses formes. Quelques-uns s'étaient fait des notes d'apices, telles que :

I 7 S 22 4 P 1 8 9

correspondant à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Quelques autres, pour faire usage de ce tableau, prenaient les lettres de l'alphabet; de manière que la première répondait à l'unité, la seconde à deux, la troisième à trois, et les suivantes aux nombres naturels consécutifs. D'autres enfin se bornaient à employer, dans ces opérations, les caractères usités avant eux pour représenter les nombres naturels. Ces *apices*, quels qu'ils fussent, ils s'en servaient comme de la pous-

sière<sup>1</sup>; de manière que s'ils les plaçaient sous l'unité, chacun d'eux ne représentait toujours que des digits. »

On se rend compte, d'après ce passage, que Boèce avait une notion assez nette du principe de position de notre système de numération décimale, avec cette légère différence que les places où nous disposons des zéros restaient vides.

Si ce livre ne lui appartient pas ou a été défiguré par les copistes, Boèce n'en eut pas moins une grande influence sur la Mathématique au moyen âge.

Au siècle suivant l'évêque de Séville, Isidore, est à peu près le seul qui, dans ses *Origines*, ait laissé un ouvrage traitant de science. Et quelle indigeste et mauvaise compilation que cette encyclopédie en vingt livres, dont quelques-uns seulement se rapportent à notre sujet et par lesquels il nous apprend que « la Géométrie a pour caractère la multiplication », ce qui la distingue de l'Arithmétique « dont le fondement est l'addition ». Il mourut en 636, et il nous faut encore franchir près d'un siècle pour trouver un nom à citer, Bède le Vénérable. L'examen de son *De numerorum divisione* montre d'ailleurs quelle distance sépare l'homme le plus érudit de ce temps, d'un Archimède ou même d'un Pappus.

---

(1) Les anciens étendaient de la poussière sur leurs abaqués pour y tracer des figures.

---

## CHAPITRE VIII

### **Le développement des Mathématiques dans l'Inde.**

Bien après que les Grecs eurent amené la Science à un haut degré de perfection, elle commença seulement à fleurir dans l'Inde. Ses origines dans ce pays nous sont peu connues. Cependant on peut l'affirmer, d'après plusieurs manuscrits, les premiers savants hindous se sont formés eux-mêmes.

L'évolution mathématique s'opéra lentement mais grâce au seul concours des prêtres de Brahma et de Boudha qui n'empruntèrent rien aux adorateurs des dieux de l'Olympe. Leur Géométrie fut d'ailleurs assez rudimentaire : des énoncés de théorèmes sur les surfaces ou les volumes de figures simples telles que triangle, carré, rectangle, cercle, pyramide ou sphère, en formèrent le modeste bilan. En Arithmétique et surtout en Algèbre, ils excellèrent. Ainsi ils parvinrent à résoudre l'équation du second degré à une ou à deux inconnues. Leurs productions les plus remarquables se rapportent aux propriétés des nombres ou aux transformations algébriques, tandis que les chefs-d'œuvre scientifiques des Hellènes sont surtout géométriques. La caractéristique des génies respectifs de ces deux races est donc bien différente.

Le philosophe ARYABHATA nous occupera tout d'abord. Il naquit à Pataliputra, aujourd'hui Patna, vers l'an 475 de notre ère, et composa un ouvrage intitulé : *Aryabha-*

*thiyam*, consacré à l'Astronomie, aux éléments du calcul, à la mesure du temps et à diverses questions trigonométriques. Écrit en vers, il se compose de théorèmes sans démonstrations, destinés probablement à être appris dans les écoles, et il indique des connaissances arithmétiques assez sûres de la part de son auteur. Il y résout l'équation complète du second degré à coefficients indéterminés, il y donne la règle pour trouver la somme des carrés de  $n$  premiers nombres et celle de leurs cubes. Quant à son savoir géométrique, il semble peu assuré. Il trouve toutefois une valeur très exacte de  $\pi$ , mais à côté de cela il croit le volume de la pyramide égal à la moitié du produit de la base par la hauteur, et pour obtenir celui de la sphère il multiplie l'aire du grand cercle par la racine carrée de cette mesure.

Un de ses successeurs, BRAHMAGUPTA, dont les écrits ont été mis à jour vers l'an 628, paraît bien supérieur. Deux seulement nous ont été conservés, l'un appelé *Ganita*, l'autre *Cuttaca*. Ils formaient le douzième et le dix-huitième chapitre d'un traité d'Astronomie aujourd'hui perdu.

Les problèmes arithmétiques qu'ils renferment se rapportent pour la plupart à des questions de règles de trois et d'intérêt simple. En Algèbre, il s'attaque aux progressions arithmétiques dont il sait exprimer le dernier terme, la somme et le nombre des termes, connaissant la raison et deux des trois autres quantités. Il résout en nombres entiers les équations indéterminées du premier degré, par la méthode dont nous nous servons actuellement. Avec le problème suivant : soit  $n$  un nombre entier non carré, trouver tous les nombres carrés dont les produits par  $n$  augmentés de 1 donnent des carrés, il aborde même le second degré, et arrive à la formule exacte, mais sans indiquer son procédé. Fermat reviendra plus tard sur ce sujet. En Géométrie, il énonce le théorème du carré de l'hypoténuse, puis

il donne l'expression de l'aire d'un triangle quelconque et d'un quadrilatère inscriptible en fonction de ses côtés. Il remarque aussi que la surface d'un cercle est égale à celle d'un rectangle dont les côtés seraient le rayon et le demi-périmètre, et il attribue au nombre  $\pi$  la valeur  $\sqrt{10}$ .

Pendant plusieurs siècles nous n'avons aucun nom à mentionner parmi les Hindous : Cridhara et Padmanabha, que quelques historiens citent parfois, n'ont pas apporté le plus petit perfectionnement à la science. Nous devons arriver au XII<sup>e</sup> siècle de l'ère vulgaire pour trouver BHASKARA qui, dans trois chapitres de son *Siddhanta Ciromani* ou « Aigrettes des Pierres fines de l'Astronomie », a laissé des traités d'Arithmétique et de Mécanique céleste. Ceux-ci nous renseignent sur les connaissances acquises de son temps. La numération employée est le système décimal basé sur l'emploi des neuf chiffres et du zéro. Il semble avoir connu les œuvres d'Archimède, auxquelles il a emprunté sa valeur approchée  $\frac{22}{7}$  pour le rapport de la circonférence au diamètre. Il rendit enfin un service à l'enseignement en accompagnant ses sentences versifiées de démonstrations en prose. Ses prédécesseurs avaient écrit uniquement en vers, sans donner aucune explication.

Depuis ce savant, la Mathématique hindoue, exclusivement confinée aux écoles des Brahmines, ne compte plus dans l'Histoire des sciences. On a même vu dans les temps modernes un mauvais ouvrage arabe remontant à plusieurs siècles être considéré comme le « summum » du genre. Si donc les nations de l'Inde furent douées jadis de quelque habileté dans la recherche des propriétés des nombres et des théories algébriques, elles ont été considérablement au-dessous du peuple grec en Géométrie. Quant à leur attribuer l'invention de nos chiffres, cela paraît bien difficile à admettre, depuis les travaux des orientalistes modernes. Sans suivre sur

ce terrain Wœpcke <sup>1</sup>, donnons, à titre de curiosité, son opinion. D'après lui, les chiffres indiens auraient été transportés de Bagdad en Égypte sous deux formes différentes, celle que les Arabes d'Orient ont adoptée, et celle que nous connaissons sous le nom de chiffres « Gobari ». Ces derniers auraient été transmis aux Latins par les néo-platoniciens, et de là seraient passés chez les Musulmans d'Afrique pour réapparaître en Europe sous le nom de « chiffres arabes ». M. Brennard <sup>2</sup>, dans sa remarquable *Astronomie hindoue*, se range également à un avis peu différent. Laissons à d'autres le soin de trancher cette question.

---

(1) WOEPCKE. *L'introduction de l'Arithmétique indienne en Occident*. Rome, 1859.

(2) W. BRENNAND. *Hindu Astronomy*. London, 1896.

---

## CHAPITRE IX

### La Science arabe du IX<sup>e</sup> au XII<sup>e</sup> siècle.

Lorsque Charles Martel, en 732, arrêta l'invasion des Arabes, un siècle juste s'était écoulé depuis la mort de Mahomet, et l'empire musulman s'étendait de l'Indus aux Pyrénées. Mais que de ruines l'Islamisme n'avait-il pas amoncelées durant ces cent années ! La destruction d'Ispahan, de Persépolis et surtout d'Alexandrie, ce foyer intellectuel d'où la Mathématique avait durant si longtemps rayonné sur le monde : tel était le bilan de la conquête, pour ne citer que les plus tristes exploits.

Cependant au VIII<sup>e</sup> siècle, sous le règne des Abassides, l'industrie se releva, la littérature et les arts se développèrent, et ces princes résolurent de faire de Bagdad le centre d'une civilisation nouvelle. Bornée à ce qui concerne cette Histoire, leur œuvre fut féconde. Par leur ordre, les grands mathématiciens de l'antiquité furent traduits ou commentés, et dès le règne d'Al-Mamoun (813-833) les géomètres arabes développaient puissamment l'héritage que les Archimède et les Ptolémée leur avaient transmis. Ils devaient même révéler plus tard ces chefs-d'œuvre à l'Europe, les originaux ayant été momentanément égarés ou définitivement perdus dans leur langue.

MOHAMMED BEN MUSA AL-KWARIZMI ouvre cette période. D'origine persane, il fut appelé à Bagdad et chargé

d'une mission dans l'Inde afin de s'instruire auprès des Brahmes, de leurs doctrines scientifiques. A son retour (830) on lui ordonna de dresser des tables astronomiques qui servirent longtemps dans tous les observatoires de l'Orient. Mais son principal titre est son *Traité d'algèbre*, le plus ancien ouvrage arabe que nous possédions sur ce sujet. Il doit du reste nous être précieux. Grâce à lui Léonard de Pise, qui avait été s'instruire près des Arabes, put, en le traduisant, doter l'Europe de cette branche des mathématiques.

Il y expose l'addition, la soustraction, la multiplication des expressions renfermant l'inconnue, son carré ou sa racine carrée et, comme les Hindous, il emploie des considérations géométriques afin d'affirmer la certitude des opérations. Sa méthode lui sert ensuite à résoudre l'équation du second degré. Cependant son livre est moins complet que les traités indiens. Ainsi il ne parle pas des équations indéterminées du second ni du premier degré, mais l'auteur a soin de nous prévenir que c'est un simple résumé destiné à faciliter les opérations les plus usuelles, et non un cours complet comme les Arabes en possédaient déjà. Remarque assez piquante. Cette algèbre, considérée comme élémentaire par un savant de Bagdad du  $x^e$  siècle, devint le vade-mecum des Occidentaux sept cents ans après, et servit de base à leurs études scientifiques jusqu'à Viète!

Al-Khwarizmi écrivit encore un *Traité d'astronomie* et un livre sur l'Arithmétique dont une traduction latine, conservée dans la bibliothèque de l'Université de Cambridge, a été mise au jour, en 1857, par les soins du prince Boncompagni. Mais ils ont moins de valeur.

Parmi ses contemporains les fils de MUSA BEN SCHAKER furent de remarquables mathématiciens. Mohammed, le plus célèbre des trois, exécuta une des premières opérations géodésiques exactes. Il mesura un degré de méridien dans la plaine de Sindjar. Il calcula aussi des tables astronomiques, et composa un *Traité des mouve-*

*ments célestes* assez curieux. Ahmed écrivit sur *Les Machines*, et Hasen s'occupa de la *Trisection de l'angle*. Enfin les trois frères composèrent ensemble une Géométrie où se rencontre la démonstration de la formule exprimant la surface d'un triangle en fonction des trois côtés.

Chargés d'une mission en Asie Mineure, en Perse, en Égypte et en Grèce, afin d'y recueillir les meilleurs manuscrits scientifiques, Ahmed et Hasen rencontrèrent à Harran (Mésopotamie) un astronome de talent, TABIT-BEN-KORRA, qu'ils emmenèrent avec eux à Bagdad. Parmi les cent cinquante et quelques ouvrages que ce dernier a composés sur les diverses parties des Mathématiques, un seul nous reliendra : c'est un fragment d'algèbre où les équations du troisième degré sont résolues géométriquement. Si donc Viète eut la géniale pensée, en imaginant les équations littérales, d'arriver à la véritable conception de l'Algèbre moderne, il n'en est pas moins vrai que les Arabes surent avant lui exprimer graphiquement les formules.

Tabit-ben-Korra avait aussi publié des traductions d'Euclide, d'Archimède et d'Apollonius très estimées dans tout l'Orient. Un autre de ses livres, sa dissertation sur les « nombres amiables », dont chacun est la somme des facteurs des autres, est une des premières découvertes originales des Mahométans, et prouve que l'Arithmétique de Pythagore n'y était pas délaissée.

Mais c'est principalement à l'étude de la Trigonométrie que les Arabes apportèrent tous leurs soins. Les perfectionnements qu'ils y introduisirent permirent de nombreuses applications dans le domaine de l'Astronomie. Leur origine remonte à AL-BATANI, surnommé non sans raison : « le Ptolémée des Arabes »<sup>1</sup>.

(1) Son nom propre est Mohammed-ben-Geber ; mais on le connaît plus habituellement sous celui d'*Al-Batani*, à cause de son lieu de naissance. Les traducteurs du Moyen Âge ont latinisé ce surnom. Ils en ont fait *Albategnius*, sous lequel bien des auteurs modernes le désignent souvent. HOEFER. *Histoire des mathématiques*, 3<sup>e</sup> édit. Paris, 1886.

Ce prince syrien naquit à Batan (Mésopotamie), vers 880. Excellent observateur il corrigea, dans sa *Science des astres*, plusieurs erreurs du grand astronome d'Alexandrie. Il eut surtout la lumineuse pensée de substituer les sinus aux cordes des arcs que les Grecs utilisaient dans leurs calculs. Il découvrit également l'expression fondamentale de la Trigonométrie sphérique, et sous la dénomination « d'ombre étendue » il se sert dans ses formules gnomoniques de la tangente, mais il ne semble pas avoir eu l'idée de son introduction dans les calculs ordinaires. Il fallut cent ans à la science arabe pour franchir cette nouvelle étape. ABOUL-WÉFA, qui florissait à Bagdad dans la seconde moitié du x<sup>e</sup> siècle, employa, en effet, la tangente et les cotangentes pour résoudre divers problèmes d'Astronomie sphérique, et IBN-YOUNIS, mort en 1008, dans son *Livre de la grande table Hakémite*, l'utilisa également. Entre autres particularités intéressantes rencontrées dans cet ouvrage, il faut noter la transformation d'un produit de sinus ou de cosinus en somme ou en différence.

La Géométrie, sans être complètement négligée, fut relativement peu cultivée par les disciples de Mahomet. Pendant longtemps, ils se contentèrent des *Éléments* d'Euclide, mais peu à peu ils finirent par étendre la science grecque. L'un d'eux, Hassan ben Haithem, plus connu sous le nom de ALHAZEN, publia un *Traité des connues géométriques*, aux environs de l'an 1010. Des deux parties qui le composent, la première et la plus originale renferme des questions de lieux, la seconde comprend une suite de propositions dans le genre de celles traitées dans les *Data* d'Euclide. Elles sont cependant différentes de ces dernières et souvent assez difficiles. Pour en donner une idée, citons les deux suivantes.

Quand on a un triangle dont les côtés et les angles sont déterminés, et qu'on mène une ligne du sommet à la base, si le rapport du carré de la droite au rectangle

formé sur les deux segments de la base est connu, la ligne sera donnée de position.

Lorsqu'on a deux cercles connus de grandeur et de position, et qu'on trace une droite tangente aux deux cercles, cette droite est déterminée en grandeur et en position.

Bien qu'on puisse encore citer quelques noms de mathématiciens, tels, par exemple, celui d'ABD-AL-GEHL qui composa un livre sur les *Sections coniques*, la belle période de l'Ecole arabe s'arrête là. Aucun des derniers professeurs de Bagdad n'a apporté un progrès digne d'attention, et nous allons étudier maintenant l'influence de la Science musulmane sur les études mathématiques en Europe.

---

## CHAPITRE X

### Les Mathématiques en Occident au moyen âge. Influence des Arabes.

Dans les chapitres précédents nous avons suivi à travers les âges la filiation des idées mathématiques depuis l'Antiquité gréco-égyptienne jusqu'aux Hindous et aux Mahométans. Nous nous proposons de montrer maintenant dans quel degré d'ignorance vécut l'Occident latin, qui ne sortit de sa barbarie qu'après huit siècles d'obscurité intellectuelle, grâce aux Arabes d'Espagne.

Pendant que la civilisation mulsumane atteignait son apogée, la Mathématique était de plus en plus délaissée en Europe. ALCUIN, le conseiller de Charlemagne, dans ses *Propositiones arithmeticae* résolut quelques problèmes dans le genre de ceux imaginés par Diophante, mais il n'alla pas plus loin. Une figure plus intéressante de cette période fut le moine GERBERT, qui naquit dans la capitale de l'Auvergne en 940. Sa famille était si pauvre qu'il ne dut qu'à la charité publique de pouvoir faire son éducation au monastère de Saint-Gérauld, à Aurillac. Il entra dans les ordres de fort bonne heure, et fut emmené en Espagne par le comte de Barcelone. Puis après il se rendit à Rome où le pape Jean XIII, fasciné par son érudition, si rare au milieu de l'ignorance grossière du temps, le nomma abbé de Bobbio. C'est là qu'il établit une école dont la réputation se

répandit bientôt dans toute la chrétienté. Mais les moines et les seigneurs voisins, jaloux de sa renommée, portèrent contre les mœurs de Gerbert d'odieuses accusations. Celui-ci dut fuir devant l'orage et se retirer en Allemagne qu'il ne tarda pas à quitter de nouveau pour la France, rappelé par l'archevêque de Reims.

Par son intelligence il sut redonner quelque lustre à l'université de cette ville où ses cours de Mathématiques et d'Astronomie attirèrent de nombreux disciples. Aussi Grégoire V voulant récompenser son mérite lui donna le siège épiscopal de Ravenne. Enfin, à la mort de ce dernier pontife, et grâce à l'appui de l'empereur Othon III, il devint à son tour chef de l'Eglise catholique, sous le nom de Sylvestre II (999). Quatre ans plus tard il décédait. Malgré les hautes fonctions qu'il occupa, Gerbert trouva le temps de composer de multiples ouvrages scientifiques. Il s'y montre plutôt disciple de Boèce, que continuateur des Arabes. Les principaux sont le *De numerorum divisione* et la *Regula de abaco computi* où il emploie un système de numération différent de celui des Latins, alors seul usité. C'est en somme la notation décimale moins le zéro, et on désignait ce procédé sous le nom d'*abaque*.

Dans sa *Geometria* il donne d'abord les premières définitions, en commençant toutefois par celle du corps solide, puis il passe à la nomenclature des mesures romaines dont l'usage s'était conservé. Il en énumère un certain nombre : le *digitus*, le *palmus* (quart du pied), la *pertica* (d'où est venu la perche), la *leuca* (d'où dérive notre lieue), etc. Aux chapitres suivants il étudie les triangles rectangles en appliquant les méthodes grecques qui fournissent des nombres rationnels pour les côtés; mais il utilise concurremment d'autres règles conduisant à des nombres fractionnaires.

Parmi les questions intéressantes qu'il y traite se trouve la suivante : la surface et l'hypoténuse étant

donnés, trouver les deux côtés. Ce problème est assez remarquable pour l'époque, puisqu'il répond à une équation du second degré. L'auteur aborde ensuite la Géométrie pratique. Il passe en revue les moyens propres à déterminer la profondeur d'un puits, la hauteur d'un monument, la distance d'un objet inaccessible, etc. La fin de son livre est moins heureuse, car, dans ses formules relatives aux aires des polygones réguliers, il répète les erreurs des agrimenseurs romains.

On considère comme ses élèves quelques mathématiciens du même siècle, entre autres Adalbolde, Berlinus et Heriger. Mais leurs ouvrages, reflets des doctrines du Maître, ne méritent guère d'être tirés de la poussière des bibliothèques.

Vers la même époque, il faut placer FRANCON, écolâtre<sup>1</sup> de Liège, qui composa un opuscule *De Quadratura circuli* (1050) où il expose une solution nécessairement fautive de ce problème dont la difficulté ne l'effraye pas. On y rencontre toutefois certaines considérations assez nettes. Il montre, par exemple, que l'expression en termes rationnels, même à l'aide d'une série de substitutions, de la racine d'un nombre entier non carré parfait, comme 154, est impossible.

En Russie, les études mathématiques commençaient à se poursuivre, mais elles se bornaient à l'arithmétique et à l'arpentage. Le moine KIRIQUE, de Nijni-Novgorod, nous a laissé un *Traité des calculs chronologiques et du comput* (1134), où il cite d'autres amateurs de la théorie des nombres<sup>2</sup>.

La particularité la plus curieuse, constatée dans ces auteurs slaves du moyen âge, est le penchant qui les pousse vers les spéculations arithmético-algébriques, — trait de ressemblance avec les Hindous, et cependant ceux-ci n'eurent aucune relation directe avec l'empire

---

(1) *Revue générale internationale scientifique*, n° 15 (septembre 1897).

(2) *L'Enseignement mathématique*. Paris, n° du 15 mars 1899.

des Czars. Leurs premiers maîtres furent même les Grecs.

Cependant leur numération était assez rudimentaire. Au xi<sup>e</sup> siècle elle allait jusqu'à 10 000, puis au siècle suivant on la prolongea jusqu'à 10 000 000 ; enfin du xiii<sup>e</sup> au xvi<sup>e</sup> siècle elle se développa de 100 000 000 jusqu'aux unités du 50<sup>e</sup> ordre. Le domaine embrassé par leur calcul s'élargissait donc lentement. Puis ils arrivèrent à exprimer d'une manière méthodique les multiples des différentes unités par des lettres.

Dans le livre de Kirique on trouve en particulier sous la dénomination « d'heures fractionnaires » les subdivisions de l'heure écrites d'après le système quinaire.

Durant les cinq cents années qui suivirent, les premières écoles fondées par le clergé gréco-bulgare furent peu florissantes au point de vue des études scientifiques. On n'y apprenait même pas à calculer. Les Russes qui désiraient acquérir des connaissances mathématiques étaient obligés de le faire dans des institutions privées. Ces établissements, dirigés par des laïques, vivaient ignorés de l'État comme des popes, et d'après les rares documents qui nous restent sur leur fonctionnement, on voit qu'on y enseignait à peu près ce qu'on nommait dans le monde latin du moyen âge les « sept arts libéraux », c'est-à-dire la Grammaire, la Dialectique, la Rhétorique, la Musique, l'Arithmétique, la Géométrie et la Cosmographie.

Pour ce qui nous regarde, le programme des études comportait peu de chose : les opérations sur les nombres, le calcul des fractions, certaines notions de métrologie, l'arpentage. Quant à l'Astronomie et au comput, ils formaient l'objet d'études complémentaires. Mais en 1492, à la fin de la période pour laquelle les calculs relatifs au calendrier avaient été effectués, on sentit la nécessité de les prolonger plus loin, et plusieurs savants indigènes s'en tirèrent à leur honneur.

Le métropolite Zossima se chargea

nières années, et Philopé, évêque de Perm, vérifia son travail, puis l'archevêque de Nijni-Novgorod, Hennady, le continua pour soixante-dix ans.

Mais, somme toute, la science slave jusqu'à Pierre le Grand ne compte guère. Au moyen âge d'ailleurs celle de l'Europe ne la dépassait pas de beaucoup. Dans l'Université de Paris, la plus ancienne et la plus en renom, on commentait Boèce, on exécutait des calculs soit au moyen de l'*abacus*, soit avec le vieux système des *jetons* représentant chacun une unité, soit selon la nouvelle méthode introduite par Gerbert, à l'aide de jetons numérotés. En Géométrie on était peu avancé. On enseignait des règles et des énoncés de théorèmes sans démonstrations.

Revenons à l'ouest de l'Europe et quelque peu en arrière. L'Ecole arabe va faire sentir sa bienfaisante influence et secouer la torpeur intellectuelle du monde romain. Les connaissances mathématiques s'implantèrent d'abord en Espagne où les Maures s'étaient fixés dès 747. Après trois siècles environ de barbarie ces peuples fondèrent les Universités de Grenade et de Cordoue, pâles reflets de celle de Bagdad. Puis dans la première moitié du XI<sup>e</sup> siècle naît à Séville un astronome de talent GEBER-IBN-APHLA. Par son traité de *Astronomia* il rendit aisée à ses contemporains la lecture de l'Almageste, en simplifiant les méthodes et en démontrant ce que Ptolémée avait formulé d'une manière trop concise.

Son compatriote ARZACHEL, qui florissait à Tolède vers 1080, crut reconnaître l'excentricité des orbites planétaires, mais cette opinion fut combattue comme contraire aux doctrines admises jusque-là.

Au siècle suivant un moine anglais, ADELHARD, vint en Espagne se perfectionner dans la Science, et traduisit pour la première fois les *Eléments* d'Euclide d'arabe en latin. Un rabbin de Tolède, ABRAHAM BEN EZRA, contribua aussi pour sa part à répandre en Europe les

ouvrages des mathématiciens musulmans. Comme livres originaux, il nous a laissé quelques tables astronomiques et une arithmétique. Il vint même professer jusqu'à Rome où il mourut en 1097.

D'autre part, au XII<sup>e</sup> siècle Gérard de Crémone, Platon de Tivoli et le juif Jean d'Espagne publièrent des traductions latines de la plupart des auteurs arabes. Ils s'occupèrent aussi de l'*algorithme*, ainsi appelé du surnom de Mohammed-ben-Musa qui en donnant à chaque signe numéral de zéro à neuf une valeur déterminée par sa position, opéra une grande réforme arithmétique, bien que cela nous paraisse aujourd'hui si simple et si enfantin !

Mais passons à un savant d'une plus grande envergure, à JEAN DE SACRO-BOSCO qui naquit à Holywood dans le Yorkshire <sup>1</sup>. Après avoir fait ses études à l'université d'Oxford, il vint les terminer à Paris. On ne sait du reste pas grand'chose sur son existence, sinon qu'il enseigna les mathématiques avec le plus grand succès dans un collège de la Montagne Sainte-Geneviève, et qu'il mourut probablement en 1256.

Son *Algorithme* renferme tout ce qu'on savait sur le nouveau système de notation arabe. Les quatre règles s'y trouvent formulées, et il applique à diverses questions pratiques les principes de proportion. Le livre se termine par différentes formules algébriques propres à résoudre les problèmes les plus communs de la vie courante.

Nous reproduisons ci-après, en *fac-similé*, la première page d'un manuscrit de ce traité conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris. Cette gravure est curieuse car on y voit (ligne 26) la forme de nos chiffres à cette époque. Le 5 et le 4 sont seuls assez notablement modifiés.

---

(1) Sacro-Bosco, dans le latin du moyen âge, est la traduction de Holywood.



Mais son principal titre de gloire est son *Traité de la sphère*, qui renferma pendant longtemps tous les secrets de la science astronomique. Il est divisé en quatre chapitres. Le premier roule sur le globe terrestre, le second sur les cercles, le troisième sur le lever et le coucher des astres, et le dernier sur les orbites et les mouvements des planètes. L'auteur n'a guère ajouté aux ouvrages analogues grecs ou arabes. On peut louer seulement la disposition méthodique des matières. Bien que sa valeur scientifique ne soit pas très grande, c'est un des livres qui eurent le plus de succès pendant le moyen âge, et même après. Une multitude d'écrivains le commentèrent. Ce sont par ordre de date : Michel Scot, le fameux philosophe, Hugues de Castro (1337), puis Pierre d'Ailly, Purbach, Regiomontanus et tant d'autres. Après l'invention de l'imprimerie, les éditions se succédèrent. On l'imprima partout, en premier lieu à Ferrare (1572), puis à Bologne, à Venise, à Leipzig et à Paris. Le British Museum de Londres possède 65 éditions du *Traité de la sphère* dont la vogue avait duré plus de quatre cents ans !

Sacro-Bosco exerça donc une grande influence sur les études mathématiques pendant plusieurs siècles et fut par ce fait un des plus actifs propagateurs de la science des Arabes. Cependant à côté de lui existaient les *abacistes* qui se servaient de l'ancienne Arithmétique de Boèce. Celle-ci comprenait deux parties : l'Arithmétique *théorique* ou étude des propriétés des nombres et des démonstrations, toutes rudimentaires d'ailleurs, des méthodes, et l'Arithmétique *pratique* qui avait pour but d'initier à l'art du calcul au moyen de l'abaque. La première continua à être enseignée par les mathématiciens de profession jusque vers le milieu du xv<sup>e</sup> siècle, tandis que la seconde se conserva beaucoup plus longtemps : certains commerçants français, anglais ou allemands, en faisaient encore usage au commencement du xvii<sup>e</sup>.

Parmi tous ces auteurs de médiocre intérêt pour l'histoire scientifique, distinguons Raoul de Laon qui ne connaît pas la valeur du zéro, et Gordan Nemorarius qui dans son *De numeris datis* traite de questions d'Algèbre en raisonnant sur des lettres.

---

## CHAPITRE XI

### La fin du moyen âge et l'Ecole byzantine.

En Occident, la fin du moyen âge marque pour les Mathématiques un certain renouveau dû certainement à l'influence musulmane. L'homme qui pour sa part y contribua largement fut l'Italien Fibonacci, plus connu sous le surnom de LÉONARD DE PISE. Il naquit vers 1175 et voyagea en Orient où son père, régisseur des douanes à Bougie, l'avait engagé à se rendre. Alors il parcourut l'Égypte, la Syrie et la Grèce, afin de s'enquérir des connaissances scientifiques variées qu'y avaient importées les Arabes ; puis il retourna en Italie, et résolut, en publiant son *Liber Abaci* (1202) d'initier ses contemporains aux nouvelles doctrines. Comme il l'annonce dans sa préface, il a « tout accompagné de démonstrations afin que ceux qui désirent connaître cette Science puissent s'instruire, et que dorénavant la race latine ne s'en trouve pas privée comme elle l'a été jusqu'alors ». Aussi dans les quinze livres où il expose le système de numération arabe, dont il attribue l'invention aux Hindous, il fait ressortir ses avantages sur la notation romaine puis il montre comment la Géométrie et l'Algèbre peuvent se prêter un mutuel concours. Finalement il résout quelques équations du second degré.

Au point de vue historique cet ouvrage est intéressant, car, ayant joui pendant longtemps d'u

sive faveur, il introduisit les chiffres arabes dans toute la chrétienté. Dans sa *Practica geometria* (1220), on rencontre la formule de l'aire du triangle en fonction de ses trois côtés. Peut-être l'a-t-il empruntée aux auteurs mahométans, mais en tout cas elle y est démontrée d'une façon différente. Enfin, dans son *Traité des nombres carrés* retrouvé et publié seulement en 1857, par le prince Boncompagni, il indique des formules pour résoudre certaines équations indéterminées du second degré et trouve, à l'aide de méthodes graphiques, plusieurs propriétés générales des carrés.

Dans divers pays, le mouvement intellectuel commençait à se dessiner. A Paris, au début du  $xii^e$  siècle Abelard avait enseigné avec éclat la philosophie ; nous avons vu, cent ans après, Jean de Sacro-Bosco professer avec non moins de succès les mathématiques, tandis qu'ALBERT LE GRAND émettait sur l'*infini* des considérations assez curieuses pour être rapportées ici. Il dit en propres termes : « Les mathématiciens n'ont pas besoin pour leur Science d'une quantité infinie en réalité, car ils n'envisagent pas la quantité réelle, mais la quantité imaginaire, et se règlent d'après la faculté de l'imagination... Ils n'ont pas besoin d'un infini qui existe réellement, mais d'un infini qui se prête à l'imagination<sup>1</sup>. » Les calculateurs parisiens des  $xiii^e$ ,  $xiv^e$  et  $xv^e$  siècles ont accumulé bien des théories sur la quadrature du cercle, avant qu'on soit parvenu à jeter le pont entre les idées d'Archimède et celles de Newton ou de Leibniz. Le célèbre RAYMOND LULLE s'y évertua en 1299, alors qu'il occupait une chaire au collège des Franciscains, et quelques-uns de ses disciples partageaient déjà les idées que Cavalieri et Wallis devaient défendre plus tard. Ils assimilaient le cercle à un polygone d'un nombre infini de côtés, et sa circonférence à une série de lignes droites infiniment petites. Enfin

---

(1) BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, Paris. *Manuscrit latin* n° 7437, fol. 13.

il y a lieu de se demander si Newton ne s'est pas inspiré des idées émises par JEAN DE MURIS, qui vivait à Paris au milieu du XIV<sup>e</sup> siècle. Il déclare, dans un ouvrage où il traite de la proportion des vitesses dans les mouvements, que « la vitesse de deux corps subissant une impulsion du même genre est proportionnelle aux espaces parcourus, et que les résultats des forces motrices sont proportionnels aux temps où ces forces s'exercent<sup>1</sup> ».

D'autre part, les études mathématiques étaient assez fortes dans l'Université de Prague fondée en 1384. On exigeait du candidat au grade de bachelier une connaissance approfondie des ouvrages astronomiques de Sacro-Bosco et de Ptolémée, des six livres d'Euclide, et des notions d'arpentage. Dans les écoles de Leipzig et de Cologne, on attachait peu d'importance à ces questions. Celles de Bologne et de Palerme étaient très florissantes, mais cette dernière surtout en Médecine. A Padoue et à Pise, les programmes se rapprochaient de l'enseignement suivi en France ou en Autriche. On remplaçait toutefois les leçons sur l'Almageste par des cours astrologiques. A Oxford et à Cambridge, jusqu'au milieu du XV<sup>e</sup> siècle, on se contenta des deux premiers livres d'Euclide et des éléments de la numération.

A Constantinople, pendant la durée du Moyen âge on s'occupa plus de controverses théologiques ou grammaticales que de spéculations scientifiques<sup>2</sup>. Aussi, dans la liste des auteurs byzantins, nous retiendrons seulement deux noms montrant la parfaite ignorance mathématique des savants de la nouvelle Rome.

---

(1) BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, Paris. *Manuscrit latin n° 7190. De moventibus et motis*, fol. 75.

(2) Les historiens intitulent habituellement : « École byzantine », une liste de quelques auteurs s'étendant jusqu'au milieu du XV<sup>e</sup> siècle, tels que Psellus, Nicolas de Smyrne, le moine Argyrus, Planude, Pachymère et les deux autres savants dont nous analysons les œuvres. Nous croyons que leurs travaux ne méritent pas un tel honneur, mais nous avons conservé cette dénomination en tête de ce chapitre, pour nous conformer à l'usage.

Le premier, BARLAAM, originaire de la Calabre, mourut vers le milieu du XIV<sup>e</sup> siècle. C'était un moine appartenant à l'ordre de Saint-Basile. Très intelligent, il fut envoyé comme ambassadeur près du pape, qui résidait alors à Avignon, afin d'examiner la possibilité de réunion des Églises grecque et latine. Pendant cette mission il enseigna, dit-on, le grec au poète Pétrarque. Puis, à son retour à Constantinople, il s'acquit une juste réputation en couvrant de ridicule les prétentions saugrenues, les idées baroques et les sots préjugés des religieux quiétistes du Mont-Athos, qui avaient à leur tête Palmos.

C'est au milieu de ces discussions qu'il écrivit sa *Logistique*, consacrée à l'exposition des principes de calcul des Grecs, en particulier de leur laborieux procédé relatif aux opérations sur les fractions.

Au siècle suivant, MOSCHOPoulos, dont M. Tannery<sup>(1)</sup> a récemment édité l'ouvrage sur les *Carrés magiques*,

A	2	9	4	D
	7	5	3	
B	6	1	8	C

Fig. 11.

Carré magique.

est le seul mathématicien quelque peu original de cette période.

Qu'entend-on d'abord sous ce nom? Soit un carré ABCD. Divisons-le par des parallèles aux côtés en petites cases égales, et inscrivons dans chacune un nombre entier. La figure ABCD sera un « carré magique », si la somme des nombres suivant chaque ligne horizontale, chaque colonne ou chaque diagonale, est toujours identique. Tel est le tableau ci-dessus où la « somme magique » est constamment 15.

On rencontre cet amusement mathématique dans l'Inde et chez les Arabes. Les Byzantins les ont-ils reçus par l'intermédiaire de ces derniers, ou est-ce simplement une ancienne tradition qui des Grecs d'Orient

(1) PAUL TANNERY. *Le traité manuel de Moschopoulos sur les carrés magiques*. Le Puy, 1886.

passa aux disciples de Mahomet ? Enigme difficile à percer. Ceci, sous de fuites apparences, se rattache du reste à une considération plus haute : quel degré d'originalité faut-il attribuer à l'Islamisme ? N'a-t-on pas fait honneur à ses sectateurs de trop d'idées appartenant à la civilisation hellène ? Leur génie d'invention était-il si puissant ? Problème plus ardu à résoudre qu'à poser ! Quoi qu'il en soit et jusqu'à nouvel ordre, nous attribuerons la paternité de cette petite découverte à Moschopoulos qui indiqua les propriétés générales des carrés magiques et les règles de leur formation <sup>1</sup>. Son livre ne porte en effet aucun cachet arabe. Il ignore en particulier la signification symbolique qu'on leur attribuait dans tout l'Orient. Mais pour trancher la difficulté il faudrait trouver dans un auteur plus ancien une allusion à ce sujet. Ce débat de priorité serait intéressant. Avis aux érudits.

---

(1) Voir, sur les Carrés magiques, la 3<sup>e</sup> partie du livre de M. E. FOURREY. *Récréations arithmétiques*, Paris, 1899.

---

## CHAPITRE XII

### Les précurseurs de la Mathématique moderne.

La renaissance des Mathématiques, comme celle des Lettres et des Arts, suivit à peu de distance l'invention de l'imprimerie et la chute de l'empire byzantin. Les Grecs instruits fuient leur patrie envahie par les Turcs (1453), et se réfugiaient en grand nombre en Italie, emportant avec eux les plus précieux manuscrits soustraits au pillage. L'Occident peut alors connaître dans leur pureté originale les écrits des grands mathématiciens de l'Antiquité défigurés par les copistes ou les traducteurs arabes. Deux contrées surtout vont se distinguer dans les Sciences. L'Italie, la terre classique des chefs-d'œuvre, s'enorgueillira de ses algébristes, et l'Allemagne portera la Trigonométrie et l'Astronomie à un haut degré de perfection.

Au début de cette période nous rencontrons Jean Muller, plus connu sous le nom de REGIOMONTANUS, auquel la Trigonométrie doit de remarquables progrès. Né à Königsberg en 1436, il étudia à Vienne sous Georges Purbach, puis se mit à lire dans leur langue les savants les plus illustres de la Grèce ancienne. Il laissa même des traductions et des commentaires de l'Almageste de Ptolémée, des Sections coniques d'Apollonius, et des Œuvres de Héron. Enfin et surtout, il composa son important ouvrage *De triangulis omnimodis*, publié seulement à Nuremberg en 1553, et où il résout bien des

questions nouvelles de Trigonométrie rectiligne et sphérique. Dans tous les calculs, il substitue les sinus aux cordes, ainsi que les Hindous l'avaient fait avant lui; mais il n'eut sans doute pas connaissance des travaux d'Al-Batani.

A l'aide de trois données quelconques il détermine les divers éléments d'un triangle qu'il résout au moyen d'équations du second degré. Du reste, dans son *Algorithmus demonstratus*, il prépara la voie à Viète en substituant les lettres aux nombres. Son œuvre astronomique fut encore plus considérable; mais nous ne saurions parler ici de ses observations sur les comètes, ni de sa réforme du calendrier, exécutée sur les ordres du pape Sixte IV.

Un autre de ses compatriotes, le cardinal NICOLAS DE CUSA, en s'attaquant au fameux problème de la quadrature du cercle trouva une nouvelle formule pour le calcul du rayon d'une circonférence. A peu près vers la même époque, se place JEAN WIDMAN d'Eger qui dans son *Arithmétique marchande* imprimée à Leipzig en 1489, employa, le premier peut-être, les signes + et — pour désigner l'addition et la soustraction. Cependant ces symboles ne lui servent pas dans les opérations, mais marquent seulement l'excès ou la différence. D'ailleurs, au sujet de l'origine de la plupart des notations mathématiques, nous nous rangeons à l'avis de M. Charles Henry. Elles ne sauraient être attribuées à « une création individuelle ». Elles ne sont que des « abréviations de leurs significations verbales »<sup>1</sup>, et reposent sur l'expérience de nombreuses générations.

En Italie, la Science continuait son mouvement ascendant. Au milieu du xv<sup>e</sup> siècle, naquit à Borgo-San-Sepolcro, en Toscane, un ardent admirateur des Arabes, LUCAS PACCIOLI. Frère mineur, il professa dans plusieurs

---

(1) CHARLES HENRY. *Sur l'origine de quelques notations mathématiques*, dans la *Revue archéologique*. Paris, 1879.

collèges de son ordre, à Pérouse, à Rome, à Pise, à Venise, et il termina ses jours à Florence.

Sa *Summa de arithmetica, geometria, proportioni e proportionalita* (1494), la plus importante de ses publications, est composée de deux parties : la première roule sur l'Arithmétique et l'Algèbre, la seconde sur la Géométrie. Dans celle-là, il donne les méthodes de résolution des équations pouvant se ramener au second degré. Le mot italien « cosa », traduction du mot latin « res », la chose, lui sert à désigner l'inconnue, qu'il représente parfois par  $R$  ou  $rj$ . Il nomme son carré « census » ou « il censo », et l'indique quelquefois par  $z$  ; de même son cube « cuba » est figuré par  $c$ . Ce n'est cependant pas encore l'Algèbre moderne : les quantités connues n'étaient pas remplacées par des lettres, les questions à résoudre étaient toujours numériques, et dans les formules il ne se servait, comme signes, que d'abréviations de mots. Ex.  $p$  pour *plus* (addition) ;  $x$  pour *æqualis* (égalité). Comme il considérait seulement les racines positives, il n'employait pas de symbole pour la soustraction. Enfin il ramenait toutes les équations du second degré à trois cas, et il formulait en vers latins le procédé pour résoudre chacun d'eux<sup>1</sup>.

Son ami LEONARD DE VINCI, qui occupe une si grande place dans l'Histoire de l'Art, cultiva également avec succès la Mécanique et l'Hydrostatique. Parmi ses plus curieuses inventions, figure le *tour à ovale* dont le principe était neuf. Jusqu'alors on n'avait tracé les courbes qu'à l'aide d'une pointe mobile le long d'un plan fixe. L'illustre artiste opéra d'une façon inverse. Il avait donc à se poser un problème d'un genre nouveau : quel

(1) Voici, à titre de curiosité, la règle du premier cas :

Si res et census numero coequantur, a rebus  
 Dimidio sumpto, census producere debes  
 Addereque numero, cujus a radice totius  
 Tolle semis rerum, census latusque redibit.

ROUSE BALL. *A short account of the History of Mathematics*. Londres, 1888.

mouvement faut-il donner au plan pour décrire de la sorte une ellipse, et parmi l'infinité de solutions répondant à la question choisir la plus simple? Il y réussit entièrement en faisant mouvoir le plan d'un angle de grandeur constante, dont les deux côtés glissent sur deux points fixes. D'autre part, on lui attribue aussi la détermination du centre de gravité de la pyramide.

Mais c'est surtout au xvi<sup>e</sup> siècle que commence la belle phase de l'Histoire des Mathématiques italiennes. Les recherches de ces savants peuvent se ranger sous deux catégories. Les uns étudient et complètent les travaux de l'Antiquité, tandis que les autres, novateurs hardis, s'attaquent à l'Algèbre.

A la tête des premiers brille FRANÇOIS MAUROLYCUS, « le seul véritable géomètre qu'ait eu la Sicile depuis Archimède »<sup>1</sup>. Il professa longtemps dans sa ville natale et composa un nombre prodigieux d'ouvrages; mais de son vivant il ne publia qu'une *Cosmographie* (1540). D'ailleurs la plupart de ses écrits consistaient en traductions d'auteurs grecs, et sont aujourd'hui perdus. Heureusement ses recherches originales nous ont été conservées dans ses *Opuscules mathématiques* publiés quelques jours après sa mort (1575). Sa théorie arithmétique renferme de curieux aperçus sur les propriétés des nombres polygonaux beaucoup plus complètement étudiés que chez Diophante. Il envisage plusieurs séries nouvelles des nombres composés de deux ou trois facteurs dont il détermine le terme général et la somme. En Géométrie, les sections coniques l'attirèrent et il sut déduire de leurs propriétés d'utiles applications à la théorie des nombres. Les propositions qu'il découvrit lui permirent d'établir la Gnomonique sur de nouvelles bases. En Mécanique il s'attaqua à la recherche du centre de gravité du cône et du paraboloïde de révolution, mais

---

(1) LABRI. *Histoire des Sciences Mathématiques en Italie*, t. III. Par

comme il conservait ses travaux dans ses cartons, son émule Commandin le devança.

Enfin la pénétration de son esprit se dévoile par son explication de l'arc-en-ciel, de la vision, de la marche des rayons lumineux réfléchis ou réfractés et de divers autres phénomènes optiques.

Parmi ses compatriotes, JEAN-BAPTISTE BENEDETTI de Venise, dans sa *Résolution de tous les problèmes d'Euclide avec une seule ouverture de compas* (1553) et dans ses *Spéculations mathématiques et physiques* (1585) énonça bien des vérités scientifiques. Citons seulement ses découvertes mécaniques. Il expliqua l'action de plusieurs machines, les effets de la force centrifuge et l'équilibre du levier ; il ramena la recherche du mouvement d'un corps à la détermination de celui de son centre de gravité. Polémiste dans l'âme, il excella dans les luttes mathématiques qui passionnèrent son temps, et souvent il fut dans le camp de la vérité. Parmi ses adversaires, qu'il combattit d'ailleurs à armes courtoises, se trouvait le Portugais PEDRO NUNEZ qui, depuis 1544 jusqu'à sa mort, professa les mathématiques à l'Université de Coïmbre, et dont le nom est resté attaché à la *loxodromie* ou courbe rencontrant tous les méridiens d'une sphère sous un angle constant. Cette ligne était importante à considérer dans l'ancienne navigation à voile, puisque c'était celle suivie par un navire dirigé constamment sur le même rhumb de vent. Elle n'a plus maintenant qu'un intérêt rétrospectif, car dans la marine à vapeur moderne on la délaisse, les vaisseaux suivant maintenant la ligne géodésique.

Ce savant déterminait encore dans son *De crepusculis* (1542) le jour de l'année où la durée du crépuscule est minimum, et il eut aussi maille à partir avec Oronce Fine à propos de certains paralogismes algébriques.

Nous avons indiqué plus haut que plusieurs algébristes italiens en s'attaquant à la Science des Arabes lui firent faire de mémorables progrès. Justifions cette

assertion. Avant eux, on n'avait su résoudre que différentes équations déterminées des deux premiers degrés à racines positives. Ils découvrirent le calcul des imaginaires, et parvinrent jusqu'à la solution des équations générales du troisième et du quatrième degré. Seul l'obstacle qui devait plus tard résister au génie de Lagrange les empêcha d'aller plus loin.

Ces nouvelles méthodes seraient dues principalement à SCIPION FERRO, mais ne les ayant pas publiées, elles périrent avec lui<sup>1</sup>. Celles de NICOLÒ TARTAGLIA nous sont mieux connues. A la suite d'un défi, il résolut en quelques heures les problèmes proposés par Fiore à qui elles avaient été communiquées trente ans auparavant par Ferro lui-même. On engagea des paris, on s'envoya des cartels, bref tout le monde s'intéressa à ces joutes scientifiques, comme autrefois les luttes des athlètes dans l'arène ou les tournois poétiques passionnaient les habitants d'Athènes. Ces différentes questions se ramenaient du reste à une équation particulière du troisième degré.

Mais son *Traité des nombres et mesures* est son principal ouvrage. Dans cette espèce de cours complet de Mathématiques on rencontre, entre autres nouveautés, le développement du binôme dans le cas de l'exposant entier et positif, de curieux problèmes sur les maxima et minima de fonctions algébriques et plusieurs simplifications relatives au calcul des radicaux.

Dans sa *Science nouvelle* (1550) il a obtenu ce principe de balistique : pour atteindre l'effet maximum il faut tirer sous l'angle de 45°. Enfin il essayait dans ce livre d'édifier la Mécanique sur des bases plus

(1) Voici ce qu'écrivit à ce propos LIBRI, *loc. cit.*, p. 149 : « Cet homme à qui l'algèbre doit un si notable progrès fut Scipion Ferro de Bologne, qui professa dans cette ville depuis 1496 jusqu'en 1525. Ayant résolu cette équation qu'on désignait alors par le nom de *cubes et choses égales aux nombres* il mourut sans publier sa découverte ; mais il avait confié sa forme Antoine Fiore, qui s'en servit pour proposer des problèmes à différents mètres, et entre autres, en 1535, à Tartaglia. »

rationnelles, et s'il n'y réussit pas complètement, il s'est rendu compte, d'une façon très exacte, des principes qui régissaient la chute des corps. Galilée devait les découvrir seulement un siècle plus tard. D'autre part, dans le cinquième livre de ses *Questions et inventions nouvelles*, mises au jour la même année, il traita de l'arpentage et du levé des plans. Son activité s'exerça donc dans bien des domaines scientifiques.

Son rival fut JÉRÔME CARDAN qui, né à Pavie le 24 septembre 1501, cultiva également l'Algèbre avec succès. En différentes circonstances, il pria Tartaglia de lui enseigner son procédé de résolution des équations du troisième degré. Après avoir essayé plusieurs refus, il eut gain de cause, celui-ci eu la faiblesse de lui expliquer, dans une pièce de vers, sa découverte et Cardan, malgré les promesses les plus formelles relativement au secret, l'inséra dans son *Ars magna* (1545) avec l'extension due à son élève Ferrari, qui était arrivé à résoudre l'équation du quatrième degré. Quoique sa conduite dans ce cas fût plutôt blâmable cet ouvrage rendit, on ne peut s'empêcher de le constater, de grands services à la Science.

Il y donnait un moyen pour la résolution approchée des équations. La base de la méthode est le changement de signe qui se produit par la substitution successive à la place de l'inconnue de deux nombres entre lesquels se trouve comprise une racine. En outre, il a découvert, entre autres relations qui lient les racines aux coefficients, les deux théorèmes suivants :

Toute équation du troisième degré est divisible par l'inconnue diminuée de la racine.

Le coefficient du second terme est égal à la somme des racines changée de signe.

Le premier il distingua les racines négatives et positives. Enfin il a amorcé bien des points de la théorie générale des équations, et il a ébauché le calcul des imaginaires.

Son traité *De subtilitate* est une encyclopédie fourmillant d'idées ingénieuses, d'inventions ou d'appareils intéressants, mais dont la plupart sortent de notre cadre. Quelques-unes des curieuses opinions qu'il y émet se rattachent cependant à la philosophie mathématique.

Parmi ses élèves, mentionnons LOUIS FERRARI, qui dans sa trop courte carrière, terminée en 1565, donna la solution générale des équations du quatrième degré à laquelle nous avons fait allusion ci-dessus, et RAPHAEL BOMBELLI dont le *Traité d'algèbre* (1572) clôt dignement la série des ouvrages de l'illustre école italienne du XVI<sup>e</sup> siècle. On y rencontre très logiquement disposées les découvertes de ses prédécesseurs immédiats accompagnées de commentaires intéressants, de simplifications inattendues et de vues souvent très personnelles. Enfin c'est là que se trouve annoncé d'une façon générale la réalité des trois racines d'une équation du troisième degré, quand elles se présentent toutes trois sous la forme imaginaire.

Pendant que l'Algèbre atteignait un si haut degré de perfection en Italie, les autres contrées de l'Europe étaient assez pauvres en mathématiciens.

ADRIEN ROMAIN, qui professa longtemps les mathématiques à Louvain, déterminait dans sa *Methodus polygonum* (1590) la valeur de  $\pi$  avec 15 décimales ; le Hollandais VAN COLEN dans son *De Circulo* la calculait jusqu'à la trentième décimale. METIUS professeur à Francker, s'appliquait à une détermination encore plus exacte.

En outre, son *Canon triangulorum* a une certaine valeur, car il essaye de ramener à six cas généraux les divers problèmes de Trigonométrie sphérique. On regarde aussi un savant allemand de ce temps, PRAETORIUS, comme inventeur d'un instrument géodésique permettant de prendre des angles visuels. Quant à la France, elle semble se recueillir, avant d'enfanter le grand Viète. Passons donc vite sur BURÉON qui, dans sa *Logistica* (1559),

imita l'exemple de Stifel en représentant dans les équations algébriques les inconnues par des lettres. Son élève ORONCE FINÉ, un des plus fameux quadratureurs du cercle, s'acquit une grande réputation auprès de ses contemporains, mais aucun de ses écrits ne renferme d'inventions originales. PIERRE LA RAMÉE fut le premier professeur de mathématiques au Collège de France. Ses *Cours* de Géométrie, d'Arithmétique et d'Algèbre eurent assez de vogue. Il périt malheureusement dans le massacre de la Saint-Barthélemy. Mais assez de ces travailleurs de second plan. Avant toutefois d'arriver au grand Maître, constatons que le xvi<sup>e</sup> siècle ne fut pas uniquement consacré aux arts. A côté des Michel-Ange et des Raphaël nous avons les Tartaglia et les Cardan. Si les immortels chefs-d'œuvre des premiers sont restés sans rivaux tandis que les découvertes des seconds furent rapidement dépassées par celles des Viète, des Descartes ou des Newton, cela tient surtout à l'essence même de leurs recherches. L'esthétique a des limites dans la perfection, la Science n'en connaît point. Le Louvre peut à peine soutenir la comparaison avec le Parthénon, tandis qu'un parallèle entre Archimède et Pascal n'a pas de sens, celui-ci disposant de moyens que celui-là ne pouvait même pas soupçonner.

---

## CHAPITRE XIII

### **Invention de l'Algèbre moderne par Viète, et découverte des logarithmes par Napier.**

Avec FRANÇOIS VIÈTE, sieur de la Bigotière, s'ouvre une ère nouvelle pour la Mathématique : l'Algèbre moderne s'édifie. Ses successeurs perfectionneront son œuvre, il est vrai. Ils remplaceront ses notations qui, nous allons le voir, sont parfois assez compliquées, par des symboles plus élégants ou plus généraux, mais les fondements de ses géniales méthodes resteront; et si notre siècle l'a quelque peu oublié, ses contemporains surent admirer ce « géant de la plus haute stature », qui, dans la marche du progrès, comme le dit avec raison de Billy, semble dominer tous les autres par ses vastes conceptions.

Né à Fontenay-le-Comte, en 1540, cet illustre algébriste fut d'abord avocat au barreau de sa ville natale, et obtint par la suite une charge de conseiller au Parlement de Bretagne (1574). Puis devenu maître des requêtes sous Henri III, disgracié ensuite quelque temps, il rentra dans les bonnes grâces royales en 1589, et fut enfin appelé par Henri IV au Conseil privé, fonction que sa mauvaise constitution lui fit résigner en décembre 1602. Mais les douceurs de la retraite n'étaient point faites pour lui. Il mourut peu après, le 26 février 1603. Du moins il laissait une œuvre qui, elle, ne devait point périr.

En vue de remplacer l'Almageste de Ptolémée dont sa sagacité lui avait démontré l'insuffisance, il projeta son

*Harmonicum cœleste*, malheureusement égaré aujourd'hui. Pour venir à bout de cette entreprise il fallait avant tout réformer la Trigonométrie, construire des tables plus étendues que celles alors en usage, donner aux astronomes des règles commodes pour la résolution des triangles, et leur apprendre à se servir des tangentes et des sécantes que Rhéticus venait d'imaginer. La lecture de son *Canon mathematicus* (1579) montre quels services il a rendus à la science dans cette voie. C'est un recueil de tables trigonométriques où pour la première fois on voit en regard de l'angle correspondant la valeur des sinus, tangentes, sécantes, cosinus, cotangentes et cosécantes, calculée de minute en minute pour un rayon égal à 100000. Le *Liber inspectionum* lui fait suite. Il renferme les formules pour la résolution des triangles plans et sphériques, ainsi que de nombreux résultats numériques.

Pour confectionner ces ouvrages, Viète laisse de côté les laborieux procédés des Grecs, ou ceux plus perfectionnés des Arabes. Il ramène la recherche du sinus fondamental de une minute à celle de la longueur de la circonférence par la méthode des bisections successives d'Archimède qu'il rajeunit. En affranchissant la Trigonométrie de ses énoncés prolixes, il présente sous forme de tableaux les éléments connus et inconnus d'un triangle, et constitue de la sorte les formules générales, expéditives, dont nous nous servons journellement. Toutefois c'est principalement la Trigonométrie sphérique qui a bénéficié de ses travaux. Al Batani avait découvert la relation permettant de trouver les angles A, B, C d'un triangle sphérique lorsqu'on connaît les trois côtés. Viète fit de cette expression le point de départ de féconds développements. Il trouva les diverses formules de résolution sans passer par la décomposition en deux triangles rectangles. D'autre part, il se servit le premier des propriétés du triangle sphérique polaire ou supplémen-



Fig. 12.

FRANÇOIS VIÈTE.

*tiré de la collection des Maîtres des Requêtes*



taire dans les calculs où cela peut avoir quelque intérêt.

Le savant mathématicien donna encore dans son *Traité des sections angulaires* d'autres formules trigonométriques non moins importantes. Il exprime  $\sin nx$ ,  $\cos nx$  et  $\operatorname{Tg} nx$  en fonction de  $\sin x$ ,  $\cos x$  et  $\operatorname{Tg} x$ , en déterminant les coefficients par des additions successives des nombres figurés de différents ordres. Il parvient d'une façon analogue à l'équation générale de la corde de l'arc simple en fonction de la corde de l'arc multiple. Mais arrêtons là cette analyse écourtée de ses premiers travaux, car il nous reste à aborder la plus belle partie de son œuvre et à montrer qu'après avoir renouvelé la Trigonométrie des Anciens, il a su créer une science nouvelle.

Au XII<sup>e</sup> siècle, Léonard de Pise enseigna à l'Europe les rudiments de l'algèbre. Il s'était inspiré lui-même des travaux arabes, et n'allait pas au delà des équations du second degré. En outre, les méthodes usitées pour obtenir la valeur de l'inconnue étaient basées sur des considérations presque exclusivement géométriques. Les quantités étaient représentées par des lignes droites, les données étaient toujours des nombres, et dans les calculs l'inconnue seule était désignée par un symbole. Tel était l'état de l'Algèbre au moment où Viète en aborda l'étude. Il commença d'abord par remplacer les connues comme les inconnues, par des lettres capitales. Les premières sont représentées par les voyelles A, E, I, O, V, Y; les secondes par des consonnes B, G, D, F..., les puissances de l'inconnue par la même lettre avec un des indices  $q$ ,  $c$  (abréviations de *quadratum* et de *cubus*) combinés par addition des exposants. Mais afin de conserver dans les équations le principe de l'homogénéité, il indique les données par un signe de leurs dimensions formé des abréviations des mots *planum* et *solidum* et de leurs combinaisons.

Il se sert de  $+$  et  $-$  pour l'addition et la soustraction. Pour la multiplication, il emploie la particule *in*,

pour la division il sépare le dividende du diviseur au moyen d'une barre horizontale, et pour les racines il fait usage des lettres  $l$  ou  $k$ .

Remarquons que quand il ignore la grandeur du terme à soustraire il le note par  $=$  (*minus incertum*). Cette distinction paraît oiseuse aujourd'hui, mais s'explique du temps de Viète. Si son Algèbre comprend, en effet, toute la science des équations, elle repose seulement sur la considération des racines positives, et à l'exemple des anciens algébristes il rejette les quantités négatives et imaginaires. Enfin comme l'homogénéité disparaît dans les applications, il représente alors l'inconnue et ses puissances par leurs indices.

Empruntons d'ailleurs à un mémoire de Ritter<sup>1</sup> le tableau résumant sa nomenclature<sup>2</sup> :

INCONNUES	<i>Numerus</i>	<i>Quadratum</i>	<i>Cubus</i>	<i>Quad. Quadratum</i>	<i>Quad. cubus</i>	<i>Cubus-cubus</i>
Théorie générale . .	A	Aq	Ac	Aqq	Aqc	Acc
Applic. numériques.	1N	1Q	1C	1QQ	1QC	1CC
Equivalents modernes.	$x$	$x^2$	$x^3$	$x^4$	$x^5$	$x^6$
COEFFICIENTS HOMOGÈNES	<i>Latus</i>	<i>Planum</i>	<i>Solidum</i>	<i>Plano-planum</i>	<i>Plano-solidum</i>	<i>Solidum-solidum</i>
Théorie générale . .	B	Bp	Bs	Bpp	Bps	Bss

« La science de bien trouver en Mathématiques »,

(1) F. RITTER. *François Viète d'après des documents nouveaux* dans la *Revue générale des sciences*, t. IV. Paris, 1893. Voy. aussi deux autres mémoires de ce savant sur le même sujet dans le compte rendu de l'*Association française pour l'avancement des sciences. Congrès de Pau*, 1892.

(2) Ainsi dans la notation de Viète l'équation littérale  $x^3 + ax^2 - bx = d$

comme Viète nomme son algèbre, comprend les quatre opérations arithmétiques appliquées aux polynômes, les règles générales pour réduire les équations à la forme canonique, ou, en d'autres termes, pour les transformer de façon que les diverses puissances de l'inconnue se trouvent dans le premier membre, ordonnées selon l'ordre croissant ou décroissant, que la puissance la plus élevée ait pour coefficient l'unité, que les quantités connues soient dans le second membre, et que ce dernier soit positif. Puis il résout à l'aide de ces principes une série de problèmes déterminés et indéterminés du premier et du second degré. Après viennent d'élégants procédés pour la résolution numérique des équations. Enfin il expose magistralement leur théorie générale. Là se reconnaît véritablement la griffe du lion. Ce n'est plus une ébauche de la Science, l'Algèbre s'élève tout à coup à une hauteur inespérée. On y trouve les méthodes usitées encore aujourd'hui, les relations entre les racines positives et les coefficients des équations du second et du troisième degré, parfois même d'un degré quelconque, les formules générales pour résoudre les équations du troisième et du quatrième degré, etc.

L'œuvre de Viète fut donc des plus fécondes. On ne peut le comparer pour son génie d'invention qu'à Newton, et si, comme il le dit modestement dans une de ses lettres, il n'était pas un « mathématicien de profession », il sut néanmoins, en « faisant des mathématiques ses plus chères études », s'y placer au tout premier rang.

A la même époque, SIMON STEVIN, né à Bruges en 1548, cultiva avec succès bien des branches de la science, et sut se distinguer dans chacune d'elles. Dans *La Disme* (1585) se trouve décrit pour la première fois le traitement méthodique des fractions décimales, et il montre

---

s'écrivait  $Ae + B \text{ in } Ag = Dp \text{ in } Aeq \text{ } Dp \text{ } F + bs$  et l'équation numérique  $x^3 + 4x^2 - 6x = 51$  se représenterait par  $1C + 4Q - 6N = 51$ .

les avantages d'un système décimal de poids et mesures, devançant de plus de deux siècles la division réalisée en France sous la Révolution seulement. Sa notation est toutefois un peu encombrante car il remplace la virgule par un zéro et il écrit par exemple le nombre 5,678 de la sorte : 5 [0] 6 [1] 7 [2] 8 [3].

Ce sont probablement ces symboles qui le conduisirent à imaginer la représentation des diverses puissances par des exposants numériques entiers et fractionnaires. Il les plaçait d'une façon à peu près analogue à la nôtre. Ainsi il écrivait  $3x^2 + 4x + 5$  de cette manière : 4 [2] + 3 [1] + 5 [0].

Dans sa *Pratique géométrique* on rencontre plusieurs propositions ou constructions originales, telles la génération de l'ellipse à l'aide d'un cercle dont on fait varier dans un rapport constant toutes les ordonnées. Cependant ce sont ses *Principes de statique et d'hydrostatique* qui ont surtout fondé sa réputation.


Depuis les mathématiciens de l'école d'Alexandrie jusqu'à la fin du xvi<sup>e</sup> siècle, la Mécanique demeura stationnaire. En 1577 seulement l'Italien GUIDO UBALDI perfectionna un peu les lois de l'équilibre des corps solides, en introduisant la considération des *moments* dans la théorie des machines simples. Mais il était réservé à Stevin d'apercevoir la possibilité de représenter les forces par des lignes droites, et de ramener alors les propositions de mécanique à de simples théorèmes géométriques. En particulier il a enseigné la règle du parallélogramme des forces, base de la Statique moderne. On attribue souvent cette découverte à Varignon, ce savant l'ayant énoncée sous la forme qu'on lui donne aujourd'hui; mais il l'a déduite comme conséquence du théorème formulé par le savant brugeois.

Stevin a résolu aussi un problème longtemps agité parmi ses prédécesseurs : le rapport de la puissance au poids sur un plan incliné. Il y parvint en imaginant un chapelet composé de douze sphères également distantes



Fig. 13. — Portrait de NAPIER.

(D'après l'original du Cabinet des estampes de la Bibliothèque Nationale de Paris.)



et disposées sur un support triangulaire. Appliquant ces lois à l'équilibre des liquides, il démontra le paradoxe hydrostatique : un fluide peut exercer sur le fond du vase qui le contient, une pression bien supérieure à son poids, principe dont on fait honneur à Pascal. En outre, Stevin était un ingénieur fort distingué. Ses travaux de fortifications militaires l'avaient surtout rendu très populaire parmi ses compatriotes. Quelques-unes de ses méthodes de travaux hydrauliques sont même encore suivies par les entrepreneurs modernes.

L'emploi des chiffres arabes et des fractions décimales avait beaucoup simplifié les procédés de calcul. A la suite de Stevin, Joost Bürgi ou Byrge, mathématicien suisse, et Jean Hartmann Beyer, géomètre allemand qui publia en 1603 une *Logistica Decimalis*, utilisèrent ses méthodes.

De son côté l'Angleterre, avec THOMAS HARRIOT, contribuait honorablement aux progrès de l'Algèbre. Ce savant perfectionna l'œuvre de Viète, et dans son *Artis analyticae praxis* (1631), il donna une exposition systématique des préceptes qu'il avait inventés ou simplifiés. Ses découvertes sont intéressantes. Ainsi il eut l'idée de faire passer dans un seul membre tous les termes d'une équation ; il montra que toutes les équations d'ordres élevés sont des produits d'équation plus simples ; il se servit des signes  $>$  et  $<$  pour désigner qu'une quantité est plus grande ou plus petite qu'une autre ; il écrivit  $a^2$  pour  $aa$ ,  $a^3$  pour  $aaa$ , etc. Dans un autre ordre d'idées, ayant accompagné Walter Raleigh dans son exploration américaine, il leva d'une façon aussi exacte que possible pour l'époque, la carte de la Virginie et de la Caroline du Nord. C'est une des premières opérations géodésiques exécutées d'une manière scientifique.

Mais il était réservé à son illustre compatriote JOHN NAPIER, baron de Merchiston, d'apporter à la pratique mathématique un de ses plus féconds instruments : les

*logarithmes*. Comme pour Viète, la science n'était qu'un passe-temps pour ce noble anglais, occupé à gérer ses propriétés, à étudier la théologie et à batailler dans les luttes acharnées que les puritains d'Ecosse soutenaient contre la royauté.

Les découvertes astronomiques de Copernic et de Tycho-Brahé avaient dirigé l'attention des calculateurs vers les moyens d'abrégier les opérations trigonométriques, vu la grandeur des nombres qui entraient dans les formules. Quelques auteurs avaient donc orienté leurs recherches de ce côté. WERNER, de Nuremberg, imagina, en 1522, la « prostaphérèse », destinée à remplacer les multiplications et les divisions rencontrées dans la Trigonométrie sphérique par des additions ou des soustractions. Tycho-Brahé paraît s'être servi d'une méthode analogue dans les calculs de l'*Astronomia instaurata*. Puis MICHEL STIFEL, en comparant les progressions géométriques et arithmétiques, constata la relation fondamentale de la théorie des logarithmes ; mais il ne sut pas en déduire les conséquences que Napier allait en tirer.

Le mathématicien écossais décrivit sa découverte dans sa *Logarithmorum canonis descriptio* (1614), mais sans exposer les moyens qu'il avait employés pour y parvenir. Il devait, dit-il dans sa préface, les indiquer ultérieurement. La mort vint empêcher la réalisation de cette promesse. Heureusement son fils nous les a dévoilés, en publiant quatre ans plus tard le manuscrit inachevé de son père, intitulé : *Mirifici logarithmorum canonis descriptio*<sup>1</sup>.

Son procédé, fort ingénieux d'ailleurs, n'indique pas une connaissance des Mathématiques aussi profonde qu'on le croirait. Il n'avait certes pas entrevu, comme

(1) Cet ouvrage fut imprimé à Lyon, en 1620, chez Barthélemy Vincent. Il était devenu presque introuvable quand l'éditeur Hermann, de Paris, l'a réimprimé en 1895. Cette édition est un *fac-similé* page pour page de l'édition l'originale du XVII<sup>e</sup> siècle.

plusieurs historiens se sont plu à le répéter<sup>1</sup>, les analogies entre ses logarithmes et les aires de l'hyperbole équilatère comprises entre cette courbe et ses asymptotes.

Napier formait sa progression géométrique de la façon suivante. Chaque terme égalait le précédent diminué de sa n<sup>e</sup> partie, et une simple soustraction permettait de le trouver. Donc à mesure que le nombre devenait plus grand, son logarithme décroissait. Du reste, ce livre ayant pour principal objectif de venir en aide aux calculateurs qui résolvaient des triangles, on n'y rencontre que les logarithmes des sinus de minute en minute de 0 à 90°, et comme le sinus du quart de cercle forme souvent le premier terme des proportions auxquelles conduisent la résolution des triangles, il égale à zéro le logarithme du sinus total. En outre, pour établir sa table, il se basait sur ce théorème :  $\text{Log. sin } A$  est compris entre  $(1 - \sin A)$  et  $(\text{cosec } A - 1)$ . Pour calculer alors cette valeur il lui suffisait de prendre la moyenne géométrique entre ces deux limites. Enfin il n'a aucune idée de ce que nous appelons aujourd'hui « base » d'un système de logarithme. Sa découverte n'en constituait pas moins une des plus grandes acquisitions de la Science au XVII<sup>e</sup> siècle.

Le grand astronome KEPLER, en publiant sa *Chilias Logarithmorum* (1622), fit beaucoup pour la propagation en Allemagne de la doctrine népérienne<sup>2</sup>.

(1) M. NAPIER. *Memoirs of John Napier of Merchiston*. Edimbourg, 1834.

(2) Son œuvre astronomique est de beaucoup la plus importante. Mais elle sort de notre cadre. Rappelons ses fameuses lois relatives aux mouvements des planètes, qu'on trouve exposées dans son *Astronomia nova* (1609). On rencontre dans son *Harmonice mundi* (1619) d'intéressantes considérations sur les polygones étoilés. Enfin dans sa *Stereometria doliorum* où il s'occupe de la cubature des solides engendrés par la rotation des coniques autour d'axes contenus dans leurs plans, on voit plusieurs formules inexactes. Ces quelques taches ne sauraient d'ailleurs obscurcir sa gloire, car, selon la belle image de M. Joseph Bertrand, « elle est écrite dans le ciel ; les progrès de la science ne peuvent ni la diminuer ni l'obscurcir, et les planètes, par la succession toujours constante de leurs mouvements réguliers, la raconteront de siècle en siècle ».

Benjamin Ursinus et son gendre Bartsch le secondèrent. Un professeur du Gresham's College d'Oxford, HENRY BRIGGS, ne tarda pas à se rendre compte de tout le parti qu'on pouvait tirer de cette invention. Il fit même un voyage pour conférer avec Napier à ce sujet (1614), et probablement lui suggéra le choix de 10 comme base. Quoi qu'il en soit, Briggs publia en 1618 sa *Logarithmorum Chilias prima* où cet important perfectionnement était appliqué pour la première fois aux nombres de 1 à 1 000 avec 14 décimales. Six ans plus tard, dans son *Arithmetica logarithmica*, il compléta cet essai en donnant les logarithmes de 1 à 20 000 et de 90 000 à 100 000.

Plusieurs autres mathématiciens suivirent encore l'impulsion donnée. Ed. Gunther, le collègue de Briggs, avait mis, dès 1620, son précieux *Canon of triangles* entre les mains de tous les calculateurs. Cavalieri, dans son *Directorium universale uranometricum*, révéla à l'Italie ces principes. Le mathématicien français Henrion publia, en 1626, un excellent *Traité des logarithmes*, et peu après le géomètre hollandais Adrien Vlacq comblait la lacune des tables précédentes. Dès lors, les logarithmes avaient droit de cité dans tout l'univers civilisé. Les astronomes étaient en possession de merveilleux instruments : Napier venait de leur donner les logarithmes pour abréger leur calcul, et Galilée, en les dotant du télescope, agrandissait démesurément leur champ d'observation.

---

## CHAPITRE XIV

### **La Géométrie de Descartes (1637). — Les travaux de Fermat et de Pascal.**

Pendant le xvi<sup>e</sup> siècle et les premières années du xvii<sup>e</sup> nous avons vu se dessiner une renaissance des Sciences. Les physiciens et les astronomes durent faire appel aux mathématiciens pour mettre en œuvre les riches matériaux qu'ils avaient accumulés grâce aux perfectionnements apportés aux procédés d'observation. Ce mouvement va s'accroître encore dans la période que nous allons étudier. Descartes, en inventant la Géométrie analytique, Leibniz et Newton en découvrant le Calcul infinitésimal, ouvriront aux savants des horizons insoupçonnés. Fermat ira « plus loin que ses successeurs » dans ses recherches sur les nombres, et Pascal créera le calcul des probabilités. Quelle admirable succession de découvertes !


La conception de DESCARTES renouvela la Géométrie. Elle fournit aux mathématiciens des méthodes générales qui jusqu'ici leur avaient manqué et dont le défaut avait souvent frappé de stérilité leurs plus louables efforts. Cette idée fut en quelque sorte la préface nécessaire aux célèbres inventions newtoniennes.

Quelques lignes de biographie tout d'abord.

René Descartes, seigneur du Perron, naquit à La Haye, petite ville située sur la rive droite de la Creuse, le 31 mars 1596. Après des études brillantes au collège

de La Flèche tenu alors par les Jésuites, il embrassa la carrière des armes, sans grand goût d'ailleurs, puisqu'il dit en propres termes dans une de ses lettres qu'il a de la peine à la ranger parmi les professions honorables, « voyant que l'oisiveté et le libertinage sont les deux principaux motifs qui y portent aujourd'hui la plupart des hommes ». Il s'engagea d'abord dans les troupes du prince Maurice de Nassau, et deux années de paix lui permirent d'entrer en relations avec plusieurs mathématiciens hollandais. Puis, quittant le service des princes d'Orange (1619), il servit dans les troupes du duc de Bavière. C'était à vrai dire un singulier soldat : l'anecdote suivante est là pour l'attester. Rencontrant à Ulm le professeur Jean Faulhaber, il résolut plusieurs problèmes que celui-ci lui proposa, et charmé de sa compagnie il songea seulement plusieurs mois après à rejoindre son corps. Ensuite il se rendit en Bohême et arriva à Prague juste à temps pour participer à la célèbre bataille qui s'y livra le 7 novembre 1620. Enfin il passa en Hongrie l'année suivante, et abandonna une première fois l'uniforme pour visiter en touriste la Silésie, la Pologne et les côtes de la Baltique.

Descartes revint en France au début de 1622. Après une nouvelle fugue en Suisse et en Italie, la capitale l'attira encore. Il y séjourna en 1626 et 1627, fréquentant des savants comme Desargues, de Beaune, Mydorge ou son ancien condisciple le P. Mersenne, des littérateurs et des magistrats tels que Balzac et Hardi. Mais brusquement il s'arracha à cette vie intellectuelle pour aller guerroyer au siège de La Rochelle. Cette ville tombée aux mains de Richelieu, notre héros retourna à Paris pour régler quelques affaires, et alla se fixer définitivement en Hollande (1629), seul pays où régnait alors la liberté. Il allait y trouver, durant vingt ans, le calme nécessaire aux spéculations scientifiques. C'est à Amsterdam d'abord puis dans un petit castel près de Franeker et surtout à Egmond-de-Bineau qu'il composa




*Dessiné par Goussier.*

*Gravé par Courtman.*

Fig. 14.

Portrait de RENÉ DESCARTES.

(D'après le tableau de HALS, Musée du Louvre.)



presque tous ses ouvrages. Enfin, pour terminer de suite ce qui est relatif à sa vie<sup>1</sup>, disons que la reine Christine l'attira en Suède (1649). Il y fut reçu magnifiquement, et logé à l'ambassade française de Stockholm. Mais sa santé débile ne put supporter les rigueurs du climat. Il succomba à une fluxion de poitrine, le 11 février 1650.

Laissant de côté son œuvre philosophique, le principal écrit de Descartes est sa *Géométrie* (1637), où se trouvent consignées ses immortels travaux. Le géomètre tourangeau esquisse à ses successeurs la voie à suivre. Il n'a pas voulu composer un traité didactique à leur usage, mais leur tracer simplement le cadre qu'ils auraient à remplir.

Les courbes, découvertes par les Grecs au fur et à mesure des besoins, n'étaient reliées entre elles par aucune relation. Descartes sentit la nécessité d'apporter quelque ordre dans ce domaine. Il fallait d'abord arriver à définir ces figures, ou en d'autres termes poser les règles permettant de les construire. Tout se ramenait, somme toute, à fixer d'une manière précise la position d'un point dans un plan. Or celle-ci ne dépend que de deux éléments, ses « coordonnées ». Donc la définition d'une courbe, autrement dit son équation, n'est pas autre chose que la relation entre les coordonnées de ses points. Il est facile alors d'établir des formules générales s'appliquant ensuite aux cas particuliers.

Après avoir exposé l'idée directrice de la *Géométrie*, passons à son examen.

L'auteur commence d'abord par établir les bases de son système de coordonnées (rectilignes). Il montre que dans un plan, un point M est entièrement défini par ses distances MP et MQ à deux droites fixes  $xx'$ ,

---

(1) Voir pour plus de détails : BAILLET, *Vie de Descartes*, 2 vol. Paris, 1691-93.

$yoy'$  qui se coupent. Maintenant, si on trace une courbe quelconque sur un plan et que l'on considère les coordonnées de chaque point de cette ligne, à toute valeur de  $x$  correspondront une ou plusieurs valeurs de  $y$ , celle-ci sera donc fonction de  $x$  et la relation  $y = f(x)$  caractérisant les divers points du lieu géométrique sera son équation. Descartes était parvenu à traduire en relations numériques des propriétés géométriques.

Ensuite il divise les courbes en deux catégories : les premières ou « géométriques » peuvent s'engendrer par l'intersection de deux lignes se mouvant chacune parallèlement à un des axes de coordonnées avec des vitesses




Fig. 15.

commensurables (conchoïde, cissoïde, par exemple); les secondes ou « mécaniques », dont le rapport des mouvements qui les engendrent est inconnu (spirale, quadratrice, cycloïde, etc.).

Il ne s'occupe que de celles-là, et nous verrons plus tard Leibniz modifier sa classification.

Descartes s'attache aussi dans sa *Géométrie* à fournir une règle générale du problème des tangentes. Puis, dans la dernière partie, consacrée exclusivement à l'Algèbre, il introduit l'usage des premières lettres de l'alphabet pour désigner les quantités connues, et celles de la fin pour représenter les inconnues. Il emploie les exposants tels que nous le faisons aujourd'hui, il simplifie la théorie de la transformation des équations données par Viète et il s'occupe de trouver les racines commensurables. Ensuite il aborde les équations du 3<sup>e</sup> et du 4<sup>e</sup> degré. Fournissant les règles nécessaires à leur résolution, il démontre qu'on ne saurait les construire à l'aide seulement de la règle et du compas. Le premier il fit voir qu'il était aussi logique de représenter les grandeurs négatives que les quantités positives, et qu'il était suffisant d'établir un théorème dans

un cas général pour qu'il se vérifie dans tous les cas particuliers.

D'autre part, il énonce, au cours de ces pages, la règle si importante pour déterminer le nombre des racines positives et négatives. Enfin, en introduisant la méthode des coefficients indéterminés, il pensait avoir donné un procédé absolument général pour résoudre les équations algébriques d'un degré quelconque ; mais l'avenir devait donner un démenti à sa trop grande confiance.

Peu de temps après l'apparition de la *Géométrie*, comme Descartes avait omis « beaucoup de choses qui pouvaient y être ajoutées pour la commodité de la pratique », ainsi qu'il l'avoue dans sa préface, de Beaune l'annota afin d'en faciliter l'accès aux moins savants. Il y réussit fort bien puisque son illustre ami lui-même tenait ce commentaire en grande estime.

Parmi les autres livres de Descartes, l'*Optique* et les *Météores* appartiennent plus à la Physique qu'aux Mathématiques. Quant à son *Explication des machines*, de curieuses vues y sont exposées. Dans ce court aperçu, il s'efforçait de mettre en lumière que l'invention des « engins par l'aide desquels on peut avec une petite force lever un fardeau », repose sur le principe suivant : La même force qui peut soulever un poids « de 100 livres à la hauteur de deux pieds, en peut aussi lever un de 200 livres à la hauteur d'un pied, ou un de 400 à la hauteur d'un demi-pied. » Descartes appelle donc *force* ce que nous dénommons aujourd'hui *travail*. D'autre part, il pose le principe de la conservation de la quantité de mouvement, et arrive à quelques lois relatives à la théorie du choc ; mais les exemples qu'il donne semblent un peu confus.

La grande découverte cartésienne fut le signal d'une rénovation algébrique. DE BEAUNE, un des premiers qu'elle enthousiasma, fixa les limites supérieure et inférieure des racines réelles ; Pascal, dont nous étu-

dierons plus loin les remarquables recherches, imagina son triangle arithmétique pour calculer les coefficients du développement d'un binôme élevé à une certaine puissance. DE SLUSE perfectionna le mode de construction des racines des équations algébriques par l'intersection des courbes, et WALLIS se servit des exposants fractionnaires et négatifs. Enfin, la *méthode des indivisibles* apparut. En quelque sorte, ce procédé peut rendre les mêmes services que le calcul intégral tel que nous l'appliquons aujourd'hui, mais limité à l'intégration des fonctions différentielles. On en est redevable au savant jésuite italien CAVALIERI, qui professa longtemps à Bologne. Sa découverte se trouve rapportée dans sa *Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota* (1635), et il l'a perfectionnée par la suite dans ses *Exercitationes geometricæ* (1647). Bien qu'elle soit oubliée aujourd'hui, elle est curieuse, car elle jette le pont entre la méthode d'exhaustion d'Archimède et l'Analyse infinitésimale de Newton.

Cavalieri imaginait le continu comme une infinité de parties insécables, termes ultimes de sa subdivision en tranches parallèles. « L'indivisible » devait changer de nom cinquante ans plus tard, et s'appeler « l'élément différentiel ». Grâce à ces considérations, la grandeur relative de deux surfaces ou de deux solides se trouvait alors aisément par la sommation d'une suite de lignes ou de plans. Soit à comparer, par exemple, un triangle au parallélogramme ayant même base et même hauteur ; il suffira de décomposer les deux figures au moyen de parallèles aux bases, équidistantes entre elles. La comparaison du tétraèdre au parallélépipède de même base et de même hauteur s'établira d'une façon analogue en les décomposant en éléments par des plans parallèles aux bases. Au moyen de ce procédé, le géomètre milanais put résoudre un certain nombre de problèmes proposés par Képler, entre autres celui relatif à la mesure



Fig. 16.

Portrait de FERMAT, d'après la gravure placée en tête de ses *Œuvres*.  
Toulouse, 1679.



des fuseaux paraboliques et hyperboliques. Aussi, malgré les vices de raisonnement qu'on rencontre dans les applications, il eut une féconde influence sur le progrès de l'Analyse.

GULDIN critiqua la méthode des indivisibles, mais à l'aide d'objections peu intéressantes. CAVALIERI lui répondit en démontrant l'important théorème de son destructeur relatif au centre de gravité, précisément à l'aide des principes objets du litige. Il eût été difficile d'être plus spirituel. D'ailleurs, l'obscurité du *Centrobarytica*, où cette proposition se trouve établie, a contribué à faire oublier son auteur, qu'il faut souvent deviner.

FERMAT, « le premier homme du monde » au dire de Pascal, suivit dans l'application de l'Algèbre à la Géométrie une route assez différente de celle adoptée par Descartes. La renommée de l'un n'obscurcit pas la gloire de l'autre. Mais le premier, génie peut-être plus profond, laissa dans toutes les branches des Mathématiques une note personnelle. Né à Beaumont-de-Lomagne, près de Montauban, en 1601, sa vie uniquement consacrée aux travaux intellectuels n'offre guère de particularités. Il était fils d'un marchand de cuir qui, jouissant d'une honnête aisance, put lui donner une éducation soignée. Le jeune Fermat, après avoir terminé ses études de droit à Toulouse, devint conseiller au Parlement de cette ville, fonction qu'il remplit jusqu'à sa mort (12 janvier 1665).

Voici comment Lagrange <sup>1</sup>, un juge compétent, caractérise l'œuvre scientifique de ce précurseur.

« Dans sa méthode *De maximis et minimis* il égale l'expression de la quantité dont on recherche le maximum ou le minimum à l'expression de la même quantité dans laquelle l'inconnue est augmentée d'une quantité indéterminée. Il fait disparaître dans cette équation les radicaux et les fractions, s'il y en a, et, après avoir

---

(1) LAGRANGE. *Leçons sur le calcul des fonctions*. Paris, 1806.

effacé les termes communs dans les deux membres, il divise tous les autres par la quantité indéterminée qui se trouve les multiplier; ensuite il fait cette quantité nulle, et il a une équation qui sert à déterminer l'inconnue de la question. Or, il est facile de voir au premier coup d'œil que la règle déduite du Calcul différentiel, qui consiste à égaler à zéro la différentielle de l'expression qu'on veut rendre maximum ou minimum, prise en faisant varier l'inconnue de cette expression, donne le même résultat, parce que le fond est le même et que les termes qu'on néglige comme infiniment petits dans le Calcul différentiel, sont ceux qu'on doit supprimer comme nuls dans le procédé de Fermat. »

Celui-ci du reste ne se donnait même pas la peine de publier ses inventions, aussi plusieurs de ses travaux ont-ils été perdus, ou il faut en rechercher la trace dans sa correspondance, mise à jour seulement après sa mort, en 1679. Il se bornait à appliquer son procédé à des exemples. Huygens et Barrow devaient plus tard le présenter sous une forme plus pratique. Parmi les applications originales imaginées par Fermat, il faut noter la détermination de l'aire de la parabole et de l'hyperbole d'un degré quelconque et du centre de gravité d'un paraboloïde de révolution.

La théorie des nombres, délaissée depuis tant de siècles, fut reprise seulement au XVII<sup>e</sup> siècle par Fermat et Pascal. Le génie du premier se complut surtout dans cette étude, et ses idées à ce sujet semblent avoir été très particulières. Plusieurs de ses théorèmes, après avoir exercé la sagacité des Euler et des Legendre, sont même restés sans démonstration. C'est au cours de recherches exécutées en vue d'une nouvelle édition de Diophante, qu'il se tourna de ce côté et sut, grâce à une méthode dont nous ignorons le secret, « s'avancer plus loin que ses successeurs »<sup>1</sup>.

---

(1) LIBRI. In *Revue des Deux-Mondes* (mai 1845).

La plus célèbre de ses propositions arithmétiques est la suivante :

La somme ou la différence de deux cubes n'est jamais un cube, ou d'une manière plus générale au-dessus du carré aucune puissance n'est décomposable en deux puissances de même nom<sup>(1)</sup>.

Enfin Fermat participa à une autre découverte de son temps, le *Calcul des probabilités* ; mais pour éviter des redites, nous en parlerons seulement plus loin, lorsque nous analyserons les œuvres de son promoteur Blaise Pascal.

Le magistrat de Toulouse fut donc un des plus grands noms de l'histoire des Mathématiques. Malgré le peu de temps que ses fonctions lui permettaient de consacrer à la science, il sut comme Viète se créer une place à part. En appliquant l'Algèbre à la Géométrie, il se fit l'égal de Descartes. Qui pourrait dire si Leibniz et Newton ne doivent pas à ses vues le trait de lumière qui les a guidés vers l'analyse infinitésimale ? Avec l'auteur des « Provinciales » il fut un des pionniers de la théorie des hasards, et surtout s'il a des rivaux dans les autres branches, ses découvertes sur les nombres lui assurent une supériorité unique. Dans ce domaine, on chercherait en vain son émule. Géant sublime, sphinx impénétrable, il s'est frayé des routes qu'aucun savant n'a encore pu retrouver malgré les ressources modernes. C'est un privilège sans exemple dans les annales de la Science.

Avec BLAISE PASCAL qui naquit à Clermont le 19 juin 1623, l'Arithmétique, la Géométrie, l'Algèbre et la Mécanique vont s'enrichir tour à tour, et le Calcul des probabilités va naître. Dès son jeune âge, notre futur savant montra les plus rares aptitudes au travail. Aussi son

---

(1) En d'autres termes, l'équation  $x^n + y^n = z^n$  ne peut être satisfaite pour aucune valeur entière de  $x, y, z$ , si  $n$  est supérieur à 2. Cette proposition dite *théorème de Fermat* n'a été démontrée que pour des valeurs particulières de  $n$ .

père, président de la Cour des aides, abandonna-t-il sa charge en 1631 pour venir à Paris se consacrer exclusivement à l'éducation de son enfant dont il voulut être le premier et l'unique maître. Mais poussant son fils beaucoup plus vers le grec et le latin que vers la Science, il lui avait caché tous les livres mathématiques de sa bibliothèque. Une rencontre extraordinaire, racontée par sa sœur en ces termes, allait cependant le déterminer à développer les goûts du jeune Blaise dans cette voie, et nous la rapportons ici car elle nous montre l'éveil d'un génie précoce : « Mon père était homme savant dans les Mathématiques, et avait l'habitude par là avec tous les habiles gens en cette Science, qui étaient souvent chez lui<sup>1</sup>; mais comme il avait dessein d'instruire mon frère dans les langues, et qu'il savait que la Mathématique est une Science qui remplit et qui satisfait beaucoup l'esprit, il ne voulut point que mon frère en eût aucune connaissance, de peur que cela ne le rendit négligent pour la langue latine et les autres sciences dans lesquelles il voulait le perfectionner. Mon frère voyant cette résistance, lui demanda un jour ce que c'était que la Mathématique, de quoi on y traitait : mon père lui dit en général que c'était le moyen de faire des figures justes, et de trouver les proportions qu'elles avaient entre elles, et en même temps lui défendit d'en parler davantage et d'y penser jamais. Mais cet esprit qui ne pouvait demeurer dans ces bornes, dès qu'il eut cette simple ouverture, que la Mathématique donnait des moyens de faire des figures infailliblement justes, il se mit lui-même à rêver sur cela à ses heures de récréation; et étant seul dans une salle où il avait coutume de se divertir, il prenait du charbon et faisait des figures sur des carreaux, cher-

---

(1) Entre autres, le P. Mersenne, Roberval, Mydorge et Carcavi, qui s'assemblaient également au couvent des Minimes, place Royale, chez le P. Mersenne. Ces conférences furent même l'origine de l'Académie des Sciences, fondée seulement en 1660.



L. C. Pascal père.

Fig. 17.

(D'après une gravure du XVIII<sup>e</sup> siècle, tirée du cabinet de M. Guerrier de Bezance, alors maître des Requêtes.)



chant des moyens de faire, par exemple, un cercle parfaitement rond, un triangle dont les côtés et les angles fussent égaux, et autres choses semblables. Il trouvait tout cela tout seul; ensuite il cherchait les proportions des figures entre elles. Mais comme le soin de mon père avait été si grand de lui cacher toutes ces choses, il n'en savait pas même les noms. Il fut contraint de se faire lui-même des définitions : il appelait un cercle un rond, une ligne une barre, et ainsi des autres. Après ces définitions, il se fit des axiomes, et enfin il fit des démonstrations parfaites; et comme l'on va de l'un à l'autre dans ces choses, il poussa les recherches si avant, qu'il en vint jusqu'à la trente-deuxième proposition du premier livre d'Euclide (la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits). Comme il en était là-dessus, mon père entra dans le lieu où il était, sans que mon frère l'entendit; il le trouva si fort appliqué, qu'il fut longtemps sans s'apercevoir de sa venue. On ne peut dire lequel fut le plus surpris, ou le fils de voir son père, à cause de la défense expresse qu'il lui en avait faite, ou le père de voir son fils au milieu de toutes ces choses. Mais la surprise du père fut bien plus grande, lorsque, lui ayant demandé ce qu'il faisait, il lui dit qu'il cherchait telle chose, qui était la trente-deuxième proposition d'Euclide. Mon père lui demanda ce qui l'avait fait penser à chercher cela : il dit que c'était qu'il avait trouvé telle autre chose; et sur cela lui ayant fait encore la même question, il lui dit encore quelques démonstrations qu'il avait faites; et enfin, en rétrogradant et s'expliquant toujours par les noms de rond et de barre, il en vint à ses définitions et à ses axiomes. Alors son père lui donna les *Éléments* d'Euclide pour les lire à ses heures de récréation. Il les vit et les entendit à lui tout seul, sans avoir jamais besoin d'aucune explication; et pendant qu'il les voyait, il composait et allait si avant... qu'à l'âge de seize ans il fit un traité *Des Coniques* qui passe pour un si grand effort

d'esprit, qu'on disait que depuis Archimède on n'avait rien vu de cette force <sup>1</sup>. »

Ce petit opuscule où se trouvent en germe les méthodes de géométrie moderne, fut mis au jour en 1640, il ne fut à nouveau tiré de l'oubli qu'en 1779, lorsque Bossut publia son édition des Œuvres du célèbre mathématicien. C'était le canevas d'un ouvrage où étaient exposées les découvertes de Pascal sur ce sujet. On y rencontre le théorème sur « l'hexagramme mystique » qui, énoncé comme lemme au début de l'ouvrage, sert à déduire le reste. Sous ce nom, il désigne la propriété fondamentale que possède tout hexagone inscrit à une conique d'avoir les trois points de concours de ses côtés opposés en ligne droite. Cinq points suffisant à déterminer une conique, cette proposition fournit une relation de position d'un sixième point quelconque de cette courbe par rapport aux cinq autres. À l'aide de ce principe, il arrive à démontrer la relation suivante due à Desargues : Le produit des segments compris sur la transversale entre un point de la conique et deux côtés opposés du quadrilatère, est au produit des segments compris entre le même point de la conique et les deux autres côtés opposés du quadrilatère, dans un rapport qui est égal à celui des produits semblablement faits avec le second point de la conique situé sur la transversale. Desargues dénomma ce théorème « involution des six points ». Les nombreuses conséquences que les géomètres modernes en ont tirées montrent assez sa fécondité.

Deux ans après, Pascal inventait la *Machine arithmétique*, remarquable conception et entreprise hardie, la Mécanique pratique étant alors fort peu avancée. Il se proposait de remplacer « toutes sortes de supputations » par des mouvements et des combinaisons de

---

(1) M<sup>me</sup> PÉRIER. *Vie de Blaise Pascal*. Paris, 1665. Pascal était mort à Paris, le 19 août 1662.

roues. Il y arriva après bien des tâtonnements, des difficultés d'exécution sans nombre, car, ainsi qu'il l'écrivit dans sa dédicace au chancelier Pierre Séguier, « les artisans ont plus de connaissance de la pratique de leur art, que des sciences sur lesquelles il est fondé ». Néanmoins le modèle put être réalisé, et est aujourd'hui dans les collections du Conservatoire des arts et métiers à Paris.

Au milieu d'infirmités survenues avant l'âge, Pascal donna en 1653 son traité sur *Le triangle arithmétique*, destiné à obtenir rapidement les coefficients des puissances successives d'un binôme. La loi de formation de ces derniers avait été trouvée par Viète, et Newton un peu plus tard en indiqua la formule. Dans un autre domaine scientifique, le nom de Pascal est intimement lié à celui de Fermat parmi les inventeurs du *Calcul des probabilités*. Il peut même en être regardé comme le véritable fondateur. En 1654, le chevalier de Méré lui proposa deux difficultés à résoudre :

D'abord de savoir en combien de coups on pouvait parier avec avantage d'amener sonnez avec deux dés, et deuxièmement de formuler une règle pour distribuer équitablement les mises à un moment donné de la partie, entre deux joueurs inégalement partagés, désirant se retirer avant le dernier coup.

A l'aide d'ingénieux raisonnements, il parvint à mesurer le degré mathématique de croyance qu'on pouvait attribuer à de simples conjectures. Il posa les bases de la théorie des hasards, transformant ainsi la question oiseuse d'un mondain frivole en une mémorable découverte. Fermat, par une méthode différente, généralisa les résultats, et au seul cas particulier envisagé par son devancier, il substitua un corps de doctrine parfaitement ordonnée. Dès lors une « science sans racines dans le passé <sup>1</sup> », était fondée.

---

(1) GOURAUD, *Histoire du Calcul des probabilités*, Paris, 1848.

Le dernier ouvrage mathématique de notre philosophe concerne la *Cycloïde* (1658). Cette courbe est engendrée par un point de la circonférence d'un cercle roulant sans glisser sur une droite fixe nommée base. On croit devoir attribuer au cardinal de Cusa et à Charles de Bovelles (1511) les premières notions qui s'y rapportent, mais ils la considéraient comme un simple arc de cercle. Roberval reprit le sujet et Pascal résolut plusieurs questions relatives aux solides formés par la rotation de cette courbe autour de sa base ou de son axe, grâce à un nouveau procédé d'analyse présentant beaucoup d'analogie avec celui de Cavalieri.

Parmi les autres mathématiciens de cette époque, à côté des Descartes ou des Fermat et bien près d'eux par la perspicacité de son génie, se place DESARGUES, méconnu de son vivant, oublié après sa mort. Ce géomètre, dont un érudit moderne, Poudra, a remis en lumière la curieuse physionomie, naquit à Lyon en 1593, mais passa la plus grande partie de sa vie à Paris. Non content d'innover dans le domaine de la Science, il aurait voulu aussi la vulgariser. Sentant quelle portée sociale avait sa diffusion dans les classes laborieuses, il enseignait le soir aux charpentiers de la Capitale la Stéréotomie et la Perspective. Dans des leçons pleines de bonhomie il tâchait de leur en rendre familières les notions, si utiles pour la pratique de leur métier. Il est triste à dire qu'il n'eut pas le succès dont il s'était flatté, et que dépité de l'apathie des artisans parisiens il alla poursuivre ces cours dans sa ville natale.

Si ses contemporains ne surent pas le comprendre et seconder ses vues, la postérité lui a rendu justice. Que de titres d'ailleurs ses méthodes si fécondes ne lui donnent-elles pas ? Dans son *Brouillon projet d'une atteinte aux événements des rencontres d'un cône avec un plan* (1639), perdu pendant le XVIII<sup>e</sup> siècle et retrouvé seulement par Chasles en 1845, il développe cette idée que les différentes sections coniques (cercle, ellipse,

hyperbole, parabole, système de deux droites) sont des variétés d'une même courbe, et au lieu de les étudier séparément, comme les Anciens l'avaient fait, il envisage sur le cône les diverses positions du plan sécant, sans utiliser le triangle par l'axe.

Ce livre débute par la considération suivante et ses conséquences : plusieurs droites parallèles entre elles concourent en un même point situé à l'infini. Comparant ensuite les systèmes de droites aux courbes, Desargues découvre l'intéressante relation des segments déterminés par une conique et par les quatre côtés du quadrilatère inscrit sur une transversale quelconque tracée dans le plan de la courbe et qu'il nomme « involution des six points », désignation consacrée depuis par l'usage.

Notre époque a montré combien de théories étaient contenues en germe dans ce beau théorème. Servois l'a reproduit le premier en 1805, Brianchon l'a pris pour base de son curieux mémoire sur les lignes de deuxième ordre (1817), le général Poncelet n'a dû qu'à lui la découverte des propriétés des figures homologiques ; sans parler des secours que Simson, Newton et Chasles ont su en tirer.

Desargues a laissé encore une *Méthode universelle de mettre en perspective les objets donnés réellement*, où se trouve ce principe souvent appliqué depuis : si deux triangles, situés dans l'espace ou dans un même plan ont leurs sommets placés deux à deux sur trois droites concourant en un même point, leurs côtés se rencontrent deux à deux en trois points situés en ligne droite, et réciproquement.

Nous n'insisterons pas sur les autres écrits du grand géomètre lyonnais, relatifs à la coupe des pierres, et au tracé des cadrans. La place nous manque pour relater les nouveautés qu'ils renferment, et surtout la généralité des résultats qui y sont exposés. Aussi le surnom de « Monge de son siècle » lui a été justement décerné, car entre l'auteur de la *Géométrie descrip-*

tive et Desargues il y a plus d'un trait de ressemblance.

Indépendamment de ces Maîtres, vivaient quelques savants de moindre importance. L'un d'eux, MYDORGE, conseiller au Châtelet de Paris, avait publié, en 1631, deux livres sur les *Sections coniques*, composés à la manière des Grecs. Il ne s'y préoccupe guère que de simplifier les démonstrations, sans essayer comme Pascal ou Desargues de déduire les propriétés de ces courbes de celles du cercle, soit au moyen de la Perspective, soit par la considération constante du cône qui les engendre. Un autre Français, GILLES PERSONNIER DE ROBerval, lié lui aussi avec Descartes et le P. Mersenne, imagina un principe général pour résoudre le problème des tangentes aux courbes. Il y arriva en introduisant en Géométrie les règles cinématiques que Galilée venait d'appliquer tout récemment en Mécanique. Mais il ne sut pas étendre la doctrine métaphysique qui présidait à ce procédé, et en tirer toutes les conclusions qu'en partant d'un point de vue analogue le génie perspicace de Newton devait découvrir. Sans un moyen analytique uniforme, comme celui des « fluxions » par exemple, il était impossible pratiquement de la mettre en valeur. « La conception de Roberval était à la même hauteur que celle de Descartes et de Fermat <sup>1</sup>. » Elle leur cédait seulement par l'aide puissante de l'Analyse qu'ils surent appeler à leur secours.

Roberval examina encore, dans son *Traité des indivisibles*, diverses questions relatives à la quadrature de l'hyperbole et de la parabole proposées par Fermat. L'italien Cavalieri l'avait précédé dans cette voie. Toutefois, dans une lettre de 1644, adressée à Torricelli, Roberval se vante d'être en possession de sa méthode depuis longtemps. Mais on ne peut juger que sur des documents ; or son livre ainsi que ses autres mémoires, parurent seu-

---

(1) CHASLES. *Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en Géométrie*, 3<sup>e</sup> édit. Paris, 1889.

deiment en 1693, dix-huit ans après sa mort: S'il a « ménagé les oreilles des géomètres » afin d'avoir sur eux une « supériorité flatteuse », comme il l'avoue ingénument, il s'est privé aux yeux de la postérité du bénéfice de cette invention.

Quoi qu'il en soit, la découverte du Calcul infinitésimal était dans l'air. Un jésuite belge, trop ignoré aujourd'hui, GRÉGOIRE DE SAINT-VINCENT, aplanissait le chemin en publiant sa *Quadratura circuli et sectionum conici* (1647). En opérant la quadrature de l'hyperbole il démontra que la surface entre les asymptotes croît en progression arithmétique tandis que l'abscisse augmente en progression géométrique ou en d'autres termes que les aires sont des logarithmes des abscisses. Il perfectionna aussi, grâce à un procédé particulier, la méthode d'exhaustion d'Archimède. A ce propos, il considère le petit triangle différentiel formé par la parabole et deux côtés consécutifs de l'un des deux « polygones à échelles » (inscrit et circonscrit). Cette figure peut avoir conduit Leibniz et Newton à leur sublime invention. Cela soit dit sans penser à amoindrir la gloire de ces immortels génies.

L'Histoire des Sciences vérifie à chaque pas le fait que les plus remarquables progrès s'opèrent rarement par des divinations subites, mais ne sont que l'évolution logique du persévérant labeur de plusieurs générations.

Si les chercheurs travaillaient beaucoup dans ces nouvelles directions, la Géométrie à la manière des Anciens n'était pas délaissée entièrement. PHILIPPE DE LAHIRE traitait des *Sections coniques* (1685) envisagées de la sorte. Pour engendrer ces figures et déterminer leurs principales propriétés, les Grecs menaient dans le cône un plan normal au triangle par l'axe. Trois cônes différents leur étaient alors nécessaires pour avoir l'ellipse, l'hyperbole et la parabole. Lahire voulut abréger ce moyen en le remplaçant par une méthode plus facile et plus logique. Il prit comme point de départ les

propriétés du cercle qui devaient se retrouver dans les sections coniques. Si la marche synthétique qu'il suivit se rapprochait de la doctrine ancienne, elle en différait donc assez notablement. Ses contemporains l'accueillirent du reste très favorablement. Enfin dans son *Mémoire sur les épicycloïdes* (1694) il détermina géométriquement la forme des engrenages utilisés pour la construction des roues dentées.

Le hollandais CHRISTIAN HUYGENS fut à la fois mathématicien, physicien, chimiste et dans chaque partie des sciences qu'il a cultivées il se révéla novateur original. Né à La Haye en 1629, il termina ses études à l'université de Bréda où plus tard il devait se faire, comme le professeur van Schooten, le vulgarisateur de la géométrie cartésienne. Dès 1651 il rectifiait, dans ses *Theoremata de quadratura hyperboles, ellipsis et circuli*, quelques erreurs de Saint-Vincent et en 1656 il publiait son *De ratiociniis in ludo alex*, le premier ouvrage complet sur le calcul des probabilités dont Pascal et Fermat venaient de poser les premiers jalons. L'année suivante paraissait son *Horologium oscillatorium* ouvrage capital qui ne peut être comparé qu'aux *Principes* de Newton. Ce dernier admirait d'ailleurs beaucoup les travaux de celui qu'il avait surnommé « Summus Hugenius <sup>1</sup> ». Entrons donc dans quelques détails au sujet de ce traité.

Le premier chapitre est consacré à la description des horloges à pendule, une de ses plus utiles inventions. Dans le deuxième il étend la découverte de Galilée, concernant l'accélération des graves tombant librement sous l'action de la pesanteur ou glissant sur des plans inclinés, aux corps qui se meuvent sur des courbes données. Il trouve alors que la cycloïde jouit de cette remarquable propriété d'être *tautochrone* dans le vide.

On rencontre dans la troisième partie, la théorie des développées qui eut par la suite tant d'usages heureux.

---

(1) HÆFER. *Histoire des Mathématiques*, 3<sup>e</sup> édit. Paris, 1886.

Il avait surtout en vue l'application de la « cooluta <sup>1</sup> » à la rectification des courbes. Un peu plus loin, il résout le problème des centres d'oscillation, proposé par Mersenne, en appliquant une des règles les plus fécondes de la Mécanique, celle dite aujourd'hui principe de la conservation des forces vives. Puis dans la dernière partie outre une nouvelle construction de ses horloges, il donne plusieurs théorèmes sur la force centrifuge et le mouvement circulaire. Grâce à l'utilisation de ces dernières propositions dans la recherche du déplacement de la Terre autour de son axe et de celui de la Lune autour de notre globe, Newton put découvrir les lois de gravitation de ces corps célestes.

Parmi les autres travaux d'Huygens, dont beaucoup sortent de notre cadre, tels que la découverte des anneaux de Saturne par exemple, il nous faut donner un moment d'attention au *Traité de la lumière* (1690) car c'est la première application véritablement rationnelle de la Mathématique à la Physique érigée en corps de doctrine. Là se voit exposée la théorie des ondulations, qui, après avoir eu de nombreux adversaires au cours du xviii<sup>e</sup> siècle et dans le nôtre, est actuellement triomphante, grâce aux travaux des Fresnel et des Foucault. L'auteur s'appuie sur le remarquable principe qui a conservé son nom. Il consiste à admettre que le mouvement de l'éther en un point quelconque d'une onde lumineuse, occupant une certaine position, est la résultante des vibrations qu'y enverraient toutes les parties de la même onde considérée dans l'une de ses positions antérieures.

Huygens en déduit la sphéricité des ondes et la loi de la réflexion pour un milieu homogène. Il se base ensuite sur ce théorème pour étudier la réfraction. Lorsque des rayons parallèles entre eux tombent sur une surface plane, si l'on imagine un plan perpendiculaire à

---

(1) C'est ainsi qu'Huygens nomme la *développée*.

la direction du faisceau et que de chaque point de la surface dirimante, pris pour centre, on décrive une sphère dont le rayon soit proportionnel à la distance de ce point au plan de l'onde incidente, ces diverses sphères auront pour enveloppe la surface de l'onde réfractée et les rayons lui seront normaux. D'autre part, pour rendre compte des phénomènes de la double réfraction dans le spath d'Islande, il remarque simplement que le milieu étant hétérogène, l'onde n'est plus sphérique, par conséquent le rayon lumineux ne sera plus perpendiculaire à celle-ci. Seulement la résistance sera identique dans les directions également inclinées sur l'axe optique du cristal. Il arrive enfin à cette constatation importante : pour le spath, l'onde correspondant au rayon réfracté extraordinaire est un ellipsoïde de révolution. Fresnel devait compléter plus tard ces remarquables résultats, vérifier expérimentalement cette théorie et découvrir la polarisation, à peine entrevue par le célèbre Hollandais.

Ajoutons pour terminer, que Huygens fut attiré à Paris par les libéralités de Louis XIV. Nommé membre de l'Académie des Sciences dès sa fondation (1666), il quitta la France, en 1681, aux premières persécutions dirigées contre les protestants, et dès la révocation de l'Édit de Nantes jusqu'à sa mort (1695) il ne voulut même plus correspondre avec la docte compagnie.

La caractéristique de la majorité de ses découvertes est qu'elles ont été faites au moyen de l'ancienne Géométrie, quoique sur la fin de sa vie il se mit à étudier les nouvelles doctrines.

---

## CHAPITRE XV

### Découverte de l'Analyse infinitésimale par Newton et Leibniz.

La transition entre les œuvres de Huygens et la découverte de l'Analyse infinitésimale ne saurait être mieux établie que par WALLIS, qui, après avoir achevé ses études à Cambridge, fut nommé professeur à Oxford (1649), à l'âge de trente-trois ans. Il s'occupa principalement des sections coniques et inventa, dans son *Arithmétique des infinis* (1656), une méthode d'analyse qui constitue un réel progrès sur celles employées antérieurement par Cavalieri, Fermat, Roberval et Descartes. Les travaux de Newton ont fait oublier les vues ingénieuses et les démonstrations générales mais parfois compliquées qu'on y rencontre. Quelques résultats sont cependant restés acquis à la Science. Telles sont la détermination, au moyen de l'*interpolation*, de la nature d'une fonction, dont on connaît quelques valeurs particulières, et la mise en évidence de ce fait que les dénominateurs des fractions sont de véritables puissances à exposants négatifs. Son ami lord BROUXCKER mérite aussi une mention : il trouva pour  $\pi$  l'expression qui donna naissance à la théorie des fractions continues<sup>1</sup>.

(1)

$$\pi = \frac{4}{1 + \frac{1}{2 + \frac{9}{2 + \frac{25}{2 + \text{etc.}}}}}$$

Mais ISAAC NEWTON éclipsa tous ses contemporains par la profondeur de son génie mathématique. Il naquit à Woolstrobe dans le Lincolnshire en 1642. Ses biographes s'accordent à lui reconnaître une intelligence très vive dès sa plus tendre enfance<sup>1</sup>. Quoi qu'il en soit, il succéda à son professeur Barrow dans sa chaire de Cambridge (1669). Peu après, la Société Royale de Londres l'appela dans son sein, et il publia en 1687 ses immortels *Principia* où se trouvent exposées la plupart de ses belles découvertes<sup>2</sup>.

Caractérisons d'abord ce livre par le jugement suivant d'un critique éclairé<sup>3</sup>. Malgré sa longueur nous citons ce passage, car il nous semble résumer très exactement la question de priorité, si souvent débattue entre Leibniz et Newton.

« Le livre des *Principes* est, pour qui sait le comprendre, l'un des chefs-d'œuvre et peut-être le plus grand effort de la pensée humaine. La dignité des résultats est incomparable comme leur précision et leur certitude, et l'immense talent évidemment accessible à ses yeux, que Newton y déploie comme géomètre porte sa grandeur au plus haut point. La théorie des fluxions y est indiquée rapidement dans une note que Newton nomme *scholie*, mais elle pénètre et domine tout l'ouvrage, qui, aujourd'hui encore, en est comme la plus belle application. Lorsque parut le

---

(1) FONTENELLE. *Éloge de Newton*. Œuvres, t. VII, Paris, 1792; BREWSTER. *Memoirs of... Isaac Newton*. 3<sup>e</sup> édit., Edinburg, 1860; — ROUSE BALL. *A short account of the History of Mathematics*. Londres, 1888.

(2) Newton fut remplacé dans sa chaire d'abord par Whiston, auteur de plusieurs ouvrages sur l'Astronomie, auquel succéda en 1711 NICOLAS SAUNDERTON, né dans le Yorkshire en 1682. Ce savant bien qu'*aveugle* dès l'âge de deux ans, sut s'initier aux mathématiques et les professer avec succès. Il avait inventé une planchette à calculer, son « arithmétique palpable » comme il l'appelait, au moyen de laquelle il pouvait effectuer promptement tous les calculs, grâce au seul sens du toucher. Ses *Éléments d'algèbre*, publiés en 1733, n'étaient pas sans valeur, et ils eurent l'honneur d'une traduction française en 1756. Saunderson était mort le 19 août 1739, au Christ' College de Cambridge.

(3) JOSEPH BERTRAND. *Les fondateurs de l'Astronomie moderne*. Paris, s. d.



ISAACUS NEVVTON


*EQUES Anno Aet. 84 An. Chr. 1726.*

APUD

MARCUM-MICHAELEM BOUSQUET

ET SECTOS MDCCXI.

Fig. 18. — (D'après le frontispice de son *Optique*, édition latine de Lausanne et Genève, 1740.)



livre des *Principes*, cette théorie inventée mais non publiée vingt ans avant par Newton n'était plus nouvelle pour les géomètres. Leibniz avait publié, en 1684, dans les *Acta eruditorum* une note de 6 pages qui contenait sous une autre forme des principes équivalents.

Newton lui-même l'a reconnu d'une manière expresse. Rien ne semble donc plus simple et plus clair que l'histoire de cette double découverte, sur laquelle cependant on a tant discuté... Quoique la publication de Newton ait été postérieure à celle de Leibniz, il est prouvé qu'il ne lui doit rien ; mais tout porte à croire qu'il ne l'a aidé en rien. En l'absence de preuve positive, qui oserait soupçonner Leibniz, lui si sincère et si dévoué à la vérité, d'avoir dissimulé les secours qu'il aurait reçus d'un rival ? Sa vie tout entière, tant de fois et si minutieusement étudiée, le justifie d'une telle imputation...

Leibniz et Newton partagent donc la gloire d'avoir inventé le Calcul différentiel, et quoique différemment illustres, chacun d'eux doit être tenu pour honoré de s'être rencontré avec un tel émule. Bien qu'ils soient complètement d'accord sur le fond, on retrouve dans la forme qu'ils ont adoptée, l'empreinte de leurs génies si dissemblables. L'un, plus préoccupé des lois de l'Univers que de celles de l'esprit humain, semble voir surtout dans ces nouvelles méthodes l'instrument de ses efforts pour pénétrer la nature, et, leur assignant un but élevé, en a mieux montré toute la portée. L'autre, qui mettait sa gloire à perfectionner l'art d'inventer, a plus nettement marqué la route, et nous suivons encore aujourd'hui les traces lumineuses qu'il y a laissées. Le premier, ne produisant ses découvertes qu'après en avoir longuement mûri la forme, a pu donner à ses travaux quelque chose de plus achevé et de plus ferme, et faire jaillir de sa pensée toutes les vérités qu'elle contient.

Le second, plus habile à marquer les grands traits, se plaisait à remuer les questions les plus variées, en

éveillant des idées justes et fécondes, qu'il laissait à d'autres le soin de suivre et de développer. Newton se croyait rarement obligé de renoncer à la règle avant d'en faire l'application ; Leibniz, au contraire, aimait à donner des préceptes, et se montrait plus empressé à proposer de beaux problèmes qu'à suivre le détail de leurs solutions. Si Newton plus diligent avait publié dix ans plutôt sa théorie des fluxions, le nom de Leibniz resterait un des plus grands dans l'Histoire de l'esprit humain ; mais tout en le comptant parmi les géomètres de premier ordre, c'est à ses idées philosophiques et à l'universalité de ses travaux que la postérité attacherait surtout sa gloire. Si Leibniz au contraire, abordant plus tôt l'étude des Mathématiques, avait pu ravir à son rival l'honneur de leur commune découverte, on n'admire-rait pas moins dans le livre des *Principes*, avec la majesté des résultats obtenus, l'incomparable éclat des détails ; et en perdant ses droits à l'invention de la méthode qui s'y trouve employée avec tant d'art, Newton resterait placé au rang qu'il occupe aujourd'hui parmi les géomètres, je veux dire à côté d'Archimède et au-dessus de tous les autres. »

Analysons maintenant les trois livres des *Principes*. Nous suivrons pour cela la traduction faite par la marquise DU CHATELET, la célèbre amie de Voltaire. Les deux volumes qui la composent ne parurent qu'après la mort de cette savante, en 1759, et ils sont enrichis d'un commentaire très estimé.

L'ouvrage débute par des définitions déjà connues qu'il commente après les avoir formulées, puis viennent des axiomes également adoptés par ses prédécesseurs. Une fois ces premiers jalons posés, Newton, avec le premier livre, aborde le fond même du sujet en exposant ses grandes découvertes en Dynamique. Rappelons les principales, en tête le fameux « théorème des aires ». Dans les mouvements curvilignes des corps, les aires décrites autour d'un centre immobile



Fig. 19. — Portrait de NICOLAS SAUNDERSON, aveugle qui professa les Mathématiques à l'Université de Cambridge de 1711 à 1739.  
 (D'après une gravure du *Gentleman Magazine* de Londres, n° de sept. 1754.)



sont dans un même plan immobile, et sont proportionnelles au temps. Il démontre réciproquement que la force est dirigée vers le centre dans tout mouvement quelconque où la loi s'applique, puis il cherche la force accélératrice dans l'hypothèse d'un mouvement elliptique où la loi des aires est rapportée au foyer, et par un simple calcul il voit que la variation de cette force doit être en raison inverse du carré du rayon vecteur. Pour envisager enfin la question sous toutes ses faces, il suppose un mobile attiré par un centre fixe suivant la loi de l'inverse du carré de la distance, et il arrive à cette conclusion que la trajectoire décrite sera une conique. Si la marche adoptée par Newton dans cet endroit est remarquable par son élégance et sa logique, il serait injuste d'oublier que Huygens avait défriché la route par ses recherches sur la force centripète dans le mouvement uniforme.

Puis l'auteur termine ce livre en étudiant le mouvement des corpuscules attirés par toutes les parties d'un corps quelconque. Il découvre un certain nombre de propositions qui lui permettront d'établir sa théorie de l'émission.

L'intérêt décroît au second livre, dans lequel il expose le mouvement des corps dans un milieu résistant. On y rencontre à l'état embryonnaire quelques éléments de la théorie des fluxions. Mais occupons-nous du morceau capital des *Principes*, celui où il applique au système du monde les théorèmes précédemment énoncés.

Pour étendre au Soleil, aux planètes et à leurs satellites les préceptes découverts, et arriver à déterminer leurs masses, il considère les corps secondaires comme de simples molécules vis-à-vis des corps principaux. Voici à titre d'exemple comment il fixe le rapport entre celles du Soleil et de la Terre. Connaissant l'accélération de Mercure, qu'il calcule grâce à la durée de sa révolution et au rayon de son orbite, il en déduit

au moyen de la loi des variations d'attraction selon la distance, l'accélération que le Soleil communiquerait à un corps situé à sa surface. D'autre part, sachant l'accélération imprimée par la Terre à un corps placé dans les mêmes conditions sur notre globe, il en conclut aisément celle qu'elle donnerait à un corps distant de son centre d'une longueur égale au rayon du Soleil. Mais précisément le rapport des deux accélérations imprimées par le Soleil et la Terre à un même corps, à des distances égales de leurs centres, est celui de leurs masses.


Il étend ensuite sa méthode à une planète possédant un satellite, et il trouve d'une façon analogue l'accélération qu'elle transmet à ce dernier ; il en déduit l'accélération qu'elle imprimerait à un corps situé à une distance de son centre égale au rayon du Soleil. D'un autre côté, comme il a déterminé l'accélération communiquée par le Soleil à un corps placé à sa surface, il n'a qu'à prendre le rapport entre ces deux grandeurs pour obtenir le rapport entre les masses de la planète et du Soleil. Ce procédé ne permet pas de déterminer les masses des satellites ; toutefois pour la Lune, Newton a résolu le problème à l'aide de l'observation des marées.

Cet immortel ouvrage donnait donc toutes les lois de la gravitation universelle, la plus sublime généralisation que le cerveau humain ait enfantée, puisqu'elle règle le cours de tout le système solaire.

Les difficultés qui hérissaient à chaque page les *Principes*, empêchèrent leur diffusion ; peu de savants étaient à même de les comprendre, encore moins de les juger, mais cette œuvre apporta au géomètre la fortune. Nommé en 1695 inspecteur de la Monnaie de Londres, Newton en devint bientôt directeur (1699). Cette situation lui valant 30 000 livres, somme considérable pour l'époque, il put continuer la publication de ses travaux sans s'inquiéter du lendemain.



Fig. 20. — Portrait de la marquise DU CHATELET, traductrice de Newton.  
 (D'après une gravure du temps.)



Son *Optique*, mise au jour en 1704, regarde surtout l'histoire de la Physique. Il y montre la composition de la lumière blanche, et expose la théorie de l'émission. Bien que cette dernière ait été remplacée par celle des ondulations, on peut dire qu'il partage avec Huygens l'honneur d'avoir introduit les raisonnements mathématiques dans un livre didactique sur les phénomènes naturels. A ce volume étaient joints deux petits traités dont un *Sur les lignes du troisième ordre*, semble n'avoir pour objet qu'un exercice de Géométrie analytique. Les courbes y sont classées d'après leurs équations, en algébriques ou transcendentes : les premières sont rencontrées par une ligne droite en un certain nombre de points réels ou imaginaires égal au degré de la courbe; tandis que les autres peuvent être coupées par une droite en une infinité de points. Il y indique ensuite que la plupart des propriétés des coniques ont leurs correspondantes dans la théorie des cubiques. Le second opuscule roule sur la *Quadrature des courbes*. On y voit apparaître pour la première fois les indices littéraux et l'extension de sa formule du binôme au cas d'un exposant quelconque; mais surtout il contient d'intéressantes applications des principes exposés dans sa *Méthode des fluxions*, publiée seulement en 1736.

Voyons comment il est parvenu à cette conception.

Après avoir donné le développement en séries des quantités fractionnaires ou irrationnelles, il énonce les deux problèmes relatifs au mouvement, qui l'ont conduit à imaginer sa méthode. Ce sont :

La longueur de l'espace décrit étant connue à chaque instant, déterminer la vitesse du mouvement à un moment quelconque.

La vitesse du mouvement étant donnée, trouver la longueur de l'espace parcouru.

Ceci posé, Newton fait le raisonnement suivant. Si dans l'équation  $y = x^2$ ,  $y$  exprime l'espace parcouru au temps  $t$ , temps mesuré par un autre espace  $x$ , s'accrois-

sant d'une vitesse uniforme  $x$ ,  $x^2$  exprimera la vitesse avec laquelle dans le même moment l'espace  $y$  sera parcouru, et vice versa. Considérant alors les grandeurs comme décrites d'un mouvement continu, il cherche à les déterminer d'après les vitesses des mouvements ou accroissements (*fluxions*), tandis que les grandeurs engendrées sont les *fluentes*. « Les fluxions sont, dit-il, d'aussi près que possible proportionnelles aux accroissements des fluentes, engendrés dans des intervalles du temps, égaux et aussi petits que possible; elles sont dans la raison première des accroissements naissants, et peuvent être représentées par des lignes qui leur soient proportionnelles. » Comme notations il se sert, pour les fluxions des grandeurs  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ..., des mêmes lettres surmontées d'un point. Ces fluxions étant à leur tour des variables, leurs fluxions seront notées par des lettres identiques surmontées de deux points. Enfin il a soin de réserver aux quantités connues les premières lettres de l'alphabet  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ... etc.<sup>1</sup>.

Parmi ses autres publications, l'*Arithmétique universelle* renferme d'importantes contributions à la théorie des équations, entre autres son théorème sur la somme des puissances des racines. Telles sont les principales découvertes de Newton. Nous n'avons pu signaler les inventions de moindre importance qui figurent dans ses œuvres; ce que nous en avons dit suffit à montrer quelle ardeur scientifique il a déployée, et quel sillon profond il a creusé dans le champ mathématique.

Son émule GOTTFRIED GUILLAUME LEIBNIZ partage avec lui le titre de créateur de l'Analyse infinitésimale. Il naquit à Leipzig le 3 juillet 1646. Son père, habile professeur, guida ses premières études, puis il apprit avec Thomasius la Philosophie, et avec Kuhnius les Mathématiques. D'ailleurs il ne borna pas à ces sciences son bagage intellectuel. L'Archéologie, la Littérature et

(1) Lagrange a substitué à ces symboles les suivants:  $x'$ ,  $y'$ ,  $z'$ ...  $x''$ ,  $y''$ ,  $z''$ ...



Fig. 21. — Portrait de LEIBNIZ (1646-1716).  
(D'après une gravure allemande du XVIII<sup>e</sup> siècle.)



le Droit le passionnèrent également. Vers l'âge de vingt-cinq ans il put, grâce à une mission que lui donna le baron Boineburg, se rendre à Paris qui attirait à lui tout ce que l'Europe comptait alors de savants. Il s'y lia avec Huygens. Peu après il se dirigea vers l'Angleterre où Newton, Boyle, Wallis et les autres membres de la Société Royale de Londres l'accueillirent avec honneur. Mais à quelques mois de là, la mort de l'électeur de Mayence le privant de sa pension, le força à abréger son séjour. Il dut songer à reprendre le chemin de l'Allemagne, non sans toutefois repasser par Paris où il demeura encore plus d'une année. C'est à ce moment qu'il s'adonna aux mathématiques, se mettant au courant de toutes les nouvelles découvertes, et construisant sa *machine arithmétique*.

D'ailleurs sa situation pécuniaire s'améliora bientôt, car le duc de Brunswick le nomma vers ce temps conseiller à sa Cour, en l'autorisant à rester à l'étranger. Puis, en 1676, il quitta notre pays pour voyager à nouveau en Angleterre et en Hollande, enfin il retourna à Hanovre, ville qu'habitait son protecteur. Ses soins se portèrent alors sur l'organisation d'une bibliothèque et d'un cabinet de physique pour le duc de Brunswick, très curieux du mouvement intellectuel de son époque. L'activité de Leibniz était toujours en éveil, aussi ne tarda-t-il pas à fonder avec Mencken (1682) le premier journal scientifique de l'Allemagne, les *Acta eruditorum*<sup>1</sup> (fig. 22), le pendant de notre *Journal des savants*. Leibniz prit une part importante à sa rédaction. Dès l'année même de sa fondation il y inséra des articles, et au mois d'octobre 1684 sa *Nova methodus pro maximis et minimis* y parut. Dans ce mémoire il résout, au moyen du Calcul différentiel, le problème ci-après proposé par de Beaune : Trouver une courbe dont la sous-tangente soit constante. Il

---

(1) Ce journal paraissait mensuellement à Leipzig

# ACTA ERUDITORUM

ANNO MDCLXXXIII

publicata,

ac

SERENISSIMO FRATRUM PARI,

DN. JOHANNI  
GEORGIO IV,

Electorus Saxonici Hæredi;

&

DN. FRIDERICO  
AUGUSTO,

Ducibus Saxoniae &c.&c.&c.

PRINCIPIBUS JUVENTUTIS  
dicata.

*Cum S. Casarea Majestatis & Potentissimæ Ele-  
ctoris Saxonie Privilegiis.*

---

LIPSIÆ,

Prostant apud J. GROSSIUM & J. P. GLEITSCHIIUM.

Typis CHRISTOPHORI GÜNTHERI.

Anno MDCLXXXIII.

Fig. 22. — Fac-similé du frontispice des *Acta Eruditorum*, premier journal scientifique de l'Allemagne, fondé par Leibniz en 1682.

démontre que la courbe cherchée est une logarithmique ordinaire, ses abscisses croissant en progression arithmétique, et ses ordonnées en progression géométrique. Il y donne en outre le moyen de différencier aussi bien les quantités rationnelles que fractionnaires, et applique son procédé à un exemple assez difficile lui permettant de bien indiquer la route à suivre dans tous les cas. Cette méthode générale laissait loin derrière elle celles de Fermat, de Descartes ou de Barrow <sup>1</sup>.

Deux ans après, dans son *De geometria recondita*, il exposa les bases du Calcul intégral, et il montra que les problèmes des quadratures si péniblement résolus par ses prédécesseurs peuvent se traiter avec aisance grâce à ce dernier.

Envisagée en bloc, la doctrine leibnizienne repose sur les considérations suivantes. Déterminer les conditions dans lesquelles un phénomène continue à se développer, est toujours plus aisé que de rechercher des relations qui exprimeraient les lois de son accomplissement dans leurs moindres détails ; et cependant, pour assister à la production intégrale du phénomène, il suffira de connaître ses développements successifs, d'un état à un état infiniment voisin. Or la mise en équations différentielles d'un problème est simple, tandis que la recherche des équations en quantités finies est souvent insoluble. Plus la question se complique, plus la disproportion entre leurs difficultés augmente.

Entre autres sujets intéressants que Leibniz inséra dans sa revue, il faut noter plusieurs formules courantes aujourd'hui, divers développements en série, le premier usage du signe d'intégration  $\int$  et des articles sur les jeux de hasard.

Ses travaux relatifs à la Mécanique sont importants.

Dans le *Journal des Savants* de 1693, il formula la

---

(1) BOSSUT. *Histoire générale des Mathématiques*, t. II. Paris, 1810.

règle générale de la composition des mouvements. Il avait repris auparavant dans son recueil la théorie des déplacements planétaires. Par une heureuse inspiration il emploie le système de coordonnées polaires qui simplifie les formules.

Puis, tout en disputant avec les Cartésiens sur le principe des forces vives, il consacra principalement les dernières années de sa vie, à perfectionner et à étendre sa méthode. Des adeptes le secondaient du reste. En particulier le marquis DE L'HOPITAL dont l'*Analyse des infiniment petits* (1696) révéla au grand public les mystères du nouveau Calcul, réservés jusqu'alors à quelques privilégiés.

Comme en France tout finit, dit-on, par des chansons, on représenta à Paris une comédie : *Les infiniment petits*, où les nouveaux préceptes étaient tournés en ridicule. L'intrigue de la pièce n'était pas compliquée. La santé chancelante du marquis DE L'HOPITAL, et la répulsion de sa femme pour le progrès, en faisaient tous les frais. De là des scènes de ménage faciles à deviner, et dignes d'ailleurs d'un vaudeville de bas étage.

Les adversaires de l'Analyse infinitésimale ne méritent pas de nous retenir beaucoup. Citons quelques-uns de ces retardataires. En Angleterre nous trouvons le philosophe BERKELEY. En France, l'abbé DE CATELAN dans sa *Logistique universelle* (1692) voulut remplacer le Calcul différentiel par un procédé qui n'en était qu'un grossier déguisement, et MICHEL ROLLE, dont le *Traité d'algèbre* (1690) fit progresser la théorie des équations, se posa en ennemi non seulement de Leibniz et de Newton, mais de Descartes. Toutefois dans son ouvrage on rencontre entre autres choses curieuses le théorème connu aujourd'hui sous son nom. C'est une généralisation de celui qu'il énonce sous la forme suivante et avec sa terminologie particulière : lorsqu'il y a des racines effectives dans une cascade, les hypo-

thèses de cette cascade donnent alternativement l'une + et l'autre — <sup>1</sup>.


En Hollande, BERNARD NIEUWENTYT faisait, dans ses *Considerationes circa analysis* (1694), des objections assez sérieuses au principe même. Il considérait celui-ci comme faux, parce qu'on envisage comme égales des quantités ayant entre elles des différences infiniment petites mais cependant réelles. Leibniz leva ces difficultés, et finit par le convaincre.

Mais les partisans du progrès furent de beaucoup les plus nombreux, et à leur tête il convient de placer les BERNOULLI, parmi lesquels les plus célèbres furent les deux frères JACQUES et JEAN <sup>2</sup>.

Le premier se distingua dans la théorie des courbes. Parmi ses découvertes, la plus remarquable est celle relative à la *spirale logarithmique*. Il démontra que sa développée, sa caustique par réfraction et sa caustique par réflexions ont de nouvelles spirales logarithmiques égales à la proposée mais tournées d'un certain angle autour du pôle. Il en fut tellement enthousiasmé qu'il fit gra-

(1) Rolle appelle « racines effectives » d'une équation ses racines positives. Il nomme « cascade » une équation  $f(x) = 0$  dans laquelle  $f(x)$  est un polynôme entier, et il donne le même nom aux équations  $f'(x) = 0$   $f''(x) = 0$ ... Les « hypothèses » d'une cascade  $f^i(x) = 0$  sont pour lui les racines de l'équation  $f^{i+1}(x) = 0$  et en même temps une limite supérieure des racines de  $f^i(x) = 0$ . Il appelle enfin première, deuxième, troisième... cascade, les cascades du premier, deuxième, troisième... degré. Voir pour plus amples détails sur sa méthode, notre petite note sur le théorème de Rolle, insérée dans *L'Intermédiaire des mathématiciens*, t. II (1895).

(2) Comme plusieurs membres de cette famille se sont illustrés dans les Mathématiques, nous croyons intéressant de donner ici la généalogie des Bernoulli, originaires d'Anvers, mais réfugiés en Suisse. Nous l'empruntons à M. FLORIAN CAJORI. (*A History of Mathematics*. New-York, 1895.)



ver cette figure sur son tombeau, avec cette devise emblème de la résurrection : *Eadem immutata resurgo*. D'autre part, dans son étude de la courbe *isochrone paracentrique*, on rencontre pour la première fois le mot « intégral ». Leibniz appela d'abord sa méthode « calcul sommatoire » mais après entente avec le savant suisse il adopta définitivement la dénomination proposée par celui-ci. En 1695, Jacques Bernoulli énonça son fameux problème des *isopérimètres*, cause de sa querelle avec son frère Jean, car ce dernier commit quelques erreurs dans la solution, erreurs qu'il rectifia par la suite.

Son mémoire sur la *chainette* ou courbe théorique d'équilibre d'un fil sans épaisseur, pesant, homogène, flexible et inextensible, est important. Toutefois Leibniz avait déjà découvert ses propriétés et donné son équation<sup>1</sup>. Jacques Bernoulli étendit la question à des cas plus compliqués tels celui où le fil est de densité variable, puis inextensible, puis sollicité en chaque point par une force dirigée vers un centre. Il montra également la déformation que subit une lame élastique fixée à l'une de ses extrémités et courbée par un poids attaché à l'autre. Dans le même ordre d'idées notons ses recherches sur la *lintéaire*, forme prise par un linge soutenant un liquide, et sur la figure d'une voile enflée par le vent.

En outre, dans son *Ars conjectandi*, publié seulement après sa mort en 1713, il précisa les notions émises par Pascal et Fermat sur les probabilités. Enfin et surtout on lui est redevable du *Calcul exponentiel*, cette partie de l'analyse devenue si féconde. Il est basé sur la relation  $\text{Log } x^n = n \text{ Log } x$  et sur ce fait que la différentielle d'un logarithme,  $d(\log x)$  est égale à  $\frac{dx}{x}$ . Il montra d'autre part que les courbes exponentielles, algébriques et transcendentes, ont entre elles des points de ressemblance.

---

(1) H. BROCARD. *Notes de bibliographie des courbes géométriques*. Bar-le-Duc, 1897-99.

Jean Bernoulli, haineux et vindicatif, ne sut s'accorder ni avec son frère, ni avec son fils. Mais heureusement sa science était au-dessus de son caractère. Outre les travaux que nous avons déjà cités, il poursuivit d'heureuses investigations sur la *brachistochrone* ou courbe que doit suivre un corps pesant pour descendre d'un point à un autre dans le moindre temps possible. Il avait accordé vers la fin de 1696 un délai de six mois aux géomètres pour répondre à ce problème. Leibniz, Newton et son frère Jacques le résolurent par des méthodes particulières, et démontrèrent que la cycloïde était le chemin cherché. Antérieurement on avait déjà reconnu à cette courbe, surnommée pour cette raison « *curva descensus æquabilis* », la propriété du tautochronisme. Lagrange devait plus tard, grâce à son calcul des variations, embrasser complètement ce sujet, que Jean Bernoulli avait seulement ébauché.

Mais ses principaux titres de gloire sont d'avoir contribué à répandre parmi ses contemporains l'analyse infinitésimale, et d'avoir su former de nombreux disciples au rang desquels figure le grand Euler.

Au sein de l'Académie des Sciences de Paris se trouvait également un intelligent défenseur des mêmes doctrines, PIERRE VARIGNON. Dans sa *Nouvelle Mécanique* imprimée seulement après sa mort, en 1725, on rencontre de nombreuses simplifications de démonstrations. Beaucoup de propositions importantes même lui sont dues : tels sont la théorie des moments pour les forces concourantes et l'énoncé général du principe des vitesses virtuelles.

Si Varignon chercha toujours la clarté dans l'exposition de la science, il n'en était pas de même d'ANTOINE PARENT dont les *Éléments de Mécanique et de Physique* sont remarquables cependant sous certains rapports. Entre autres sujets qu'il y aborde se voient les équations de la sphère et du plan, le calcul des ordonnées maxima et minima dans différentes sections de la sphère, et la

## Planche huitième

Page 70.




Fig. 23. — Les instruments de mathématiques au xvii<sup>e</sup> siècle.  
D'après le *Traité de Bion* (1652-1733.)

## Planche neuvième

Page 80




Fig. 24. — Les instruments de mathématiques au XVIII<sup>e</sup> siècle.  
D'après le *Traité* de Bion (1652-1733.)

représentation d'une surface courbe par une équation entre trois variables, ce qui est, somme toute, intéressant comme première application, à des questions ardues, de notre système de coordonnées dans l'espace.

De son côté, FRANÇOIS NICOLE, dans son *Traité des différences finies* (1717) éclaircit certains points de la théorie, et en sommant bon nombre de suites enrichit notablement cette branche de l'algèbre. Ses autres recherches roulèrent sur les rectifications de la cissoïde et des épicycloïdes sphériques. Il a démontré, en outre, plusieurs propositions formulées simplement par Newton, en particulier le théorème suivant : on peut envisager toutes les courbes du 3<sup>e</sup> ordre comme les perspectives de trois d'entre elles.

Le comte JACQUES DE RICCATI s'attacha aussi à propager en Italie les idées de Leibniz et de Newton. Il parvint à intégrer, indépendamment de l'équation qui porte aujourd'hui son nom, certaines équations différentielles. Ses deux fils, Vincenzo et Giordano, en appliquant le calcul intégral à diverses équations de mécanique, simplifièrent aussi plusieurs parties du domaine de cette science.

Avant de quitter la péninsule, n'oublions pas de mentionner le comte DE FAGNANO, considéré comme un des plus habiles géomètres de son temps. Dans ses *Produzioni mathematiche*, réunion de ses articles parus dans les journaux scientifiques, il appela l'attention sur la théorie des *fonctions elliptiques*. En déterminant sur l'ellipse ou l'hyperbole des arcs dont la différence puisse s'exprimer algébriquement, il parvint à la rectification de ces courbes. Dans le même ordre d'idées, il découvrit qu'entre l'intégrale représentant l'arc de la lemniscate et celle qui exprime un arc de cercle, existent des analogies curieuses. Euler en étudiant peu après l'intégrale plus générale que nous désignons actuellement sous le nom d'intégrale elliptique de première espèce, formula le principe de cette remar-

quable propriété, échappée à la sagacité du noble Italien. Celui-ci cependant avait su ouvrir, dans le champ de l'analyse transcendante, des routes inconnues.

Vers la même époque où plutôt un peu avant, un gentilhomme français, PIERRE RAYMOND DE MONTMORT, publiait d'intéressants aperçus sur le calcul des probabilités. Dans son *Essai d'analyse sur les jeux de hasard* il donna plusieurs formules pour la sommation de certaines suites, entre autres celle qui permet de représenter la somme de  $n$  termes d'une série dont les différences finissent par s'annuler.

Terminons ce chapitre en examinant, d'après l'ouvrage contemporain de l'ingénieur BION, *l'Usage des instruments de mathématiques* à la fin du XVII<sup>e</sup> siècle. La planche VIII de ce livre (fig. 23) nous montre la forme des différents compas. En E nous voyons le compas à trois branches, en G et H ceux de réduction, en K celui « à coulisse », en L celui destiné à tracer les ellipses ; en M, N, O les compas sphériques nécessaires pour mesurer les épaisseurs, les diamètres des globes ou autres corps ronds.

La planche IX (fig. 24) nous initie d'abord aux appareils « qui peuvent servir dans le cabinet ». En A et C nous apercevons les porte-crayons, F est la « plume sans fin », I une pince à tenir le papier, K le pentographe qui « se nomme aussi *singe*, parce qu'il sert à copier toutes sortes de dessins ». M c'est « le carat qui permet de connaître le poids des perles ». Il faut croire que les mathématiciens étaient riches dans le bon vieux temps, pour avoir besoin d'un tel attirail ! L et N sont les équerres fixe et pliante, P indique la concordance entre les pieds usuels. Les règles R, Q s'emploient pour tracer les parallèles ; enfin S, T, V représentent diverses coupes du « pedomètre » ou compteur de pas pour mesurer les distances.

## CHAPITRE XVI

### Les mathématiciens anglais de la première moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle et les recherches d'Euler.

Quittons le continent pour revenir dans la patrie de Newton où, pendant la première moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle les Mathématiques se maintinrent à un niveau très élevé. Commençons par le plus enthousiaste admirateur de l'immortel Anglais, par BROOK TAYLOR, qui naquit à Edmonton, dans le Middlesex, le 18 août 1685. Après une éducation encyclopédique, il se livra aux spéculations scientifiques, et devint membre de la Société Royale de Londres en 1712. Outre plusieurs mémoires sur le mouvement des projectiles, la capillarité, le centre d'oscillation et un traité *New principles of linear perspective*, il composa un grand ouvrage intitulé *Methodus incrementorum directa et inversa* (1715-17). La première partie de ce dernier livre renferme l'exposé de sa doctrine des « incréments » qui se rapproche assez du calcul des différences finies. Il y exalte les découvertes de Newton en critiquant injustement Leibniz et les Bernoulli dont les méthodes, d'après lui, manqueraient de précision. Comme points intéressants on y trouve la démonstration de la relation bien connue dite : « formule de Taylor <sup>1</sup> » et le problème du changement de variable indépendante y est abordé. Quant à la seconde

---

(1)  $f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{1,2} f''(x) + \dots$

partie, elle concerne l'application de ce procédé au mouvement des cordes vibrantes. Il arrive par de longs détours au nombre de vibrations exécutées par seconde. D'Alembert et Lagrange reprirent à nouveau ce sujet, mais s'ils rectifièrent certaines incorrections de détail, leurs recherches démontrèrent l'exactitude du résultat de leur prédécesseur.

Enfin Taylor réussit à obtenir l'équation différentielle représentant la trajectoire d'un rayon lumineux à travers un milieu hétérogène et, dans l'hypothèse où la densité de la couche d'air varie seulement selon sa distance à la surface de la terre, il construisit par une quadrature la forme approchée de la courbe.

On peut ranger dans l'école anglaise de cette période ABRAHAM DE MOIVRE. S'il naquit, en effet, à Vitry, comme il était d'une famille protestante, il dut quitter la France lors de la révocation de l'Édit de Nantes (1685), à peine âgé de huit ans, et passa la plus grande partie de sa vie à Londres où il se lia avec Newton et Halley. Ces précieuses amitiés lui permirent d'entrer fort jeune à la Société Royale.

Ses travaux ont contribué surtout à édifier la Trigonométrie des quantités imaginaires dont plus tard Lambert s'occupa à son tour. Les deux principaux théorèmes qu'on lui doit sont relatifs à la formule donnant  $\sin mx$  et  $\cos mx$  en fonction de  $\sin x$  et de  $\cos x$ <sup>1</sup> et aux facteurs binômes de  $x^{2n} - 2ax^n + 1$ . Mais le plus important de ses livres est sa *Doctrine of chances* (1716) complétée par plusieurs mémoires qui ouvrirent une voie nouvelle au calcul des probabilités. Bernoulli avait montré que le rapport des événements de différentes natures, fourni en observant une longue suite d'épreuves, s'approche d'autant plus du rapport exact des possibilités respectives de ces événements, que les observations sont plus multipliées. De Moivre fit faire

---

(1) Cette formule est :  $(\cos x + \sqrt{-1} \sin x)^m = \cos mx + \sqrt{-1} \sin mx$ .

un pas de plus à la question : il trouva une élégante expression mathématique de la probabilité que la différence de ces deux rapports est renfermée entre certaines limites. Puis, poursuivant ses investigations, il découvrit les séries récurrentes dont la sommation aisée lui permit d'abréger bien des calculs et d'introduire dans la théorie générale des suites infinies des principes féconds. D'autre part, il a démontré par d'ingénieux raisonnements que la probabilité d'un événement composé est le produit des probabilités des événements simples qui le composent, et enfin il parvint à des formules concises relativement aux probabilités de la vie humaine.

A l'égard de ROGER COTES, professeur d'Astronomie à l'Université de Cambrige, rappelons qu'il apporta des perfectionnements aux méthodes d'intégration alors dans l'enfance, principalement à ceux relatifs aux différentielles rationnelles. On connaît surtout son nom dans l'enseignement actuel, par son théorème concernant les racines imaginaires de l'unité. Cependant on lui est redevable encore du théorème suivant, non moins utile, exposé dans son *Harmonia mensurarum*. Si d'un point P pris dans le plan d'une courbe de degré  $m$  on trace une droite qui coupe la courbe en  $m$  points,  $A_1, A_2, \dots, A_m$  et qu'on prenne sur cette sécante un point M déterminé par la condition que l'inverse de la distance PM soit moyenne arithmétique des inverses des distances PA,  $PA_1 \dots PA_m$ , le lieu géométrique du point M quand la transversale tourne autour du point P, est une ligne droite. La démonstration de cet énoncé, trouvé dans les papiers de Cotes après sa mort, fut donnée par son compatriote MACLAURIN à qui la généralisation du théorème de Newton sur les asymptotes servit de fondement pour son *De linearum geometricarum proprietatibus generalibus* (1720).

Ce traité se continue par des applications de ces deux principes aux courbes du second et du troisième degré. On y rencontre entre autres les propriétés les

plus importantes de la division harmonique des sécantes, le théorème sur le quadrilatère inscrit, et la belle proposition suivante. Quand un quadrilatère a ses quatre sommets et les deux points de concours de ses côtés opposés sur une courbe du 3<sup>e</sup> degré, les tangentes à celle-ci, menées par deux sommets opposés, se coupent sur la courbe.

Sa *Geometria organica*, publiée un an auparavant, avait pour but d'employer les courbes simples à la génération des courbes complexes. C'était le développement méthodique de cette question indiquée par Newton : lorsque deux angles de grandeurs constantes tournent autour de leurs sommets respectifs, de manière que le point de concours de deux de leurs côtés décrive une ligne donnée, l'intersection des deux autres tracera une courbe dépendant de la première. L'auteur des « Principes » avait montré que si la ligne donnée est une droite, l'autre sera une conique, et que si la ligne donnée est une conique, l'autre sera en général du 4<sup>e</sup> degré.

Son *System of the fluxions* (1742) est, au dire de Lagrange, un chef-d'œuvre. Maclaurin s'y applique à faire ressortir les analogies entre la méthode d'Archimède et celle de Newton. On y voit la formule <sup>1</sup> au moyen de laquelle il développe une fonction quelconque selon les puissances croissantes et entières de la variable. C'est un cas particulier de celle indiquée précédemment par Taylor. Quant à son *Exposition des découvertes philosophiques*, elle constitue un panégyrique « ad majorem Newtonii gloriam », au détriment de Descartes et de Leibniz. Nous ne saurions donc nous y arrêter.

Parmi ses élèves, citons MATHIEU STEWART que ses *General theorems* placent à un rang très honorable parmi les mathématiciens anglais du temps. Ce livre ren-

(1)  $f(x) = f(a) + f'(a) \frac{x}{1} + f''(a) \frac{x^2}{1.2} + \dots$

ferme plusieurs résultats de la Géométrie moderne relatifs au cercle, à la ligne droite, à la théorie des transversales et à l'involution. Dans ses *Tracts physical and mathematical* il exposa d'une façon très claire le fameux problème des trois corps, et étudia diverses autres questions de Mécanique céleste avec beaucoup de sagacité.

Un géomètre russe, JOSEPH LANDEN, qui naquit à Saint-Petersbourg en 1719, mérite aussi une mention, car un de ses théorèmes concernant les arcs de l'hyperbole et de l'ellipse, a inspiré Euler et Lagrange.

Si l'Angleterre et l'Allemagne marchèrent à la tête du progrès pendant la belle période des Mathématiques modernes, la France n'avait eu à opposer aux grands noms des Leibniz et des Newton que des savants de second ordre. Mais la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle lui apportera le commencement de sa revanche. Quant à la Suisse, elle va continuer à fournir son brillant contingent. L'éclat des découvertes de LÉONARD EULER éclipsa même les travaux des Bernoulli.

Cet illustre algébriste naquit à Bâle, le 15 avril 1707, d'un père qui remplissait les fonctions de ministre protestant. Son professeur fut Jacques Bernoulli. Après avoir passé sa maîtrise ès arts en 1723, il remporta, trois ans plus tard, un accessit, au concours proposé par l'Académie de Paris sur la théorie mécanique de la mâture des vaisseaux. Puis, grâce à la protection de Nicolas Bernoulli, son condisciple, il fut nommé par l'impératrice Catherine I<sup>re</sup> de Russie, membre adjoint de l'Académie de Saint-Petersbourg. C'est vers cette époque qu'il publia sa *Mechanica*, premier traité didactique où l'Analyse ait été appliquée à la Science du mouvement.

L'excès de travail, joint sans doute aux rigueurs du climat, détermina chez lui une ophtalmie qui lui fit perdre un œil. Aussi à la mort de Biren, le tyrannique favori d'Anne Ivanowna, il quitta sans regret ce pays

d'autocrates, et sur les instances du roi de Prusse se rendit à Berlin (1741) pour présider l'Académie. Fêté non seulement par les savants, mais bien accueilli par le beau sexe, Euler donna des leçons à la princesse



Fig. 25.

### LEONHARD EULER.

(D'après la gravure contemporaine de C. T. Riedel, publiée à Leipzig.)

d'Anhalt-Dessau. Il composa même à son intention ses *Lettres sur quelques sujets de Physique et de Philosophie*, où il se révèle vulgarisateur de talent. Ce livre eut autant de succès que les « Entretiens sur la pluralité des mondes », de Fontenelle. On l'a souvent réédité.

Outre quelques mémoires sur les intégrales définies,

l'intégration des équations d'ordres supérieurs, la balistique, la théorie des isopérimètres, insérés dans diverses publications allemandes ou françaises, il composa peu après une *Théorie nouvelle de la lumière* (1746). La doctrine de l'émission, universellement adoptée depuis Newton, y était soigneusement examinée. Il en releva les contradictions, et se déclara partisan de la théorie des ondulations si génialement édifiée par Huygens. Soumettant alors au calcul les phénomènes observés en supposant que la lumière se propage par l'intermédiaire d'un fluide impondérable et élastique, l'éther, il réussit à enrichir la Dioptrique de formules analytiques dont la généralité égalait la simplicité. Souvent, au cours de sa carrière, il revint sur ce sujet, et toutes ses recherches optiques ont été réunies en trois volumes, sous le titre *Dioptrica* (1771).

Catherine II l'appela à nouveau en Russie, en 1766. Il était alors devenu presque aveugle, ce qui ne l'empêcha pas de produire jusqu'à sa mort. Ses plus importantes découvertes sont relatées dans sa *Methodus inveniendi lineas curvas* (1744), son *Introductio in Analysin infinitorum* (1748) et ses *Institutiones Calculi differentialis* (1755). Sans songer à rendre compte de ces grands traités, indiquons-en la substance en montrant de quels notables progrès les diverses branches des Mathématiques sont redevables à Euler.

En Analyse, il donna la solution générale du problème des isopérimètres ébauchée dans un travail précédent, et la théorie des intégrales dites « eulériennes ». Il imagina l'identification des fonctions circulaires et des fonctions exponentielles, apporta de multiples perfectionnements à l'étude des séries et à celle des fonctions elliptiques, en apercevant la comparabilité d'un arc d'hyperbole à la somme de deux arcs d'ellipse. Il fournit les équations différentielles du mouvement d'un corps libre soumis à des forces quelconques, et la théorie de la rotation d'un solide autour d'un point fixe.

En Géométrie, il aborda le problème du cercle tangent à trois cercles donnés, il trouva la construction des axes d'une ellipse définie par deux de ses diamètres conjugués et plusieurs solutions du problème de la sphère tangente à quatre sphères fixées.

C'est Euler encore qui introduisit dans les formules trigonométriques les abréviations dont nous nous servons aujourd'hui en désignant les angles d'un triangle par A, B, C et les côtés opposés par les lettres minuscules correspondantes  $a$ ,  $b$ ,  $c$ . D'autre part, en établissant d'une façon définitive de nombreuses méthodes générales, il transforma la Géométrie analytique. Signalons les points intéressants dans ce genre : discussion de l'équation générale du second degré à trois variables, qu'on n'avait pas même amorcée avant lui, formules de transformation des coordonnées dans l'espace, définition des foyers des coniques telle qu'on la donne actuellement, théorie complète des courbes géométriques et leur classification en ordres, classes et genres.

La Théorie des nombres, d'un autre côté, lui doit de multiples accroissements, entre autres la démonstration de plusieurs théorèmes énoncés par Fermat, et qui avaient jusqu'alors résisté aux efforts des plus sagaces arithméticiens.

Enfin sa *Theoria motuum planetarum* (1744) et sa *Theoria motus Lunæ* (1753) le font ranger parmi les fondateurs de la Mécanique céleste moderne. Dans le premier ouvrage il simplifia le calcul des perturbations planétaires en ramenant la question au problème des trois corps dont il posa de la sorte très nettement la donnée. Trois corps s'attirant mutuellement selon les lois de Newton (c'est-à-dire en raison directe des masses et en raison inverse du carré de la distance) sont lancés dans l'espace : trouver les orbites décrites, et déterminer les particularités de leurs mouvements. Dans le second livre il s'attaqua à notre satellite. Il considéra le mouvement de la Lune comme la résultante de trois forces,

parallèles à trois axes perpendiculaires entre eux, qui se rencontrent au centre de cet astre et qui, emportés pour ainsi dire avec lui autour de notre globe, gardent leurs parallélismes respectifs. Mais si de cette façon il était relativement aisé de trouver les équations générales du problème, il n'en était pas de même lorsqu'on les appliquait aux phénomènes célestes : les équations se compliquaient alors singulièrement, et il fallut tout le génie du disciple de Jean Bernoulli pour arriver à déterminer ainsi la longitude et la latitude de la Lune.

Qu'on ne croit pas que là se bornent les recherches d'Euler<sup>1</sup>. Resserré dans notre cadre, nous ne pouvons donner qu'une idée très affaiblie de son activité scientifique. Celle-ci d'ailleurs se prolongea plus d'un demi-siècle, car il cessa seulement « de calculer et de vivre<sup>2</sup> », le 7 septembre 1783. Reproduisons pour conclure ces quelques lignes de Lacroix<sup>3</sup> qui caractérisent fort bien son œuvre : « Successeur immédiat de Bernoulli, et continuant ainsi l'école de Leibniz, il s'attacha surtout à perfectionner la science du calcul, en écartant de plus en plus les considérations de pure Géométrie, que les disciples de Newton appelaient le plus souvent à leur secours. Le premier, il offrit l'exemple de ces longues déductions où les conditions du problème étant d'abord exprimées à l'aide des symboles algébriques, c'est le calcul seul qui développe et surmonte toute la difficulté; mais pour en

(1) Leur simple énoncé occupe plus de 50 pages in-4° à la suite de son *Eloge* par Fuss. Saint-Petersbourg, 1783.

(2) « Le 7 septembre 1783, après s'être amusé à calculer sur une ardoise les lois du mouvement ascensionnel des machines aérostatiques, dont la découverte occupait alors toute l'Europe, il dina avec M. Lexell et sa famille, parla de la planète d'Herschel et des calculs qui en déterminent l'orbite; peu de temps après, il fit venir son petit-fils, avec lequel il badinait en prenant quelques tasses de thé, lorsque tout à coup la pipe qu'il tenait à la main lui échappa, et il cessa de calculer et de vivre. » CONDORCET. *Eloge d'Euler*. Strasbourg, 1786.

(3) LACROIX. *Biographie universelle de Michaud*. Nouvelle édit. Paris, 1843 et suiv.

tirer ce parti, il faut le manier avec adresse, il faut en bien connaître les formes, en remarquer et en retenir toutes les circonstances, afin d'en pressentir tous les résultats. Euler a fait preuve à cet égard d'une éminente sagacité et d'un génie aussi profond qu'inventif. S'il était permis de mettre en parallèle deux hommes, qui se sont illustrés dans des genres très différents, on dirait avec raison que par son étonnante fécondité et sa facilité pour le travail, Euler doit occuper dans les Mathématiques la place que tient Voltaire dans les Belles-lettres. Celui-ci ne laissait échapper aucune des pensées, aucun des traits d'esprit qui s'offraient sous sa plume; celui-là ne perdait pas un seul des calculs qu'il essayait dans toutes les recherches qu'il entreprenait sur les sujets les plus variés. »

A côté de ce grand savant, la Suisse possédait GABRIEL CRAMER, dont l'*Introduction à l'Analyse des lignes courbes algébriques* (1750) est l'ouvrage le plus développé sur ce sujet. On le consulte encore aujourd'hui. En France, ALEXIS CLAIRAUT par la précocité et la profondeur de ses recherches, contribuait beaucoup, pour sa part, au progrès scientifique. Fils d'un professeur de mathématiques, il publiait à seize ans ses *Recherches sur les courbes à double courbure*, qui lui ouvrirent avant l'âge réglementaire les portes de l'Académie (1731). Dans ce livre, il résolvait d'importants problèmes roulant sur les tangentes de ces courbes particulières. Leur rectification et la quadrature des cylindres qui les projettent sur les plans coordonnés y sont traitées par la méthode encore en usage aujourd'hui.

Dans des domaines moins élevés, Clairaut rendit de grands services à l'enseignement par la publication de ses *Éléments de Géométrie* (1741) et de ses *Éléments d'Algèbre* (1746) demeurés longtemps classiques. Son but constant dans la rédaction de ces cours est d'éviter toute démonstration ardue, toute pédanterie, tous détails inutiles, quitte à sacrifier l'exactitude rigou-

reuse, car il veut surtout « intéresser à la fois et éclairer les commençants », ainsi qu'il l'écrit dans la préface du premier volume.

Comme Euler, il s'occupa de Mécanique céleste. C'est même sa *Théorie de la Lune* qui a fondé sa réputation. Le procédé qu'il employait pour expliquer les inégalités observées était simple. Il décomposait l'action perturbatrice du Soleil en trois forces dirigées respectivement suivant le rayon vecteur tracé de la Lune à la Terre, la perpendiculaire à cette ligne menée dans le plan de l'orbite et la parallèle à la droite tirée de notre Globe au Soleil. Sous l'attraction isolée de la Terre, notre satellite décrirait une ellipse invariable. Les deux premières composantes de l'action perturbatrice du Soleil déforment cette trajectoire, et donnent à son grand axe un mouvement direct; d'autre part, les accélérations imprimées à l'axe le laisseraient se déplacer dans un plan fixe, mais l'effet de la troisième composante est de faire varier, dans chaque lunaison, l'inclinaison du plan de l'orbite sur celui de l'écliptique en même temps qu'elle imprime à la ligne des nœuds un mouvement rétrograde. Lagrange reprit plus tard le problème de ces perturbations.

En terminant l'analyse des œuvres de Clairaut, marquées toutes au cachet de l'élégance, notons qu'il exécuta d'immenses calculs sur la comète de Halley; ceux-ci lui permirent d'annoncer assez exactement son passage au périhélie<sup>1</sup>.

L'étude de ces corps célestes était d'ailleurs affectuonnée par ce savant, puisqu'il y revint dans deux autres ouvrages. Malheureusement, la marche suivie était pénible. JEAN LE ROND D'ALEMBERT résolut de la

---

(1) Il l'avait prédit pour le 4 avril 1759, mais comme il ne connaissait qu'approximativement les masses de Jupiter et de Saturne qui servaient de base à ses calculs, le passage eut lieu 23 jours plus tôt, le 12 mars. MAXIMILIEN MARIE. *Histoire des Sciences mathématiques et physiques*, t. VIII. Paris, 1886.

simplifier en appliquant les principes dont il s'était déjà servi pour les planètes. Ce fut même l'origine d'une dispute assez longue entre ces deux mathématiciens. Cette querelle passionna les contemporains, mais cela n'a qu'un médiocre intérêt pour la postérité. Passons donc, sans plus nous attarder, à l'examen des monuments légués à la science par le fils naturel du chevalier Destouches et de M<sup>me</sup> de Tencin.

Comme son adversaire, d'Alembert fut un enfant précoce. A vingt-deux ans, il composa un *Mémoire sur le Calcul intégral*, et il entra à l'Académie des Sciences à vingt-quatre (1742). L'année suivante son *Traité de dynamique* avait consacré définitivement sa renommée, et « fait époque dans la mécanique <sup>1</sup> ». Il y donna une méthode générale permettant de ramener toutes les lois du mouvement à des questions d'équilibre, en exprimant que les forces données qui meuvent le système considéré équilibrent les forces qui déplaceraient les particules de l'ensemble indépendamment les unes des autres et quelle que soit la façon dont s'opère la translation. On peut représenter effectivement ces dernières en fonction des accélérations, regardées comme inconnues ; alors les conditions d'équilibre des deux systèmes de force fournissent la mise en équation du mouvement.

Peu après, d'Alembert appliqua ces idées à l'étude de l'équilibre et du mouvement des fluides, et à la cause générale des vents. Il parvint à d'intéressantes conclusions. Mais de grandes difficultés se présentaient dans l'intégration et il dut inventer le calcul intégral aux différentielles partielles, dont il se servait dès 1744, pour la célèbre question des cordes vibrantes <sup>2</sup>.

(1) JOSEPH BERTRAND. *D'Alembert*, Paris, 1889.

(2) L'équation à laquelle on arrive est  $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = a \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ . Il en trouva l'intégrale générale  $y = f_1(x + at) + f_2(x - at)$ ,  $f_1$  et  $f_2$  étant deux fonctions arbitraires.

Dans les huit volumes de ses *Opuscules mathématiques* il aborda de nombreux sujets soit de Science pure, soit d'Astronomie. Nous écartons les seconds et nous ne pouvons dire qu'un mot des premiers. On y voit les rudiments du calcul des quantités imaginaires, dont les géomètres ne surent tirer parti que bien plus tard, des perfectionnements sur divers points d'Optique, sur la Théorie des probabilités et sur la Mécanique céleste. Enfin son influence sur la philosophie des Mathématiques fut des plus heureuses. Il rédigea le discours préliminaire et beaucoup d'articles de Géométrie dans *l'Encyclopédie* qui se remarquent par leur discussion serrée et leur grande netteté.

Parmi les autres savants de cette époque accordons une mention toute spéciale à JEAN-HENRI LAMBERT, qui naquit à Mulhouse en 1728, mais passa la plus grande partie de sa vie en Allemagne. Ainsi que d'Alembert, ce mathématicien a fait des découvertes importantes. Il introduisit en Trigonométrie les fonctions hyperboliques et démontra le premier d'une façon rigoureuse que  $\pi$  est irrationnel (1751). On rencontre dans sa Perspective (1759) plusieurs propositions se rattachant à la théorie des transversales et son *Traité des comètes* renferme plusieurs propriétés des coniques, en particulier la proposition suivante qui conduisit l'astronome Olbers à la découverte de Pallas. Lorsque dans deux ellipses possédant le même axe on prend deux cordes égales, et qu'en outre les sommes des rayons vecteurs aboutissant à leurs extrémités sont aussi identiques, les secteurs limités par ces rayons vecteurs et les arcs d'ellipses, sont entre eux comme les racines carrées des paramètres. En appliquant ce théorème aux orbites planétaires, et en remplaçant les secteurs par les temps<sup>(1)</sup>, il parvient à une formule très simple souvent usitée en astronomie. La

---

(1) Ce qui peut se faire, Newton ayant établi que le temps est proportionnel à la surface du secteur décrit, divisée par la racine carrée du paramètre.

notion de « travail » et de « force vive », dont il démontra l'importance, a été également introduite par lui en Mécanique.

Enfin, indépendamment de recherches originales sur l'Optique et l'Astronomie, il a ébauché dans ses *Observations analytiques* (1771) la théorie des fonctions, et aplani les voies à Lagrange. Certes il n'a pas rendu à la Science des services comparables à ceux des Leibniz et des Newton, mais la profondeur de ses vues et le talent qu'il déploya dans tous ses travaux en adaptant des méthodes appropriées à chaque problème, suffiront toujours à le distinguer.

Bien loin derrière lui, nous placerons la mathématicienne milanaise MARIE AGNESI, dont les *Instituzioni analitiche* (1748) n'étaient cependant pas sans valeur<sup>1</sup>, puisqu'ils eurent les honneurs de traductions française et anglaise. Elle y signale en particulier une courbe connue depuis sous le nom de cubique d'Agnesi<sup>2</sup>.

L'algébriste ETIENNE BEZOUT a joui longtemps d'une grande popularité en France, à cause de son *Cours de Mathématiques*, dont la première édition date de 1770, et dans lequel plusieurs générations apprirent les éléments de la science. Cependant sa *Théorie générale des équations* (1779) est un livre qui mérite plus d'attention. Il y enseigne la méthode d'élimination dite des coefficients indéterminés, le calcul des *déterminants* esquissé dès 1771 par Vandermonde et les moyens de réduire au minimum le nombre des équations d'une question donnée. De son contemporain JACQUES COUSIN, qui professa au collège de France et mourut sénateur en 1800, nous retiendrons seulement les *Leçons de Calcul différentiel et intégral* (1772) où se rencontrent

(1) Voir pour les détails relatifs à la vie et aux travaux de cette savante, la notice que nous lui avons consacrée dans le *Popular Science Monthly* (New-York), t. 53, juillet 1898.

(2) Agnesi avait appelé cette courbe *Versiera*. Consulter à ce sujet un article de M. GINO LORIA, dans la *Bibliotheca mathematica*. Stockholm. Nouvelle série, 1897, n° 2.

plusieurs simplifications relatives aux procédés d'intégration.

Quant au marquis de COXDORCET, la Philosophie plus que la Mathématique, a le droit de le réclamer. Toutefois son mémoire sur les *Séries récurrentes*, et son ouvrage sur l'*Application de l'Analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*, dénotent des idées originales mais peut-être plus brillantes que solides. Le dernier n'en avait pas moins ouvert un champ intéressant à la doctrine du hasard, champ que le suisse TREMBLEY devait quelque peu cultiver. Mais ses travaux sur les équations différentielles sont oubliés depuis longtemps. Il en est de même du *Calcul des dérivations* d'ARBOGAST, qui voulait supplanter l'analyse infinitésimale. Les résultats obtenus par l'auteur sont parfois curieux, mais les signes qu'il emploie sont nouveaux et compliqués, aussi rendent-ils difficile l'intelligence de son traité.

.

---

## CHAPITRE XVII

**Travaux de Lagrange. — Invention de la *Géométrie descriptive* par Monge (1800). — Œuvres de Laplace et de Legendre.**

Génial créateur de méthodes analytiques devenues classiques aujourd'hui, JOSEPH-LOUIS LAGRANGE eut des vues profondes dans tous les domaines de la science qu'il a embrassés. Son style est clair, sa marche assurée. Dans son œuvre, pas de détours, pas d'artifices de calcul comme on en voit chez Euler. Combiner ingénieusement les équations fondamentales d'un problème, en déduire des résultats inespérés, en dévoiler la fécondité : voilà son but. A Lagrange les voies larges, spacieuses, où l'on circule aisément, où l'on avance sans fatigue ; à Euler les routes escarpées, les chemins semés d'obstacles, que l'habileté et le courage du voyageur doivent surmonter.

Cet illustre mathématicien naquit à Turin le 25 janvier 1736. Il descendait d'une ancienne famille de Touraine alliée à celle de Descartes. Son père, bien que ruiné par des spéculations malheureuses, lui fit donner une éducation soignée, et à dix-huit ans nous le trouvons professeur de Mathématiques à l'École Royale d'Artillerie de sa ville natale. Ses premiers travaux datent de cette époque. Ils roulent sur la théorie des séries récurrentes, et sur le calcul des variations. Ce dernier avait principalement pour but de remplacer d'une façon avan-

tageuse la méthode différentielle, dans les questions de maxima et de minima d'intégrales. De plus, l'auteur en montre la nécessité dans la résolution des cas ardues où, d'après la nature du problème, les limites de l'intégrale sont elles-mêmes inconnues.

L'Académie des Sciences de Paris ayant proposé comme sujet de prix la théorie de la libration de la Lune, il se mit sur les rangs<sup>1</sup>. Il s'agissait de trouver une explication de ce fait d'observation que la Lune, sauf d'insensibles variations, tourne toujours la même face vers la Terre. Lagrange surmonta les difficultés du calcul et constata la justesse des vues théoriques émises par Newton à ce sujet. Son mémoire fut couronné. Ce succès encouragea le même corps savant à proposer une question encore plus aride : la théorie des quatre satellites de Jupiter. Quelques années auparavant Clairaut, Euler et d'Alembert avaient donné une solution dans l'hypothèse où le Soleil, la Terre et la Lune sont considérés comme agissant seuls. Mais ici il fallait examiner l'action de six corps : le Soleil, Jupiter et ses quatre satellites. Lagrange malgré son génie ne parvint à franchir qu'une partie des obstacles. Néanmoins le problème avait fait un grand pas. Laplace, vingt-quatre ans plus tard, devait forcer les derniers retranchements.

En 1766, il donna la solution du problème adressé par Fermat comme défi à plusieurs mathématiciens anglais, à savoir : un nombre entier non carré étant donné, déterminer un nombre entier et carré tel que le produit des deux nombres plus 1 soit un carré. Wallis l'avait résolu à force de tâtonnements successifs, mais Lagrange en s'y attaquant recula les bornes du sujet et formula le principe d'une solution complète de l'équation indéterminée du second degré à deux variables.

Puis, abandonnant ces travaux pour quelque temps, il

---

(1) MAXIMILIEN MARIE. *Histoire des Sciences mathématiques et physiques*, t. IX, Paris, 1886.



Fig. -26. — Portrait de LAGRANGE (1736-1813.)  
(D'après la gravure anglaise de Rob. Hart).



voulut rompre la monotonie de la vie qu'il menait à Turin en venant visiter Paris ou plutôt Condorcet, d'Alembert et Nollet, avec lesquels il entretenait une active correspondance. Son séjour dans la Capitale fut d'ailleurs d'assez courte durée, car Frédéric II l'appela pour remplacer Euler à la tête de l'Académie de Berlin. Le 6 novembre 1766, le nouveau directeur de la classe physico-mathématique était solennellement reçu par les membres de cette Société savante, et il conserva ses fonctions jusqu'en 1787.

Pendant les vingt années de son existence à Berlin, Lagrange publia d'importantes recherches. Énumérons les principales.

Dans son mémoire *Sur la figure des colonnes*, il montra qu'au conoïde, — ayant sa plus grande largeur vers le tiers de sa hauteur et allant en diminuant vers les deux extrémités, — adopté par les architectes, il est préférable de choisir le cylindre, offrant le « maximum maximorum » de résistance <sup>1</sup>.

Son traité sur la *Percussion des fluides* a pour but de déterminer la résultante des pressions normales qu'exerce sur un plan fixe une veine liquide tombant perpendiculairement sur lui. Il conclut de la façon ci-jointe. Dans le cas du choc direct et si le plan est assez large pour que toutes les particules du fluide soient forcées d'en suivre la direction en le quittant, l'action contre le plan est égale au poids d'une colonne du fluide de la même grosseur que la veine et d'une longueur double de celle d'où un corps pesant devrait tomber pour acquérir la vitesse du liquide.

Dans ses travaux *Sur la résolution des équations numériques* <sup>2</sup> on rencontre la démonstration de ce théorème : toute racine incommensurable d'une équation du second degré à coefficients entiers, dévelop-

(1) *Miscellanea Taurinensia*, t. V (1770-73); HOFER. *Histoire des Mathématiques*, 3<sup>e</sup> édit. Paris, 1886.

(2) *Mémoires de l'Académie des Sciences de Berlin*, t. XXIII et XXIV, 1769-70.

pée en fraction continue, donne naissance à un quotient périodique. Euler avait bien observé avant Lagrange que la racine carrée d'un nombre entier se réduit toujours en une fraction périodique, ce qui est un cas particulier du précédent. D'autre part, dans une note il donna un principe aisé pour réduire les équations en suites infinies. Ce procédé s'applique également aux équations transcendantes renfermant des logarithmes et des arcs de cercle.

La Théorie des nombres l'attira aussi. Dans cet ordre d'idées, il démontra la proposition suivante que Bachet de Méziriac avait découverte. Tout nombre entier non carré est toujours décomposable en deux, trois ou quatre carrés entiers. Il s'attaqua encore à ce théorème dû à Waring. Si  $n$  est un nombre premier, le produit  $1. 2. 3. 4... (n - 1) + 1$  est toujours un multiple de  $n$ . Enfin dans divers mémoires publiés de 1773 à 1775, il parvint à plusieurs résultats nouveaux en arithmétique.

Vers ce temps également, il fournit une théorie complète et très originale pour calculer les variations séculaires des éléments d'une planète. Il avait eu dans cette direction de nombreux prédécesseurs, mais il considéra le problème à un point de vue beaucoup plus général. Au lieu de combiner comme eux les orbites deux à deux, il les envisagea dans leur ensemble et il tomba sur l'équation intégrale résolvant complètement la question.

Mais l'œuvre capitale de Lagrange est sa *Mécanique analytique*, composée alors qu'il était à Berlin mais imprimée à Paris. Il déduisait tout son livre du principe de d'Alembert, combiné avec celui des vitesses virtuelles, qui fournit les moyens de l'utiliser. L'élégance d'exposition de cet ouvrage est assez grande pour que sir William Rowan Hamilton l'ait considéré comme « une espèce de poème scientifique <sup>1</sup> ».

---

(1) « *A kind of scientific poem*, » d'après FLORIAN CAJORI. *A History of Mathematics*. New-York, 1895.

Lagrange généralisait le théorème de son devancier, et en donnait la démonstration. Sa méthode consistait, en somme, à renfermer toutes les conditions d'équilibre d'un système matériel dans celle-ci : la somme des produits de toutes les forces qui y sont appliquées multipliées par les déplacements de leurs points d'applications respectifs est nulle, pourvu que ces translations ne soient pas incompatibles avec les liaisons du système considéré. Mettre en équation n'importe quel problème de Dynamique devenait alors chose aisée. Il suffisait d'égaliser à zéro la somme des moments virtuels des forces appliquées à l'ensemble, et des forces égales et contraires à celles qui déplaceraient séparément les divers points du système s'ils se mouvaient effectivement.

Toutes ces remarquables découvertes avaient mis Lagrange très en relief, et comme à la mort de Frédéric il avait quitté Berlin, Louis XVI l'appela à Paris et le logea au Louvre. Plus heureux que Bailly, Lavoisier ou Condorcet, l'orage révolutionnaire l'épargna. La Convention le nomma même président de la commission chargée d'établir le nouveau système des poids et mesures. Un décret de la Constituante lui maintint sa pension, et le Comité de Salut Public le dispensa d'obéir au décret qui exilait tous les étrangers. L'Empire lui continua les faveurs de la Royauté et de la République, et quand il mourut, le 10 avril 1813, il était comte, sénateur, membre de l'Institut et grand-croix de la Légion d'honneur.

Son enseignement à l'École Polytechnique où il avait été appelé dès la fondation, fut l'origine de sa *Théorie des fonctions analytiques* (1797), qui couronna dignement sa carrière. Son but était de substituer au calcul différentiel un ensemble de propositions basées sur le développement des fonctions algébriques en série. La première partie est consacrée au théorème de Taylor et à ses conséquences théoriques, et la dernière à son

emploi en Mécanique. Les *Leçons sur le calcul des fonctions*, professées en 1799 et publiées deux ans après, lui servent de commentaire et de supplément.

La Géométrie était depuis longtemps stationnaire; mais nous allons la voir briller à nouveau. Son histoire, peut-on dire, comprend trois périodes: sa création par les Grecs et ses développements successifs jusqu'à la fin du moyen âge, puis la période de transformation avec Descartes et Fermat, enfin son évolution moderne, qui date des recherches de Pascal et Desargues sur les sections coniques. L'abstraction et la généralité caractérisent l'esprit de cette phase de son renouvellement. Monge et Carnot en établirent définitivement les assises, au début du XIX<sup>e</sup> siècle, sur des méthodes aussi générales que fécondes. Cette continuation de l'Analyse géométrique des Anciens, tout en ayant le même objectif, en différait notablement à cause de l'uniformité de ses conceptions. Ses principes applicables à tous les cas remplaçaient avantageusement les problèmes particuliers et sans liaison entre eux, qui formaient uniquement la Science antique.

GASPARD MONGE, le génial auteur de la *Géométrie descriptive*, vit le jour à Beaune, en 1746. Son père était un marchand ambulant, qui, en s'imposant de multiples privations, put placer son fils chez les Oratoriens de sa ville natale <sup>1</sup>. Intelligent, avide de s'instruire, celui-ci s'y dévoila sujet d'élite; puis il entra à l'Ecole de Mézières où se formaient les officiers du Génie. Peu après, ayant été remarqué par ses maîtres, on le nomma répétiteur du cours qu'y professait Bossut, un savant qui, entre autres livres, a laissé un *Cours complet de Mathématiques* dont le succès fut grand à l'époque. Dès 1768, il songeait à rédiger l'ouvrage qui devait établir sa réputation; mais les autorités lui interdirent de publier ses méthodes, car il ne fallait pas « aider les

---

(1) FRANÇOIS ARAGO, *Œuvres*, t. II, Paris, 1854.



Fig. 27.

Portrait de GASPARD MONGE, inventeur de la *Geometrie descriptive*.  
(D'après le médaillon de David d'Angers.)



étrangers à devenir habiles dans l'art des constructions ». Elles ne devaient être divulguées qu'en 1800. C'était d'un patriotisme mesquin. Monge sut se venger en grand homme, de ce mutisme forcé. Il traita les questions géométriques, qu'il avait résolues par les projections à l'aide de l'Analyse transcendante. Ce fut l'objet de ses premières et très remarquables productions. Celles-ci lui ouvrirent les portes de l'Académie des Sciences en 1780, et lui valurent, trois ans plus tard, la place d'examineur des élèves de la Marine.

La Révolution le porta vers la carrière politique. Le 10 août 1792, le fils du colporteur bourguignon devenait ministre. Toutefois, il conserva peu de temps son portefeuille. Bien que décrété d'accusation, il échappa par la fuite au Tribunal révolutionnaire, devint membre de l'Institut dès sa fondation (1795) et avec Berthollet il recruta les savants chargés d'accompagner l'expédition d'Egypte où lui-même suivit Bonaparte. Revenu en France, il entra au Sénat, et il reçut peu après le titre de comte de Péluse. Mais revenons à son œuvre maîtresse.

L'auteur a soin d'indiquer au début les deux objectifs de la *Géométrie descriptive* : « Le premier est de donner les méthodes pour représenter sur une feuille de dessin qui n'a que deux dimensions, savoir : longueur et largeur, tous les corps de la nature qui en ont trois, longueur, largeur et profondeur, pourvu néanmoins que ces corps puissent être définis rigoureusement!.

« Le second objet est de donner la manière de reconnaître, d'après une description exacte, les formes des corps, et d'en déduire toutes les vérités qui résultent et de leur forme et de leurs positions respectives...

« Mais aussi, de même qu'en Analyse, lorsqu'un problème est mis en équation, il existe des procédés pour traiter ces équations, et pour en déduire les valeurs de chaque inconnue, de même aussi, dans la Géométrie descriptive, il existe des méthodes générales pour cons-

truire tout ce qui résulte de la forme et de la position respective des corps.

« Ce n'est pas sans objet que nous comparons ici la Géométrie descriptive à l'Algèbre ; ces deux sciences ont les rapports les plus intimes. Il n'y a aucune construction de Géométrie descriptive qui ne puisse être traduite en Analyse, et lorsque les questions ne comportent pas plus de trois inconnues, chaque opération peut être regardée comme l'écriture d'un spectacle en Géométrie. Il serait à désirer que ces deux sciences fussent cultivées ensemble : la Géométrie descriptive porterait dans les opérations analytiques les plus compliquées l'évidence qui est son caractère, et à son tour l'Analyse porterait dans la Géométrie la généralité qui lui est propre <sup>1</sup>. »

Nous n'analyserons pas ce traité, car il renferme les matières enseignées aujourd'hui dans les écoles. Son ordre ne diffère même pas essentiellement de celui que suivent les professeurs de mathématiques, mais il présente une particularité intéressante bien qu'on la passe souvent sous silence. L'auteur indique toujours la relation qui unit les opérations de la Géométrie descriptive à celles correspondantes de l'Algèbre.

La Mathématique doit encore à Monge, outre de nombreux mémoires dispersés dans les recueils scientifiques, deux ouvrages importants : *Application de l'Algèbre à la Géométrie* (1805) et *de l'Analyse à la Géométrie* (1807) qui mirent le sceau à sa gloire. Ses recherches ont apporté beaucoup de lumière dans le sujet si ardu de l'intégration des équations aux différentielles partielles. Avant lui on n'était guère fixé sur le degré d'indétermination qui doit peser sur l'intégrale générale d'une relation de la sorte. Monge éclaircit beaucoup ce point épineux sur lequel d'Alembert et Euler avaient déjà longuement discuté.

---

(1) Monge. *Géométrie descriptive*, Paris, an VII (1800).



*Canova del.*

*Dea Sculp.*

**L.<sup>N.</sup>M.<sup>E.</sup> CARNOT,**

**LIEUTENANT GÉNÉRAL.**

*Chevalier des Ordres Royal et Militaire  
de S.<sup>t</sup> Louis et de la Légion d'Honneur.*

*Né le 23 Mai 1753, à Noy, Dép. de la Côte d'Or.*

*Il a organisé la victoire.*

*Moniteur des 3. page 1146.*

*A Paris, chez l'Editeur*

Fig. 28.

*Déposé*



Les dernières années de ce grand homme furent attristées. Privé de toutes ses charges par la Restauration, rayé de l'Institut (1816), son organisme ne put supporter tant d'assauts, et après s'être obscurcie quelque temps, cette sublime intelligence s'éteignit le 18 mars 1818.

Les méthodes de Monge pénétrèrent bientôt dans toutes les écoles techniques. En France, HACHETTE, qui avait remplacé son maître, continua la tradition et publia en 1822 un nouvel exposé de ses doctrines; en Allemagne SCHREIBER, de Carlsruhe, s'en fit l'ardent propagateur dans un volume paru en 1828-29, et CLAUDE CROUZET, ancien élève de l'École Polytechnique, les porta jusqu'aux États-Unis. En effet, il écrivit en 1821 le premier livre de Géométrie descriptive en langue anglaise<sup>1</sup>. Il était destiné aux cadets de l'Académie militaire de West-Point où il professait les mathématiques. D'autre part, COUSINERY, dans sa *Géométrie perspective*, employa seulement une seule projection.

Tandis que Monge et ses successeurs Dupin, Olivier et de la Gournerie étudiaient les relations de forme et principalement celles des surfaces et des courbes dans l'espace à trois dimensions, LAZARE CARNOT et son école s'attaquaient aux relations métriques des figures<sup>2</sup>.

Ce mathématicien naquit à Nollet, le 13 mai 1753, et fit la plus grande partie de son éducation au petit séminaire d'Autun. A sa sortie de l'École de Mézières (1773) il fut nommé sous-lieutenant du génie, mais n'en continua pas moins ses études mathématiques, et dès 1783 mit à jour un *Essai sur les machines en général*. Il y envisage d'une façon neuve tout système de corps mobile.

---

(1) FLORIAN CAJORI, *The teaching and history of Mathematics in the United States*. Washington, 1890.

(2) En géométrie, les figures et leurs parties ont entre elles des relations de deux sortes : les unes *descriptives* concernent leurs formes et leurs situations, et les autres *métriques* se rapportent à leurs grandeurs. D'où deux méthodes géométriques rationnelles dont les chefs respectifs sont Monge et Carnot.

Après avoir indiqué que pour mesurer exactement la force employée à soulever un poids, par exemple, il suffit de multiplier la masse du corps par la hauteur d'élévation, il montre que le produit ainsi obtenu est constant. Donc une machine, quelque perfectionnée qu'elle soit, n'ajoutera jamais rien à la force motrice, elle transformera seulement l'effort afin de le rendre plus facile à vaincre. Il remarque aussi que sous peine de diminuer considérablement la force vive, il ne faut pas modifier brusquement les vitesses. Par le théorème suivant, il donne même l'expression mathématique de cette perte : elle égale la force vive dont tous les corps seraient animés, si on imprimait à chacune des parties du système la vitesse finie qu'elle a perdue à l'instant même où le changement brusque s'est opéré.

A la Révolution, le département du Pas-de-Calais nomma Carnot député, puis en 1793 il devint membre du Comité de Salut public où il fut chargé spécialement de la direction de nos armées, et il sortit à son honneur de cette période troublée de notre histoire, ce qui lui valut le surnom « d'Organisateur de la victoire ». Opposé au Coup d'État, il se réfugia à Genève et à Augsbourg. Entre temps, il composa ses *Réflexions sur la métaphysique du Calcul infinitésimal* (1799), où il prend partie contre la réforme qu'avait tentée Lagrange par sa méthode des variations. Il souhaite qu'on s'en tienne à la marche si simple, si lumineuse de Leibniz, qui se prête d'ailleurs mieux aux applications. Les mathématiciens ont suivi ses conseils, sans goûter toutefois ses raisonnements.

Rappelé par Bonaparte après le 18 brumaire, il devint Ministre de la guerre ; mais démissionnaire peu après, il entra au Tribunat en 1802. Son rôle jusqu'en 1814 fut assez effacé, et proscrit au retour de Louis XVIII, il se retira à Magdebourg où il décéda le 22 août 1823. Du moins sa retraite de la scène politique ne fut pas perdue pour la Science. Il avait établi sa réputation sur des bases solides, par son *Essai sur la théorie des trans-*

versales et surtout par sa *Géométrie de position* (1807). Il discuta dans ce dernier ouvrage les fondements mêmes de la Géométrie analytique. Il aperçut la concordance nécessaire entre les changements de forme d'une figure et les changements de signes qui s'opèrent dans les transformations algébriques correspondantes. Par suite, quelles que soient les déformations subies par une figure, les mêmes équations s'y rapporteront toujours. Les multiples propriétés de l'espace, qu'il exposa dans ce traité ont été pendant plus d'un demi-siècle l'origine des progrès de la Géométrie.

Parmi les savants qui marchèrent sur ses traces, distinguons : SERVOIS dont les *Solutions peu connues de différents problèmes de Géométrie* (an XII) ont décélé la fécondité des principaux théorèmes de la théorie des transversales, soit pour la démonstration de certaines propositions, soit pour résoudre sur le terrain différents problèmes de Géométrie pratique<sup>1</sup>; BRIANCHON qui dans son *Mémoire sur les lignes du second ordre*<sup>2</sup> déduisit pour la première fois du théorème de Desargues sur l'involution des six points l'étude de ces courbes, et PONCELET dont le *Traité des propriétés projectives des figures* est classique. Grâce au principe de continuité, à la considération des polaires réciproques et des figures homologues à deux et à trois dimensions, il démontra sans calculs les propriétés déjà connues des lignes et des surfaces du second degré, et sut en découvrir de nouvelles; enfin, plus près de nous, nous trouvons MICHEL CHASLES qui, outre l'*Aperçu historique* cité plusieurs fois au cours de notre Histoire, a laissé d'intéressantes études sur la Géométrie supérieure.

Après avoir vu quels heureux progrès la Science de l'étendue devait aux Carnot, aux Monge et à leurs

---

(1) JACQUES BOYER. *Le mathématicien franc-comtois François-Joseph Servois d'après des documents inédits*. Besançon, 1895.

(2) Consulter l'article que nous avons écrit sur Brianchon (1783-1864) dans la *Revue scientifique*, 4<sup>e</sup> série, t. I. Paris, 1894.

successeurs, assistons à la rénovation de la Mécanique céleste avec Pierre Simon marquis DE LAPLACE.

Né à Beaumont-en-Auge (Calvados) le 23 mars 1749, nous le trouvons dès 1767 à Paris où la protection de d'Alembert lui valut une place de professeur à l'École Militaire. Dès lors sa carrière se poursuivit heureuse et tranquille. Aussi nous la résumerons rapidement avant de passer à l'analyse de son œuvre. Il prit une part importante à la création des Écoles Normale et Polytechnique, et, après le 18 brumaire, Bonaparte lui confia le Ministère de l'Intérieur ; mais comme il « portait l'esprit des infiniment petits » dans ses délicates fonctions, celui-ci jugea opportun de le remplacer deux mois plus tard par son frère Lucien. Cependant l'Empereur ne lui tint pas rigueur des déceptions qu'il avait causées au Premier Consul, puisqu'il le nomma successivement sénateur, comte et grand officier de la Légion d'honneur. Cela ne l'empêcha pas de voter, en 1814, la déchéance de son protecteur, et de se montrer le plat serviteur des Bourbons. Aussi la Royauté récompensa la souplesse de son échine en le faisant entrer à la Chambre des Pairs et en le nommant marquis. Laplace mourut à Paris le 5 mars 1827. Nous parlerons peu de ses hypothèses cosmogoniques qui relèvent plutôt de la Physique et de l'Astronomie, pour nous étendre plus longuement sur le parti que la Mathématique a tiré de ses travaux.

En Analyse pure, ses titres sont des perfectionnements aux procédés d'intégration des équations aux différentielles partielles et la première démonstration rigoureuse des formules de résolution d'un système d'équation du premier degré. D'autre part, il a trouvé les équations aux différences mêlées, reprises plus tard par Poisson, et il a approfondi la théorie des séries.

Son *Exposition du système du Monde* (1796) et son *Traité de Mécanique céleste* (1799) l'ont fait surnommer le « Newton français ». Pour résoudre le pro-



Fig. 29. — Portrait de LAPLACE (1749-1827).  
(D'après le tableau de Paulin Guérin. Galerie de Versailles.)



blème des trois corps, Euler, Clairaut et d'Alembert avaient créé des méthodes d'approximation restreintes à chaque question particulière. Laplace partit d'un point de vue différent. Il se servit d'un procédé capable de fournir des approximations en séparant les uns des autres par ordre de grandeur, les termes se rapportant aux différentes perturbations.

Dans la théorie de la Lune, les observations ne cadrant pas avec les lois qu'on avait déduites des recherches de ses prédécesseurs, il ajouta de nouvelles équations qui sont, au dire de Delambre, « un des services les plus signalés que l'Analyse ait pu rendre à l'Astronomie <sup>1</sup> », car tous ses calculs concordent avec ceux que Burg a fondés sur les observations mêmes.

D'un autre côté, une particularité bizarre se présentait dans la marche des satellites de Jupiter. Leurs mouvements moyens semblaient l'un accéléré, l'autre retardé. Laplace en chercha l'interprétation et il reconnut qu'un terme de la série des perturbations de ces deux astres, considéré comme peu important, était loin d'être négligeable; il put alors fournir l'équation tant désirée en rétablissant ce terme. Cette belle réussite le détermina à reprendre la théorie des satellites de Jupiter. Après avoir expliqué toutes les inégalités périodiques, il arriva à découvrir une relation simple entre les mouvements moyens et les longitudes des trois premiers satellites.

Il fournit encore un procédé remarquable, et dispensant de toute intégration, pour calculer les orbites des comètes et il formula la *théorie des marées*. C'est en faisant entrer en ligne de compte les circonstances physiques et locales du phénomène qu'il parvint à l'édifier. Grâce à sa méthode on peut aujourd'hui prédire avec exactitude, plusieurs années à l'avance,

---

(1) DELAMBRE. *Rapport historique sur les progrès des Sciences mathématiques*, Paris, 1810.

l'heure et la hauteur des grandes marées pour un port donné. En outre, il découvrit un fait capital pour la stabilité de notre système planétaire. Si, en effet, les orbites des planètes varient, si leurs grands axes tournent perpétuellement autour du Soleil, et si leurs plans se déplacent d'une façon continue, il existe un élément qui au milieu de cet apparent chaos ne change pas : le grand axe, ou du moins sa longueur, ne subit que de très petites variations périodiques. Telles sont les principales découvertes renfermées dans ces deux ouvrages dont le style est un modèle de précision, et qui peuvent soutenir la comparaison avec l'impérissable chef-d'œuvre de l'auteur des *Principes*.

Sa *Théorie analytique des probabilités* (1812) donna à la doctrine des hasards son unité systématique. Deux livres la composent : dans le premier se trouve indiqué le calcul des fonctions génératrices que Laplace prend pour base de sa théorie, et le second est réservé aux applications des méthodes générales à de multiples problèmes. L'*Essai philosophique des probabilités* (1819) a pour objet d'exposer sans calcul les grands principes et les résultats obtenus. Cette œuvre popularisa cette science inaccessible jusque-là aux personnes non versées en Algèbre. Transcrivons au sujet de ces volumes le jugement suivant. « Laplace, dans sa *Théorie analytique*, avait terminé toute une époque : il en avait fini, si je puis ainsi dire, avec le passé entier de l'Analyse des hasards ; il avait élevé à ce passé un monument immortel, témoignage et dépôt de ses connaissances et de son génie ; dans l'*Essai philosophique* il poursuivait un dessein différent. Après avoir clos toute une ère écoulée, il en ouvrait une nouvelle. L'*Essai* était la charte des âges à venir, comme la *Théorie* avait été la conclusion des âges accomplis <sup>1</sup>. »

Un autre mathématicien français, ADRIEN-MARIE LE-

---

(1) GOURAUD. *Histoire du Calcul des probabilités*. Paris, 1848.

GENDRE occupe une assez grande place dans l'histoire de cette période. Dans son mémoire sur *la Figure des planètes* (1782) il démontra d'une façon nouvelle que la forme ellipsoïdale est la seule qui puisse convenir à une masse fluide, homogène, animée d'un mouvement de rotation, et dont toutes les particules s'attirent selon les lois newtoniennes. Peu après, il publia un premier travail sur la *Théorie des nombres* où se trouvait le célèbre théorème de réciprocity connu sous son nom<sup>1</sup>. Il résuma plus tard toutes ses recherches sur ce sujet, dans un grand traité. « Si l'on compare le contenu de cet ouvrage à ce qu'on avait découvert pendant les deux mille ans qui ont précédé l'année 1785, on voit qu'aucun savant n'a marqué son passage dans cette branche des mathématiques par une trace comparable à celle des efforts de Legendre<sup>2</sup>. »

Puis, en 1794, parurent ses *Éléments de géométrie*, qui eurent un énorme succès. Ce livre d'enseignement fut traduit dans presque toutes les langues de l'Europe, et assura la fortune de son auteur. L'Académie des Sciences lui avait d'ailleurs ouvert ses portes auparavant. Enfin sa *Théorie des fonctions elliptiques* (1825-26) contribua beaucoup à sa renommée. Il s'y propose de comparer entre elles toutes les transcendentes, réduit chacune d'elles à sa forme la plus simple, et les groupe en trois classes. La première renferme les transcendentes plus simples que les arcs d'ellipse ou d'hyperbole, et qui peuvent s'exprimer au moyen d'arcs d'ellipse sans réciprocity; la seconde comprend les arcs d'ellipse ou d'hyperbole et dans la troisième, il range des transcendentes plus compliquées que les arcs d'ellipse. Depuis lors, cette branche de la Science a considérablement progressé. Abel, Jacobi et tant d'autres, ont bien

---

(1) MAXIMILIEN MARIE. *Histoire des Sciences mathématiques et physiques*, t. X, Paris, 1887.

(2) ELIE DE BEAUMONT. *Eloge de Legendre*, Paris, 1861.

dépassé le niveau de ce livre, si remarquable cependant.

La Mécanique était aussi très cultivée au commencement du siècle. LOUIS POINSON, avec ses *Éléments de Statique* (1803), simplifia beaucoup les démonstrations en introduisant la théorie des couples et ce cours, bien que démodé aujourd'hui, est un modèle que les professeurs auraient tout intérêt à relire. Du reste le nom de Poinson est connu des étudiants, son théorème sur le mouvement d'un solide abandonné à lui-même étant souvent appliqué dans la mise en équations des problèmes.

Le *Traité de Mécanique* de POISSON (1811) procède du même esprit, et fut classique pendant longtemps. Indépendamment de cette œuvre, l'auteur a publié de nombreux mémoires sur toutes les parties de la Physique mathématique, principalement sur la chaleur, l'action capillaire, la théorie de l'électricité, du magnétisme et de l'élasticité. Enfin nous voyons naître, vers la même époque, l'Optique mathématique avec THOMAS YOUNG qui formula le premier le principe des interférences lumineuses. Un peu après, AUGUSTIN FRESNEL, mort en 1827, dut, pour établir la théorie des ondulations, manier l'Algèbre avec autant d'habileté que l'expérience.

---

## CHAPITRE XVIII

Coup d'œil sur la Science contemporaine.

**Arithmétique Supérieure. — Analyse et théorie des fonctions. — Algèbre et Mécanique. — Géométrie euclidienne et Géométries non euclidiennes.**

Entrons en matière par une déclaration.

Ce chapitre n'a pas la prétention d'être une revue tant soit peu complète des recherches si importantes publiées depuis un demi-siècle. Une telle tâche serait fort difficile à remplir en plusieurs volumes, *a fortiori*, il est impossible d'exposer en une trentaine de pages la quintessence des innombrables travaux qui ont vu le jour pendant cette période tant surchargée. En outre, il est malaisé de parler des vivants... Je prie donc le lecteur de ne voir dans ce qui va suivre qu'un choix de noms pris dans chaque branche de la Mathématique, une simple note ajoutée à la fin de mon livre, des points de repère disposés dans le champ immense que ne cessent de défricher d'opiniâtres travailleurs parmi lesquels nous signalerons simplement quelques-uns des plus habiles ou les plus favorisés.

### ARITHMÉTIQUE SUPÉRIEURE

La Mathématique est la reine des Sciences, et l'Arithmétique est la reine des Mathématiques, disait Gauss. Commençons donc cette rapide esquisse par

la Théorie des nombres, si délaissée des époques précédentes et qui revint en faveur au commencement de notre siècle, grâce à ce savant.

CHARLES-FRÉDÉRIC GAUSS naquit à Brunswick, le 30 avril 1777, et fit preuve dès son enfance des plus rares aptitudes pour le calcul mental. Aussi Bartels qui était alors simple surveillant à l'école où le jeune prodige faisait son éducation, le signala-t-il au duc Charles-Guillaume. Ce prince s'intéressa à lui, le plaça à ses frais au gymnase de la ville, et une fois ses études classiques achevées l'envoya à l'Université de Göttingue. La chaire mathématique était occupée par Kæstner, dont l'enseignement n'enflamma guère notre étudiant qui, dès cette époque, se livra à des recherches originales. Il découvrit entre autres une méthode pour inscrire un polygone régulier. Ce succès l'encouragea à poursuivre ses spéculations sur la haute Arithmétique.

En 1798, il se rendit à Helmstædt où il fut bien accueilli par Pfaff et, après avoir consulté les bibliothèques de l'endroit, il retourna à Brunswick achever son fameux ouvrage : *Disquisitiones arithmeticae*, qui parut en 1801 et qui marque une nouvelle ère pour la théorie des nombres. Ce livre étonne par la foule des théorèmes et par la profondeur des résultats. Parmi les découvertes les plus intéressantes qu'il renferme, notons le caractère d'abaissement pour les équations à deux termes. Si le degré d'une équation de ce genre est, en effet, exprimé par un nombre entier, on peut la décomposer en d'autres dont les exposants soit respectivement les facteurs premiers du nombre, qui précède d'une unité ce nombre premier.

L'illustre auteur indiqua aussi un nouveau procédé pour trouver les propriétés des nombres par la considération de la *congruence* ou relation existant entre tous les nombres donnant le même reste lorsqu'on les divise par un terme identique. Puis en passant des congruences du premier ordre à celles du second, il

ramena à la théorie de ces expressions toute l'Analyse indéterminée. Ce ouvrage fut reçu avec enthousiasme dans le monde mathématique. Puis Gauss s'appliqua à d'autres objets qui répandirent son nom dans le grand public. Piazzzi venait de découvrir à Palerme, en 1801, la première planète télescopique, Cérès. Aussitôt le savant de Brunswick s'empessa de calculer ses éléments à l'aide de méthodes ingénieuses qui permirent de la retrouver quand on la vit reparaitre après son passage au périhélie. L'année suivante, Olbers découvrit à son tour Pallas, et Gauss consacra également de longues veilles à l'étude de ses perturbations. Ceci lui valut d'être nommé directeur de l'Observatoire que le gouvernement hanovrien venait de fonder à Göttingue (1807). Dès lors sa vie s'écoula calme et paisible sans particularités bien saillantes. Seule, l'édition de ses travaux en marqua les étapes.

Prenant pour point de départ la loi de la gravitation universelle, le sagace astronome développa, dans sa *Theoria motus corporum cælestium* (1809), des moyens simples pour calculer plus exactement toutes les orbites des corps de notre système solaire, sans en excepter les comètes dont la marche avait jusque-là déjoué l'attention des observateurs. Il y applique cette idée réformatrice, — la méthode des moindres carrés, — si usitée aujourd'hui par les astronomes ou les ingénieurs lorsqu'ils ont à déduire des quantités inconnues, d'autres déterminées par l'expérience. En passant sous silence ses remarquables recherches d'Astronomie pratique et de Physique poursuivies sans relâche jusqu'à sa mort (1855), signalons encore un de ses plus importants mémoires *Disquisitiones circa superficies curvas* (1827) où se rencontre son célèbre théorème : Quelle que soit la déformation subie par une surface flexible et inextensible, la somme de ses courbures principales en chaque point reste toujours identique.

Si Gauss, par la date de ses publications, appartient à la

période contemporaine, l'universalité de son œuvre doit le faire classer plutôt parmi les mathématiciens de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, à côté des Euler, des Lagrange et des d'Alembert. La *spécialisation*, cette caractéristique de notre temps, n'apparaît, en effet, dans aucun de ses Mémoires. « Nous aurons un tableau du développement des Mathématiques, si nous imaginons une chaîne de montagnes élevées représentant les hommes du XVIII<sup>e</sup> siècle, terminée par une cime imposante — Gauss, — puis une large et riche contrée, formée de collines moins élevées, mais remplie de nouveaux éléments de vie <sup>1</sup>. »

Un autre savant allemand, JACOBI, que nous retrouverons lorsque nous nous occuperons des fonctions, poursuit aussi d'intéressants travaux sur la haute Arithmétique, entre autres sur la théorie des résidus. Ce sujet fut repris par son compatriote LEJEUNE-DIRICHLET, né à Düren en 1805. Après avoir fait son éducation à Bonn, puis à Cologne, celui-ci vint à Paris en 1822, attiré par la célébrité des mathématiciens français de l'époque, les Laplace, les Cauchy et les Legendre. Trois ans plus tard il présentait à l'Académie des Sciences un premier mémoire sur l'impossibilité de certaines équations indéterminées du 5<sup>e</sup> degré. Puis il retourna en Allemagne, fut nommé, en 1827, professeur à Breslau, ensuite à Berlin (1831), chaire qu'il quitta seulement en 1855 pour remplacer Gauss à Göttingue. Pendant ses années de professorat, il s'efforça dans une série d'études de sim-

---

(1) FÉLIX KLEIN. *Conférences sur les Mathématiques*, traduction L. LAUGEL. Paris, Librairie Hermann, 1898. Pour ce chapitre, nous ferons plusieurs emprunts à cet ouvrage. Voici, d'autre part, les principales sources que nous avons utilisées, et que nous citons ici une fois pour toutes ; MERRIMAN et WOODWARD, *Higher Mathematics*, ch. XI, *History of modern Mathematics*, par DAVID EUGÈNE SMITH, New-York, 1896 ; CAJORI, *History of Mathematics*, New-York, 1895 ; ROUSE BALL, *A short account of the History of Mathematics*, Londres, 1888 ; articles de la *Bibliotheca mathematica* de M. ENESTRÖM, Stockholm 1887 et suiv. ; collection du *Zeitschrift für Mathematik und Physik*, *Historisch-literarische Abtheilung* dirigé par M. MORITZ CANTOR, Leipzig, 1875 et suiv. et surtout l'excellent livre de M. GINO LORIA, *Il passato ed il presente delle principali teorie geometriche*, 2<sup>e</sup> édit. Torino, 1896.

plifier les notations souvent peu intelligibles de Gauss, et dans ses *Leçons sur la théorie des nombres*, rédigées par Dedekind, il arriva, grâce à une lucidité parfaite, à rendre accessibles aux débutants et suggestifs aux lecteurs plus avancés, les principes ardu de cette partie de la Science.

Parmi ses continuateurs, outre Cauchy dont nous parlons ci-après afin d'éviter des redites, nous citerons les suivants. TCHEBYCHEFF, professeur à l'Université de Saint-Petersbourg, dans son mémoire *Sur les nombres premiers* (1850), fixa les limites entre lesquelles doit être renfermée la somme des logarithmes des  $N$  nombres premiers, inférieurs à un nombre donné  $x$ . Dernièrement POINCARÉ et HADAMARD ont fait de ce sujet particulier l'objet de savants mémoires.

L'Anglais STEPHEN SMITH s'occupa aussi d'Arithmologie. Né à Londres en 1826, il acheva ses études au Balliol College d'Oxford, devint en 1861 professeur de Géométrie dans cette dernière ville où il résida jusqu'à sa mort survenue en 1882. Outre des rapports historiques communiqués annuellement à l'Association Britannique de 1859 à 1865, il a effectué des recherches originales sur la théorie des congruences et la théorie des formes. En particulier, il remarqua que la représentation des nombres par des formes quadratiques simples peut se déduire d'une méthode générale dont il formula les principes. Les théorèmes relatifs aux cas de 5 carrés avaient été donnés par EISENSTEIN de Berlin, ce génie ravi trop tôt à la science. Smith compléta ses énoncés et ajouta les théorèmes se rapportant à la décomposition en 7 carrés. Ceux de 2, 4 et 5 avaient été obtenus au moyen des fonctions elliptiques et Smith parvint à la limite extrême de ces groupes, celle de 8 carrés.

EDOUARD KUMMER, qui mourut, en 1893, professeur à l'Académie de Berlin, aborda également la « seule branche pure des mathématiques non souillée par le contact des applications », comme il appelait l'Arithmé-

tique supérieure. Ses mémoires sur les nombres complexes formés avec les racines de l'unité et sa notion originale des facteurs « idéaux » le placent à côté de Dirichlet, sans compter ses autres travaux algébriques ou géométriques sur les intégrales définies, l'évaluation des séries lentement convergentes, les systèmes de rayons rectilignes et la réfraction atmosphérique.

KRONECKER et DEDEKIND portèrent leur attention sur les nombres transcendants et irrationnels, mais surtout HERMITE, le doyen actuel des géomètres français, éclaira bien des points obscurs de l'édifice laborieusement construit par Gauss. Sa généralisation des fractions continues, sa méthode féconde pour démontrer l'impossibilité de la quadrature du cercle et tant d'autres idées, semées au cours d'écrits que nous analyserons plus loin, l'ont rendu célèbre. Les tentatives sur la réduction des formes ont été enfin poussées très avant par CAMILLE JORDAN.

On voit par ce qui précède combien la conception du *nombre* s'est étendue et modifiée à travers les âges. Au temps de Diophante, on ne considérait que les nombres positifs, entiers ou fractionnaires. Il faut arriver jusqu'à Descartes pour voir s'introduire la notion de nombre négatif et jusqu'au commencement de notre siècle celle des imaginaires était inconnue ; tandis que de nos jours la continuité des nombres réels est regardée comme acquise. On l'envisage même sous différents aspects.

#### ANALYSE ET THÉORIE DES FONCTIONS

L'homme qui, au cours de la période contemporaine, a le plus contribué à l'avancement de l'Analyse, est sans contredit AUGUSTIN-LOUIS CAUCHY. Ce mathématicien naquit à Paris en 1789, et entra à l'École Polytechnique en 1805. Il en sortit dans les Ponts et Chaussées. Employé d'abord comme ingénieur aux travaux du port de



*Acad. des sciences. (Mécanique.)*

**CAUCHY,**

*(Augustin-Louis.)*

*Ingenieur des Ponts et Chaussées, Professeur d'Analyse à  
l'École polytechnique, Chevalier de la Légion d'honneur.*

*Né à Paris le 21 Août 1789, élu en 1816.*

Fig. 30. — (D'après une lithographie de Boilly, 1831.)



Cherbourg (1810), il ne tarda pas à revenir à Paris où, sur les conseils de Laplace, il renonça à la carrière administrative, pour se consacrer exclusivement à la Science pure. Il n'eut pas du reste à le regretter, puisque l'Académie l'admit dans son sein en 1816, et qu'il fut nommé professeur de Mécanique à l'Ecole Polytechnique. Mais à l'avènement de Louis-Philippe il dut quitter sa chaire pour refus de serment. Cauchy se retira alors à Turin, puis à Prague où de 1833 à 1838 il enseigna les sciences au duc de Bordeaux. De retour à Paris, vers cette époque, il professa dans plusieurs établissements religieux, notamment chez les Jésuites<sup>1</sup>. Enfin le gouvernement de 1848 le dédommagea en lui donnant la chaire d'Astronomie mathématique à la Sorbonne, chaire qu'il occupa jusqu'à sa mort (25 mai 1857). Tous les domaines de la mathématique lui doivent d'utiles contributions : l'Arithmétique comme la Géométrie, l'Analyse aussi bien que l'Algèbre, l'Optique comme la Mécanique céleste. Toutefois, certaines de ses recherches priment les autres. Il a fondé la théorie des résidus, et a pu entreprendre, grâce à elle, l'explication des périodes des intégrales ; il a porté ses efforts sur la série de Taylor, dont il a tenté de déterminer les conditions de convergence. Il a trouvé, le premier, un procédé général pour l'intégration des équations aux dérivées partielles du premier ordre à une seule inconnue. Avant lui, JEAN-FRÉDÉRIC PFAFF de Göttingue, s'était efforcé de résoudre le problème, mais sa méthode, pénible du reste, reposait sur des calculs compliqués.

Cauchy arriva, d'autre part, à déterminer immédiatement les valeurs générales des variables principales

---

(1) MAXIMILIEN MARIE. *Histoire des Sciences mathématiques et physiques*, t. XII, Paris, 1888. Si nous empruntons quelques renseignements biographiques à cet ouvrage, nous n'aurions garde d'accueillir les appréciations extraordinairement partiales et injustes émises par Marie sur Cauchy, son ennemi personnel du reste.

qui vérifient un système d'équations linéaires à coefficients constants, en fonction de la variable indépendante et des valeurs initiales des inconnues principales et de leurs dérivées, sans établir aucune distinction pour le cas où l'équation auxiliaire possède des racines égales.

Navier avait entrepris un des premiers d'analyser les lois élémentaires de l'équilibre et du mouvement des systèmes de corps solides. Il était arrivé aux équations différentielles de cette question de Mécanique. Lagrange et Poisson s'en étaient inquiétés également. Cauchy voulut généraliser le problème, et le rendre indépendant des conditions particulières auxquelles on l'avait primitivement assujéti : l'introduction du *principe de continuité* des déplacements géométriques lui suffit pour trouver une marche des plus heureuses.

L'illustre analyste formula aussi la théorie de l'équilibre et du mouvement des tiges et des plaques élastiques, sachant déduire des formules plusieurs considérations physiques que l'expérience vérifia par la suite.

Fresnel venait de fournir une explication presque complète des divers phénomènes lumineux, en partant de quelques données simples fournies par l'observation ; mais il restait à coordonner les théories partielles en un corps de doctrine unique, émanation directe des lois fondamentales de la Mécanique. Le génie de Cauchy mena cette tâche délicate à bonne fin. Il parvint aux équations générales de l'Optique en soumettant à l'Analyse les mouvements qui peuvent coexister dans un double système de molécules (celles des masses pesantes et celles de l'éther) se pénétrant mutuellement. Il eut encore recours à son principe de continuité qu'il énonce ainsi, en la circonstance : les particules d'éther, intérieures ou extérieures, forment un système unique et continu, et les déplacements moléculaires comme leurs dérivées partielles varient par degrés insensibles lorsqu'on passe d'un milieu à un autre.

Ajoutons qu'il enrichit la théorie des *déterminants*, ébauchée par Vandermonde et qu'en Géométrie élémentaire il a exécuté un remarquable travail sur les polyèdres. Cette esquisse sommaire n'a pu rendre que bien imparfaitement l'énorme activité de ce savant, attestée par plus de 700 mémoires insérés dans les publications académiques ou autres, et que le Gouvernement français est en train de réunir et de rééditer. Beaucoup d'entre eux avaient aussi été publiés sous le titre : *Exercices mathématiques*, sorte de revue qu'il faisait paraître à intervalles irréguliers. On a souvent comparé Cauchy à Gauss. Comme ce dernier, en effet, sans se cantonner dans un coin de la science, il sut créer souvent, et perfectionner toujours.

A ce génial algébriste français, la Norvège a un grand nom à opposer, NICOLAS HENRI ABEL, que ses malheurs autant que ses découvertes ont rendu célèbre. Né le 25 août 1802 à Frindø où son père était pasteur protestant, il fit son éducation à l'école cathédrale de Christiania, et prit goût aux Mathématiques dès l'âge de seize ans. Vers cette époque il pensait avoir trouvé la solution de l'équation générale du 5<sup>e</sup> degré. Puis en 1820 il mit à jour quelques mémoires d'analyse dont le succès lui valut de voyager pendant deux ans en Allemagne, en France et en Italie aux frais du roi. Il resta d'abord six mois à Berlin, se liant avec Crelle, se dirigea ensuite vers Milan et Turin, et arriva enfin à Paris. Assez froidement accueilli par les académiciens de la Capitale, il se vit obligé d'accepter un modeste emploi pour subvenir à ses besoins. Mais l'excès de travail joint au dépit consuma ses forces, et il s'éteignit le 6 avril 1829, à Froland où séjournaient ses parents. On s'aperçut seulement alors de la perte que venait d'éprouver l'Humanité. Dans toute l'Europe savante une douloureuse émotion s'empara bientôt des moins prévenus. L'Institut de France décerna à sa vieille mère la moitié du grand prix des Sciences mathématiques, et le Gouvernement

norvégien décida la publication de ses œuvres. Rien n'a manqué à la gloire du géomètre après sa mort ; mais tout a manqué à son bonheur pendant sa vie<sup>1</sup>.

Ses principales études se rapportent aux équations algébriques et aux fonctions elliptiques dont il aperçut la double périodicité. Dans le premier ordre d'idées son mémoire *Sur une classe d'équations résolubles algébriquement* est un modèle d'élégance. Il y démontre entre autres résultats que si toutes les racines d'une équation sont liées entre elles par un rapport rationnel, il sera possible de les déterminer algébriquement.

Pour exposer ce qu'on lui doit dans le second genre, remontons un peu en arrière.

Lorsqu'on eut trouvé le Calcul intégral, on jugea d'abord facile de ramener aux fonctions algébriques et circulaires l'intégration des fonctions différentielles d'une seule variable ; mais on se heurta vite à des expressions simples qu'on ne put intégrer et auxquelles conduisaient la rectification des sections coniques, d'où le nom d'*intégrales elliptiques* donné à ces fonctions transcendantes nouvelles qu'on s'efforça de réduire à leur forme la plus simple.

Au commencement du XVIII<sup>e</sup> siècle, l'Italien FAGNANI ouvrit une voie nouvelle en arrivant à une intégrale particulière de l'équation différentielle servant à la division de l'arc de la lemniscate. Euler fit faire un pas de plus à la question, en découvrant l'intégrale générale d'une équation différentielle du premier ordre dont chaque membre est une transcendante elliptique complète. Lagrange la retrouva par une méthode plus élégante, et le géomètre anglais LANDEN, en 1755, formula un théorème remarquable au moyen duquel il montra que chaque arc de l'hyperbole est immédiatement rec-

---

(1) LIBRI. Art. *Abel* dans la *Biographie universelle ancienne et moderne* (nouvelle édition, t. I. Paris, 1843).

tifiable par deux arcs d'une ellipse. Puis Legendre composa son grand traité contenant divers perfectionnements importants; enfin Abel, en 1827, dans une série de mémoires classiques fournit, pour le développement et la multiplication des transcendentes elliptiques, d'élégantes expressions correspondant à celles en usage pour les fonctions circulaires. Il déduisit toute sa théorie du théorème fondamental connu aujourd'hui sous son nom et communiqué à l'Académie des Sciences de Paris en 1825, mais publié seulement en 1841.

Pendant qu'Abel poursuivait ses profondes recherches, un mathématicien allemand, CARL GUSTAV JACOBI, travaillait de son côté dans la même direction. Cet algébriste naquit à Postdam en 1804. Après avoir terminé ses études à l'Université de Berlin où il obtint le grade de docteur en philosophie (1825), il devint professeur de mathématiques à Königsberg, puis voyagea pendant plusieurs années, visitant Gauss à Göttingue, Legendre et Poisson à Paris. En 1842 il résida en Italie pour rétablir sa santé ébranlée puis retourna peu de temps après à Berlin. Le gouvernement prussien lui servit alors une pension jusqu'à sa mort (18 février 1851). Ses premiers travaux roulent sur la valeur des intégrales définies et les équations aux différentielles partielles, mais les plus célèbres se rapportent aux fonctions elliptiques. Epars dans divers mémoires, ils sont condensés dans ses *Fundamenta nova Theoriæ functionum ellipticarum* imprimés en 1829. Ils paraissent avoir été établis indépendamment de ceux d'Abel; en tous cas il a inventé les notations qui nous servent actuellement.

Deux de ses compatriotes GÖPEL et GEORG ROSENHAIN s'occupèrent également des fonctions abéliennes et des fonctions-theta dont le dernier établit la théorie. L'illustre doyen de nos géomètres, CHARLES HERMITE, les introduisit dans l'enseignement supérieur. Né à Dieuze (Meurthe) le 25 décembre 1822, ce savant entra à l'École Polytechnique en 1843, mais n'en sortit dans aucun ser-

vice public afin de pouvoir plus librement se consacrer à la Mathématique. Ses succès furent d'ailleurs assez grands pour qu'en 1856 l'Académie des Sciences l'appelât dans son sein et qu'en 1869 on le nommât professeur d'Algèbre supérieure à la Sorbonne. Il sut, par une sagace application des fonctions elliptiques à la théorie des nombres, déduire de nombreuses propositions arithmétiques. Ses études de la transformation, sa résolution de l'équation du cinquième degré, sa démonstration de la nature de la fonction modulaire, premier type de toute une classe de transcendentes nouvelles, et tant d'autres recherches qu'il nous est impossible même de citer, l'ont placé au premier rang des mathématiciens de notre temps.

Les fonctions elliptiques furent envisagées au point de vue géométrique par BERNHARD RIEMANN, né à Breselenz (Hanovre) en 1826. Après des études théologiques à Göttingue, il apprit les Mathématiques avec Gauss, Jacobi et Eisenstein, puis la Physique sous Weber. En 1851, il obtint le grade de docteur et remplaça Dirichlet dans sa chaire (1859). Peu après il alla demander à l'Italie le rétablissement de sa santé chancelante, mais le climat de Sélasca ne put le guérir et il décéda le 20 juillet 1866. Ses découvertes scientifiques remontent aux environs de l'année 1857 et se rapportent à la théorie des fonctions algébriques d'une seule variable. Un mémoire de PUISEUX sur ce sujet avait transformé l'Analyse en lui donnant de nouvelles bases. Précisant la notion de fonction si obscure jusque-là, ce savant marcha sur les traces de Cauchy. En examinant la succession des valeurs imaginaires, les chemins décrits simultanément par la variable et les racines d'une équation, il aperçut dans leurs grandes lignes leur nature analytique. Il dévoila le rôle des points critiques et les circonstances de l'échange des valeurs initiales des racines quand la variable revient à son point de départ en décrivant un contour fermé ; puis il pour-

suivit les conséquences de ces résultats relativement aux intégrales de différentielles algébriques, ce qui l'amena à trouver l'origine de la périodicité des fonctions circulaires, elliptiques et transcendantes à plusieurs variables.

Vinrent ensuite les travaux de Riemann, « accueillis par une admiration unanime, comme l'événement le plus considérable de notre temps <sup>1</sup> ». Ils reposent sur une idée féconde, celle des surfaces désignées aujourd'hui sous son nom. Elles sont formées de plans superposés, en nombre égal au degré d'une équation algébrique et reliés par des lignes de passage qu'on obtient en joignant d'une certaine façon les points critiques. Des développements qu'il en tira découle une représentation géométrique devenue entre ses mains et celles de ses successeurs un instrument si puissant.

En énonçant son fameux théorème, Abel avait fait une découverte de premier ordre. Il avait montré qu'une somme d'intégrales à limites arbitraires, de la même fonction algébrique, se représente par un nombre fixe d'intégrales identiques auxquelles s'ajoute une quantité algébrique et logarithmique. Riemann, en voyant que ce nombre est le genre de la fonction, compléta l'œuvre de son devancier dont la proposition simplifiée revêtit alors sa forme définitive. D'autre part, le profond analyste introduisit la considération féconde de *classes de courbes algébriques* <sup>2</sup> : deux courbes appartiennent à la même classe si elles se correspondent point par point, voulant dire par là que les coordonnées d'un point quelconque de la première s'expriment rationnellement en fonction des coordonnées d'un point de la seconde, et réciproquement.

KARL WEIERSTRASS considéra les fonctions elliptiques à un point de vue purement analytique. Son œuvre se

---

(1) APPELL et GOURSAT. *Théorie des fonctions algébriques*. Préface de CH. HERMITE. Paris, 1895.

(2) PICARD. *Sur la théorie des surfaces algébriques*, dans la *Revue générale des Sciences pures et appliquées*, t. V. Paris, 1894.

distingue donc bien de celle de Riemann. C'est à Ostfeld, en Westphalie, que ce sagace géomètre vit le jour, le 31 octobre 1815. A sa sortie du gymnase de Paderborn, il ne se livra pas tout d'abord aux Mathématiques, il étudia le droit à l'Université de Bonn, et n'aborda la Science qu'à 23 ans<sup>1</sup>. Puis, en 1841, il subit son examen d'aptitude au professorat. ce qui lui valut les modestes fonctions d'instituteur à Deutsch-Krone (Prusse Rhénane) où pour développer ses remarquables facultés il devait enseigner l'écriture et la gymnastique à ses élèves. Ce temps d'épreuve se termina en 1848. A cette époque, il obtint une chaire au lycée de Braunsberg, et la publication de ses premiers mémoires remonte à son séjour dans cette cité qu'il ne quitta qu'en 1856 pour occuper une chaire à l'Institut industriel de Berlin puis à l'Université de cette ville quelques mois après. L'année suivante, il était élu membre de l'Académie. Enfin, en 1873, ses collègues le nommèrent recteur magnifique, fonctions qu'il conserva jusqu'à sa mort (19 février 1897). Tous les corps savants du monde se l'étaient associé depuis longtemps.

La partie maîtresse de ses recherches est l'établissement d'une théorie générale et définitive des fonctions analytiques. Il montra qu'une fonction entière peut être décomposée en un produit d'un nombre généralement infini de facteurs primaires, chacun de ceux-ci étant le produit d'un facteur linéaire par une exponentielle d'une certaine forme. Cette méthode le conduisit à l'importante notion du *prolongement analytique*, considération qui joua par la suite un grand rôle dans les travaux de FÉLIX KLEIN (actuellement professeur à Göttingue) sur les fonctions modulaires. En représentant les fonctions par les séries, Weierstrass remarqua le premier que certaines séries, ordonnées suivant les puissances crois-

---

(1) *Revue des questions scientifiques*. Art. de M. D'OCAGNE, 2<sup>e</sup> série, t. XII. Bruxelles, 1897.



Fig. 31. — Portrait de KARL WEIERSTRASS (1815-1897).  
(D'après la planche du tome VII des *Acta Mathematica*, Stockholm.)



santes d'une variable ne peuvent être prolongées au delà de leur cercle de convergence, et il fut amené à fournir l'exemple d'une fonction continue d'une variable  $x$  n'ayant pas de dérivée. Les ouvrages d'Halphen, de Picard, et le traité plus récent d'Appell et Goursat (1895), en réunissant toutes ces découvertes en corps de doctrine, ont beaucoup contribué à leur diffusion.

La théorie des fonctions abéliennes attira aussi l'illustre professeur berlinois. L'inversion des intégrales hyperelliptiques avait été formulée par Jacobi, et étudiée par Göpel et Rosenhain dans le cas où le polygone sous le radical est du cinquième ou du sixième degré. Par une méthode toute différente, Weierstrass étendit le problème aux intégrales hyperelliptiques de degré quelconque.

Comme nous l'avons dit plus haut, dans ses recherches sur les fonctions algébriques et leurs intégrales, son point de départ fut différent de celui de Riemann. Il parvint à la notion du genre d'une courbe sans quitter le domaine de l'Algèbre, en recherchant le nombre minimum des infinis arbitraires qu'une fonction rationnelle des coordonnées d'un point variable de la courbe est susceptible d'avoir. Du reste, les tendances d'esprit de ces deux grands analystes s'accusent nettement dans ces travaux en quelque sorte parallèles. Weierstrass déduit tout de transformations de calcul qui permettent de parvenir de façon assurée au but cherché. Dans son exposition il paraît se garder des vues d'ensemble, tandis que Riemann se complait dans les méthodes intuitives qui éclairent d'un jour nouveau le sujet, quitte à négliger certains détails. Weierstrass s'est encore attaqué à bien d'autres questions. Son grand souci de la rigueur l'a conduit à élucider les principes qui servent de base à l'Analyse, de manière à les mettre à l'abri du doute. Enfin la théorie des surfaces minima lui est redevable d'importants perfectionnements qu'a augmentés encore, dans un des plus remarquables chapitres

de ses *Leçons de géométrie infinitésimale*, le doyen actuel de la Faculté des sciences de Paris, DARBOUX.

Parmi les plus brillants élèves du mathématicien allemand, citons : MITTAG-LEFFLER, de Stockholm, qui dirige le recueil si estimé des *Acta mathematica*, et s'occupa de généraliser bien des points de la théorie des fonctions; SCHWARZ, qui développa aussi la doctrine des surfaces minima et publia un intéressant travail sur les séries hypergéométriques, et enfin la mathématicienne russe SOPHIE KOVALEWSKI, gracieuse figure sur laquelle nous nous arrêterons quelques moments.

Cette femme remarquable naquit à Moscou en 1850 et non en 1853 comme la plupart de ses biographes l'ont imprimé par erreur<sup>(1)</sup>. Elle poursuivit ses études scientifiques d'abord à Heidelberg ensuite à Berlin où elle sut conquérir l'estime et l'amitié de Weierstrass. Elle resta sous sa direction pendant quatre années consécutives, et en 1874 l'Université de Göttingue lui décerna sans examen le grade de docteur en Philosophie, sur la production de deux thèses, dont celle *Sur la théorie des équations aux différences partielles* a une grande valeur. Puis, tout en continuant ses recherches d'analyse, elle fut nommée en 1884, grâce à l'appui de Mittag-Leffler, professeur à l'École supérieure de Stockholm où son enseignement obtint un vif succès. Peu après elle remporta le prix Bordin (1888), une des plus hautes distinctions accordées par l'Académie des Sciences de Paris, avec le sujet suivant : « Perfectionner en un point important la théorie du mouvement d'un corps solide. » On lui décerna solennellement cette récompense dont la valeur fut doublée en raison du service extraordinaire rendu à la Physique mathématique. Elle avait découvert un cas nouveau dans lequel les équations différentielles d'un corps pesant, mobile

---

(1) *Souvenirs d'enfance de SOPHIE KOVALEWSKY, écrits par elle-même, et suivis de sa biographie par M<sup>me</sup> A.-CH. LEFFLER, duchesse de Cajanello*. Paris, 1895.



Fig. 32. — Portrait de SOPHIE KOVALEWSKY (1850-1890).  
(D'après une phototypie suédoise.)



autour d'un point fixe, peuvent s'intégrer. Ce fut une de ses dernières productions. Éluë en 1890 correspondante de l'Académie de Saint-Petersbourg, cette savante dont le talent en pleine maturité donnait tant d'espérances, s'éteignit le 10 février de la même année. Sa mort éveilla bien des sympathies, et de tous les coins du monde civilisé, depuis la Société Royale de Londres jusqu'à l'école primaire de Tiflis, des télégrammes de condoléances parvinrent au recteur de l'Université de Stockholm. Ses funérailles furent royales, des monceaux de fleurs ornèrent son tombeau, les journaux mathématiques lui consacrèrent des articles nécrologiques émus, et les femmes russes décidèrent d'élever à celle qui avait si bien honoré leur sexe, un monument dans la ville même où elle avait enseigné.

## ALGÈBRE ET MÉCANIQUE

Après avoir constitué ce qu'on dénomme aujourd'hui l'Algèbre supérieure, les mathématiciens de notre siècle se sont attachés à envisager sous tous leurs aspects les principes fondamentaux, et surtout ils ont créé la théorie des équations.

W. ROWAN HAMILTON fut un de ceux qui se distinguèrent le plus dans ce domaine. Né à Dublin le 4 août 1805, sa première éducation se fit dans sa famille, et il entra seulement en 1824 au Trinity College, un an après avoir publié son premier mémoire qui roule sur une question d'Optique et fut très remarqué. Aussi dès 1827 il devenait professeur d'Astronomie dans sa ville natale, bien qu'il ne possédât aucun grade universitaire.

Dans sa *Théorie des systèmes de rayons* il prédisait le phénomène de la réfraction conique, et les années suivantes il publia de nombreux mémoires sur l'équation du 5<sup>e</sup> degré, sur la courbe dite « hodographe », sur la solution numérique des équations différentielles, etc.

Mais surtout il énonça, en 1835, le principe des *quaternions* ou calcul s'appliquant aux figures géométriques de l'espace. Il compléta et développa par la suite cette théorie, pratiquée avec succès en Angleterre mais peu connue en France malgré la remarquable *Introduction à l'étude des quaternions* qu'a publiée, en 1881, LAISANT, examinateur à l'École Polytechnique. Le calcul géométrique était né d'ailleurs avant l'habile astronome de Dublin. Le Genevois ROBERT ARGAND, dans son *Essai sur une manière de représenter les quantités imaginaires* (1806), avait indiqué le moyen d'exprimer graphiquement des nombres de la forme  $A + B\sqrt{-1}$ . MÖBIUS, professeur à Leipzig, dans son *Calcul barycentrique* (1827), basé comme son nom l'indique sur les propriétés du centre de gravité, ouvrit une nouvelle route et l'Italien BELLAVITIS, en imaginant la conception des *Equipollences*, traduisit les faits géométriques du plan.

Mais peu après la découverte d'Hamilton, HERMANN GRASSMANN inventa une méthode puissante établissant, en somme, le lien entre les précédentes.

Ce mathématicien naquit à Stettin en 1809. Il commença son éducation au gymnase de sa ville natale, puis il apprit durant plusieurs années la théologie à Berlin, sans négliger toutefois les études scientifiques. Aussi, en 1834, succéda-t-il à Steiner comme professeur de Mathématiques à l'École industrielle de Berlin où il enseigna à la fois l'Astronomie, la Physique et le dogme. Vers cette époque il produisit des travaux originaux, et en 1844 publia son fameux ouvrage *Lineale Ausdehnungslehre*, dont la forme ardue d'exposition retarda longtemps la diffusion. Le but de cette « Science extensive » a été de constituer une théorie des fondements abstraits de l'étude des grandeurs sans recourir à la Géométrie, simple application de son système à l'espace. Ses propositions ont d'ailleurs une portée des plus générales. Procédé de calcul géométrique à la fois synthétique

et analytique, sa méthode est devenue féconde en permettant la résolution aisée de bien des problèmes complexes se rapportant aux diverses branches des mathématiques où entre la considération de l'étendue.

En Italie, tout récemment, le professeur PEANO a fourni une interprétation géométrique concrète des formes et des opérations comprises dans l'ouvrage de Grassmann. Partant de l'idée commune de tétraèdre, il définit le produit de 2 et de 3 points puis les produits de ces éléments par des nombres, et enfin les sommes de ces produits. La théorie des formes du premier ordre fournit les calculs barycentrique et vectoriel. Les formes du deuxième ordre représentent les droites, les orientations et les systèmes de forces appliquées à un corps solide; les formes du troisième ordre expriment les plans et le plan à l'infini. Enfin, en 1897, BURALI FORTI de Turin a présenté très simplement dans son *Introduction à la Géométrie différentielle*, les éléments essentiels de la doctrine de Grassmann.

D'un autre côté, MAURICE D'OCAGNE, professeur à l'Ecole des Ponts-et-Chaussées, dans son *Traité de Nomographie* (1899) s'est efforcé d'établir une théorie de la représentation graphique des équations à un nombre quelconque de variables. Les principes de la dualité et de l'homographie, en passant ici dans le domaine de la pratique, lui ont permis de fixer les dispositions d'abaques préférables pour les types de formules habituelles. De la sorte, il a pu réduire les longs calculs d'ingénieurs à de simples lectures sur des tableaux graphiques, construits une fois pour toutes.

Dans un domaine quelque peu différent, AUGUSTE DE MORGAN se signala tout particulièrement. Fils d'un colonel de l'armée anglaise<sup>1</sup>, il naquit à Madura (Inde) en 1806, fit ses études à Cambridge, devint par la suite professeur à l'Université de Londres,

---

(1) *The Open Court* (New-York), numéro de décembre 1898.

et prit une part active à la fondation de la Société mathématique de cette ville. Ses plus importants travaux roulent sur les principes fondamentaux de l'algèbre. Il s'attaqua dans sa *Formal Logic* à analyser méthodiquement les lois, les opérations et les symboles des Mathématiques. Sa maxime favorite était la suivante : « Les mathématiciens ne prennent pas plus soin de la Logique, que les logiciens des Mathématiques ; cependant les deux yeux de toute Science exacte sont les Mathématiques et la Logique ; la secte mathématique dédaigne l'œil logique, la secte logique ne regarde pas avec l'œil mathématique, chacune croyant voir mieux avec un œil qu'avec deux. » De Morgan, lui, s'efforça de se servir des « deux yeux », et ses travaux philosophiques resteront. Son enseignement a laissé d'ailleurs une trace profonde dans les recherches de ses successeurs, les Cayley, les Benjamin Peirce et les Sylvester, pour ne citer que quelques-uns de ses compatriotes.

Avec ÉVARISTE GALOIS l'Algèbre s'enrichit d'inventions remarquables. Ce génial mathématicien naquit à Bourg-la-Reine, près de Paris, le 25 octobre 1811. Après avoir travaillé dans sa famille, il entra au lycée Louis-le-Grand (1823), et dès la fin de 1827 son aptitude spéciale se révéla : il lisait avec avidité Lagrange et Legendre. Bientôt il remporta un prix au Concours général, se présenta à l'École Polytechnique (1828), mais se vit refusé deux ans de suite à ce concours. Cependant son professeur avait su l'apprécier. Il commentait en classe les solutions originales trouvées par son élève, qui pendant l'année même de son échec publia dans le journal de Gergonne <sup>1</sup> sa *Démonstration d'un théorème sur les fractions continues périodiques* (1829), et communiqua à l'Académie des Sciences

---

(1) Les *Annales de Mathématiques*, premier journal français consacré exclusivement aux mathématiques, se publièrent à Nîmes, sous la direction de Gergonne, de 1811 à 1833. La collection de ce recueil est très estimée, car elle renferme d'importants mémoires.



Fig. 33. — Portrait d'ÉVARISTE GALOIS (1811-1832.)  
(D'après l'héliogravure placée en tête de ses *Œuvres*, 1897.)



une de ses plus belles découvertes sur la théorie des équations. Il n'avait pas dix-huit ans ! Sur ces entrefaites, il perdit son père et fut reçu à l'école Normale en 1829. Durant l'hiver suivant, son activité mathématique ne se démentit pas, et il écrivit plusieurs mémoires importants ; mais en juillet 1830 la révolution éclatait. Alors le jeune Galois se jeta avec ardeur dans la mêlée politique, fut renvoyé de l'École, devint, malgré son jeune âge, un orateur influent du parti républicain avancé, et fut même poursuivi pour un toast régicide <sup>1</sup>. Acquitté cependant, il fut arrêté à nouveau un mois plus tard, passa quelque temps à Sainte-Pélagie où il se remit au travail. Mais à peine sorti de prison, il fut tué en duel à la suite d'une intrigue d'amour, le 30 mai 1832. Sa vie si courte, semée de tant d'épreuves, ne fut cependant pas perdue pour la Science. Les notes qu'il avait laissées furent d'abord publiées par Liouville, en 1846, puis rééditées en 1897, par la Société mathématique de France.

Si Lagrange, Gauss et Abel avaient perfectionné la théorie des équations, aucun n'avait trouvé l'élément primordial de celles-ci. Galois sut le découvrir. Il montra qu'à toute équation algébrique correspond un groupe de substitutions où viennent, pour ainsi dire, se réfléchir son image, ses caractères essentiels. Cauchy avait poursuivi de multiples recherches sur la théorie des groupes, et introduit divers éléments de classification. Galois poussa plus loin l'analyse du problème. Il saisit l'importance de la notion de sous-groupe invariant d'un groupe donné, ce qui l'amena à partager les groupes en simples et en composés.

Ses travaux en Analyse ne le cèdent en rien aux précédents. Dans une *lettre* à un de ses amis, Chevallier,

---

(1) M. DUPUY, dans les *Annales de l'Ecole Normale supérieure*, 3<sup>e</sup> série, t. XIII (1896), a consacré une attachante notice biographique à Galois. C'est à ce travail, composé d'après des documents inédits, que nous avons emprunté les renseignements qui précèdent.

sorte de testament scientifique écrit la veille de sa mort, on rencontre les vues les plus curieuses sur les intégrales de fonctions algébriques. En particulier, il paraît avoir possédé les parties essentielles de la théorie des intégrales abéliennes qu'il était réservé à Riemann d'apercevoir un quart de siècle plus tard. Si quelques années lui avaient été accordées pour mûrir ses idées, il aurait sans doute posé les fondements de la théorie des fonctions algébriques dont nous ont doté ses continuateurs. En tout cas, on ne peut s'empêcher d'une douloureuse émotion en songeant qu'une vie si courte et si agitée a permis d'édifier une telle œuvre.

« Sa mort fut pour la Science une perte immense ; l'influence de Galois, s'il eût vécu, aurait grandement modifié l'orientation des recherches mathématiques... il a sans doute des égaux parmi les mathématiciens de ce siècle ; aucun ne le surpasse par l'originalité et la profondeur de ses conceptions<sup>1</sup>. » Parmi ses successeurs, que le cadre de notre livre nous force de sacrifier quelque peu, distinguons : CAYLEY qui formula les principes de la théorie des invariants ; STURM, Genevois naturalisé Français, qui succéda à Poisson dans sa chaire de Mécanique à la Faculté des Sciences de Paris, et dont le théorème, permettant de décider combien il existe de racines réelles d'une équation algébrique comprises entre deux limites données, est bien connu ; enfin HENRI POINCARÉ que nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises et dont les mémoires de haute analyse ont trait principalement à la théorie des fonctions et à leur application aux équations différentielles. Né à Nancy le 29 avril 1854, membre de l'Académie des Sciences de Paris depuis 1887, il professe actuellement à la Sorbonne. C'est là l'origine de son remarquable *Cours de Physique mathématique* (1885-1896).

---

(1) *Œuvres mathématiques* D'ÉVARISTE GALOIS. Paris, 1897. Introduction par ÉMILE PICARD.

Signalons encore parmi les nombreuses applications de l'algèbre à cette dernière branche de la science, la *Théorie analytique de la chaleur* par FOURIER, qui parut en 1822 et qui est un modèle du genre. Avec une grande pénétration ce savant inventait des ressources inconnues pour résoudre ces difficiles questions. Il prit comme point de départ ce principe : le flux différentiel de calorique entre deux molécules infiniment voisines est proportionnel à la différence infiniment petite des températures de ces deux particules. Il parvint à trouver les équations différentielles des phénomènes thermiques et plusieurs théorèmes au moyen desquels on peut remonter de celles-ci aux intégrales et par le fait arriver jusqu'aux applications numériques. Il jeta aussi un jour nouveau sur la théorie des équations aux différentielles partielles en découvrant la série connue sous son nom et qui permet de développer une fonction continue ou discontinue en une suite infinie de termes composés des sinus et des cosinus des multiples de la variable.

Dans la même voie, GEORGES GREEN, qui mourut à Cambridge en 1841, rendit de grands services en introduisant dans l'étude mathématique de l'électricité, la *fonction potentielle* utilisée déjà par Lagrange et Laplace au sujet de l'attraction universelle. Plus près de nous, CLERK MAXWELL, né à Edimbourg le 13 juin 1831, créa une théorie électro-magnétique complète basée sur l'intervention du milieu ambiant, en traduisant en langage algébrique les résultats expérimentaux découverts par Faraday. Son hypothèse peut se résumer ainsi : tout milieu capable de transmettre la force magnétique est formé d'une infinité de particules sphériques susceptibles de tourner. Sous l'influence de la force magnétique ces corpuscules prennent, autour des lignes de force comme axe, un mouvement de rotation dont le sens et la vitesse dépendent du sens et de l'intensité de la

force. Grâce à ce principe et à quelques transformations analytiques il parvint, dans son *Traité d'électricité et de magnétisme* (1873), non seulement à expliquer tous les phénomènes connus, mais à déduire de nouvelles relations intéressantes entre la lumière et l'électricité. Maxwell, après avoir professé à Aberdeen et au King's Collège de Londres, termina sa carrière comme professeur à l'Université de Cambridge où il décéda le 5 novembre 1879.

Parmi les ouvrages les plus connus exposant l'ensemble de la Science physico-mathématique on peut mentionner, outre ceux cités plus haut, celui de RESAL, mort à Annemasse (Haute-Savoie) le 22 août 1896. Enfin BOUSSINESQ, le savant professeur de Mécanique à la Faculté des Sciences de Paris, a singulièrement fait progresser l'*Hydrodynamique mathématique* à laquelle il a su appliquer avec sagacité l'analyse et l'algèbre.

#### GÉOMÉTRIE EUCLIDIENNE ET GÉOMÉTRIES NON EUCLIDIENNES

Toutes les branches des Mathématiques ont reçu de l'impulsion dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. La science d'Euclide ne fit pas exception à cette règle. Le *Traité des propriétés projectives des figures* de PONCELET ouvrit des routes nouvelles à la Géométrie pure en agrandissant ses ressources, en généralisant les conceptions et en les rapprochant de celles de la Géométrie analytique. Il offrit des moyens propres à déceler d'une façon aisée les propriétés dont jouissent les figures quand on les envisage d'une manière abstraite et indépendamment d'aucune grandeur absolue et déterminée. Ces propriétés se retrouvent à la fois dans toutes les projections ou perspectives de la figure considérée. On les a alors distinguées des autres en les désignant sous le nom générique de « propriétés projectives » destiné à en rappeler la nature.

Les deux volumes qui forment l'ouvrage parurent l'un en 1822, l'autre en 1866 ; mais le savant mit à jour pendant cet intervalle les découvertes les plus importantes qu'il y expose. Elles ont contribué puissamment à fonder la Géométrie moderne, si différente de la Science antique. La marche de celle-ci est timide ; toujours, dans les démonstrations, on raisonne sur des grandeurs déterminées, des figures réellement décrites. Celle-là, plus hardie et plus subtile, ignore le plus souvent les formes individuelles représentant les objets sensibles, ou, en tout cas, s'en dégage autant que possible.

Le *Traité* de Poncelet renferme outre l'exposition de ces principes, les notions élémentaires des pôles et polaires réciproques, une théorie de la perspective des reliefs ou bas-reliefs, et les principales propriétés des centres de moyennes harmoniques. Il fut aussi pour son auteur l'origine d'une polémique avec CHASLES. Ce dernier ayant fait paraître en 1837 un Mémoire sur deux principes généraux de la Science, la *dualité* et l'*homographie*, Poncelet revendiqua le premier comme lui appartenant.

Michel CHASLES était né à Epernon (Eure-et-Loir) le 15 novembre 1793 et fut reçu à l'École Polytechnique en 1812, puis à sa sortie donna sa démission pour aller exercer à Chartres la profession d'agent de change, sans cesser de se livrer aux spéculations scientifiques. Ses découvertes lui valurent bientôt d'être élu correspondant de l'Académie (1839) et professeur à la Sorbonne deux ans plus tard. Il mourut à Paris le 18 décembre 1880. Dans ses belles recherches il s'efforça d'affranchir la Géométrie des procédés de calcul que les Descartes, les Newton et les Leibniz avaient introduits et qui, en quelque sorte, avaient mis la Science de l'étendue sous la tutelle du calcul. A la base de ce monument, Chasles posa la notion du rapport anharmonique. Ce fut l'origine de ses belles théories de l'homographie et de l'homologie et il puisa, dans un mode de transformation particulier ou à un point correspond une

droite, à une droite un point, sa féconde doctrine de la dualité. Grâce à lui, l'idée de transformations des figures<sup>1</sup> prit dès lors une place considérable dans la nouvelle Géométrie. On vit nettement les analogies existantes entre les transformations de figures et celles d'équations. Comme, d'autre part, on peut imaginer des transformations en nombre infini, cette méthode devint entre les mains des géomètres un puissant mode d'investigation.

Plus près de nous, les notions établies par Poncelet ont été généralisées. Avec la *Géométrie synthétique* de STEINER (1867), avec les *Eléments de Géométrie projective* de LUIGI CREMONA, l'érudit professeur de l'Université de Rome et avec la *Geometria projectiva* du mathématicien espagnol TORROJA (1893), ils ont fini par former une science particulière dont les conquêtes s'augmentent chaque jour.

Le dernier quart de ce siècle a vu s'édifier d'intéressantes théories. En 1873, M. EMILE LEMOINE publia un mémoire relatif à un point remarquable du plan d'un triangle. On avait trouvé de nombreuses propriétés de ce point, mais sans faire attention qu'elles s'appliquaient toutes à ce dernier, dénommé aujourd'hui « point de Lemoine ». Plusieurs savants, entre autres H. BROCARD, en France, et NEUBERG, en Belgique, dirigèrent alors leurs recherches dans cette voie et la *Géométrie du triangle* se fonda. Depuis cette époque, des centaines de travaux ont paru sur ce sujet dans les divers journaux mathématiques du monde.

On doit encore à Lemoine l'invention de la *Géométrie*-

---

(1) Voici en quoi consiste cette série d'opérations, connues des Grecs, mais utilisée seulement par Chasles et ses successeurs. On déduit d'une figure  $F$  grâce à des constructions nettement définies, une nouvelle figure  $F'$ ; et réciproquement, on pourra revenir de la figure  $F'$  à la figure  $F$ . Si donc une propriété est facile à découvrir dans la figure  $F'$  il s'ensuivra qu'on possédera par le fait même la propriété correspondante de la figure  $F$ , souvent très pénible à trouver directement. Voir LAISANT. *La Mathématique*. Paris, 1898.

graphie (1893) ou art des constructions géométriques, ébauché déjà par Steiner. Il montra que toute construction quelle que soit sa complication est toujours réductible à un petit nombre de constructions faciles et identiques. Au moyen d'une hypothèse naturelle permettant de comparer entre elles ces constructions élémentaires de même nature, il arriva à un système de notation commode où deux nombres, le coefficient de simplicité et le coefficient d'exactitude, permettent d'analyser et de caractériser une construction géométrique quelconque.

D'autre part, SCHÖENFLIES, professeur à l'Université de Göttingue, dans sa *Géométrie du mouvement*, et le colonel MANNHEIM dans sa *Géométrie cinématique* (1894) ont tiré de la Mécanique rationnelle de nouvelles méthodes pour la détermination des propriétés des figures.

Mais sans contredit les recherches les plus originales de cette période se rattachent aux *Géométries non euclidiennes*, et c'est par elles que nous terminerons cet exposé bien incomplet de la Science contemporaine.

Depuis longtemps, on a cherché à démontrer le fameux axiome posé il y a vingt siècles par Euclide, à savoir : par un point on ne peut mener qu'une parallèle à une droite donnée.

Ces tentatives demeurèrent infructueuses. Cependant, à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, un jésuite italien, Saccheri, voulut fonder une Géométrie reposant sur un principe différent du célèbre postulat; enfin, au début du XIX<sup>e</sup>, un russe, Lobatschevsky, et un hongrois, Jean Bolyai, aperçurent à peu près en même temps l'impossibilité de cette démonstration. Leurs travaux publiés indépendamment les uns des autres avaient sans doute été inspirés par les doctrines du philosophe Kant qui, dans un passage de sa *Critique de la raison pure*, indiquait une nouvelle considération de l'espace. Pour ce dernier, l'espace existait *a priori*, précédant

toute expérience, comme forme complètement subjective de notre intuition.

NICOLAS LOBATCHEVSKY était né en 1793 à Makarief, dans la province de Nijni-Novgorod, et fit ses études à l'Université de Kazan qu'on venait de fonder. Il y suivit les cours de Bartels, puis obtint, en 1811, le titre de licencié, avec une thèse de Mécanique céleste. Dès lors il s'absorba dans de profondes méditations <sup>1</sup>. A l'hypothèse de Kant, il en opposa une autre affirmant la relativité de nos notions d'espace. Sa façon de procéder est simple : il préfère aux méditations métaphysiques la vérité scientifique qui repose sur l'expérience. « Les premières données, dit-il dans ses *Nouveaux Principes de Géométrie* (1836-38), seront incontestablement les concepts que nous acquérons dans la nature au moyen de nos sens ; la raison peut et doit les réduire au plus petit nombre possible, pour qu'elles servent ensuite de base solide à la science. » Cela posé, voici comment il procède au développement de sa doctrine.

Il énonce au début l'axiome suivant : par un point on peut mener *plusieurs parallèles* à une droite donnée. Puis, tout en conservant les autres axiomes primordiaux de la Géométrie ancienne, il en tire une série de conclusions qui, s'enchaînant d'une façon logique et sans aucune contradiction, constituent la Géométrie *non-euclidienne*.

Naturellement, ces théorèmes diffèrent de ceux auxquels nous sommes habitués. Citons-en deux exemples :

La somme des angles d'un triangle est toujours plus petite que deux droits, et la différence entre cette somme et deux droits varie proportionnellement à la surface du triangle.

La construction d'une figure semblable à une figure

---

(1) VASSILIEF. *Eloge historique de Nicolas-J.-Lobatchevsky*, traduit du russe par M<sup>lle</sup> FICHTENHOLTZ, Paris, librairie Hermann, 1896. Consulter également un remarquable article de H. POINCARÉ dans la *Revue générale des Sciences*, t. II. Paris, 1891.



Fig. 34.

Portrait de NICOLAS LOBACHEVSKY, mort à Kazan (Russie) en 1856.  
(D'après une photographie.)



donnée, mais de dimensions différentes, est impossible.

Ces curieuses vues mirent du temps à se répandre, et le savant russe n'eut pas la satisfaction d'assister à leur triomphe. Sa carrière s'était pourtant poursuivie avec honneur. Il était devenu professeur, et quand il mourut en 1856 il occupait les fonctions de recteur de l'Université où il était entré comme simple étudiant. Quatre ans plus tard Hoüel publia une traduction française de son ouvrage sur *la Théorie des parallèles*, et dès lors ces idées pénétrèrent un peu partout. En France, en Allemagne, en Angleterre et en Italie, on vit éclore de nombreux travaux dans le champ qu'il venait de défricher. Lobatchevsky pas plus que Bolyai n'avaient, en effet, épuisé le sujet, et RIEMANN, en 1867, ouvrit de nouveaux horizons en considérant l'espace comme sphérique. Dans cette hypothèse l'espace est sans limites, puisqu'en continuant à marcher toujours droit devant soi on n'est jamais arrêté; et cependant il est fini, car on peut faire également le tour d'une sphère.

Pour construire cette Géométrie, son inventeur rejette le postulatum et le premier axiome d'Euclide : deux points déterminent une droite. Si effectivement on ne peut, en général, tracer entre deux joints qu'un grand cercle (jouant ici le rôle de la droite), il y a une exception au cas où les deux points sont aux extrémités diamétralement opposées; une infinité de grands cercles peuvent y passer. D'une façon analogue, dans la Géométrie de RIEMANN, il se trouvera certains cas où par deux points, passeront une infinité de droites. Les propositions qu'elle renferme sont différentes bien entendu, et de la Géométrie de Lobatchevsky et de celle d'Euclide.

Prenons les deux exemples correspondant à ceux de tout à l'heure : ils deviennent ceux-ci dans la doctrine de Riemann.

La somme des angles d'un triangle est *plus grande* que deux droits.

Le nombre des droites qu'on peut tracer parallèle-

ment à une droite donnée par un point fixe est égal à *zéro*.

D'autre part EUGENIO BELTRAMI, professeur à l'Université de Rome, ramena dans une suite de mémorables travaux la Géométrie de Lobatchevsky à deux dimensions, à n'être plus qu'une branche de la Géométrie ordinaire, à l'aide des considérations ci-après. Supposons qu'une figure quelconque soit tracée sur une toile flexible et inextensible appliquée sur une surface de manière que quand la toile se déforme les différentes lignes de cette figure changent d'aspect, leur longueur restant la même. La flexibilité et l'inextensibilité empêcheront en général cette figure de se déplacer sans quitter la surface, à moins qu'on n'ait affaire aux *surfaces à courbure constante*. Mais celles-ci sont de deux espèces : les unes sont à *courbure positive*, et se déforment de cette manière en s'appliquant sur une sphère (Géométrie de Riemann); les autres sont à *courbure négative*, et Beltrami a montré que la Géométrie de ces surfaces n'étaient ni plus ni moins que celle de Lobatchevsky.

En outre un mathématicien suédois SOPHUS LIE<sup>1</sup>, enlevé malheureusement à la Science le 18 février 1899, en cherchant à réduire au minimum le nombre des axiomes dont on se sert implicitement dans les démonstrations habituelles, est arrivé, en posant simplement les prémisses suivantes — l'espace a  $n$  dimensions; le mouvement d'une figure invariable est possible; pour déterminer la position de cette figure dans l'espace il faut  $P$  conditions; — Lie est parvenu, dis-je, à la curieuse proposition suivante : le nombre des géométries compatibles avec ces prémisses est limité.

Enfin, et cette remarque clora notre livre, quelques astronomes ont été amenés à se demander si « l'espace

---

(1) S. DICKSTEIN. *Wiadomosci Matematyczne*, t. III, fasc. 3-4. Varsovie, 1899.

physique de notre expérience » est celui de Lobatchevsky, et si nos télescopes permettaient de résoudre le problème. Peirce conclut par l'affirmative en se basant sur de délicates observations des parallaxes d'étoiles fixes. En admettant comme acquis ce dernier résultat, il ne s'ensuivrait nullement qu'une *seule* de ces géométries serait exacte. La question ainsi posée n'a aucun sens. Comme l'a dit Poincaré, une Géométrie ne saurait être plus *vraie* qu'une autre : elle est seulement plus ou moins *commode*. La Science fondée par Euclide, il y a deux mille ans, n'a donc rien à redouter de l'avenir. Simple, et en parfaite harmonie avec les propriétés des corps solides qui nous, environnent nous n'aurions aucun intérêt à l'abandonner.

---



# INDEX

## NOMS CITÉS ET MATIÈRES TRAITÉES<sup>1</sup>

- Abacus* ou *Abaque*, 1, 67, 68, 79, 82, 231.  
 Abd-al-Gehl, 77.  
 Abel, 217-19, 235.  
 Abélard (1079-1142.), 88.  
*Abéliennes (fonctions)*, 219, 235.  
 Aboul-Wéfa, 76.  
*Académie des sciences de Berlin* 173, 187.  
*Académie des sciences de Paris* 128, 184, 226.  
*Acta Eruditorum*, 145, 157, 158.  
 Adalbolde, 80.  
 Agnesi (Maria) (1718-1799), 181.  
*Agrimenseurs romains*, 63.  
 Ahmes, 5, 59.  
 Ailly (P.) (xiv<sup>e</sup> siècle), 85.  
 Al Batani, 75, 76, 93, 102.  
 Albert-le-Grand (1193-1280), 88.  
 Alcuin (735-804), 78.  
 Alembert (d'), 178-79, 188, 210.  
 Alexandre d'Aphrodisie, 21.  
*Alexandrie (école d')*, 22, 42, 52.  
*Algèbre* : Egypte, 4 ; Diophante, 59-61 ; Hindous, 70-72 ; Arabe, 74, 75 ; Moyen âge, 78, 88 ; Renaissance, 94, 97-99. Viète, 105-7 ; période contemporaine, 111, 142, 160, 177, 194, 229-38.  
*Algorithme*, 83.  
 Alhazen, 76.  
 Alkwarizmi, 73-74.  
 Allman (né le 28 septembre 1824), 20.  
*Almageste de Ptolémée*, 55-56.  
*Analyse*, 18, 174, 190, 225.  
*Analytique*. V. *Géométrie*.  
 Anatolius, 52, 56.  
 Anaxagoras, 10.  
 Anaximandre, 10.  
 Anaximène, 10.  
*Annales de mathématiques*, 232.  
 Anthemius, 52, 62.  
 Antiphon, 18.  
*Apices de Boèce*, 66-67.  
 Apollonius, 39, 62.  
 — (*Problème d'*), 40.  
 Appell (né en 1855), 221, 225.  
*Arabes (chiffres et notation)*, 67, 71-72, 83, 84.  
*Arabes (mathématiciens)*, 73-77.  
 Arago (François), 190.

<sup>1</sup> Les chiffres entre parenthèse sont les dates de naissance et de mort des savants cités. Les autres renvoient aux pages du livre. Nous avons seulement indiqué dans la table les dates qui ne figurent pas dans le corps de l'ouvrage. Quant à celles insérées au cours de notre Histoire nous avons jugé inutile de les répéter ici. D'autre part, les noms des sujets traités ont été imprimés en italique, afin de les distinguer aisément de ceux des personnes.

- Aratus, 47.  
 Arbogast (1759-1803), 182.  
 Archimède, 29, 31-38, 68, 100.  
 Archytas de Tarente, 13.  
 Argand (1768-?), 230.  
 Argyrus, 89.  
 Aristote (384 av. J.-C. -322), 20.  
*Arithmétique* : chinoise, 1 ; égyptienne, 7 ; grecque, 7, 13 ; école de Platon, 17, 21 ; pythagoricienne, 54, 55, 66 ; hindoue, 69 ; moyen âge, 63, 78 ; Renaissance, 93 ; période contemporaine, 154, 184, 188, 205, 207-12.  
*Arithmétique (machine)*, 132, 157.  
*Arithmétique (triangle)*, 122, 133.  
*Arpentage*, 1, 63, 80, 164, 165-167.  
 Aryabhata, 69.  
 Arzachel, 82.  
*Astronomie* : orientale, 3-4 ; grecque, 29, 46, 55-57 ; hindoue, 69-72 ; arabe, 74, 77, 82 ; moyen âge, 81, 89 ; Newton, 142-50  
     V. *Mécanique céleste*.  
 Athelard de Bath, 30, 82.  
*Athènes (école d')*, 17-21.  
*Axiomes de géométrie*, 23, 241.  
 Bachet de Méziriac (1581-1638), 188.  
 Baillet, 5.  
 Bailly (1736-1793), 189.  
 Ball (Walter W. Rouse Ball) (né le 14 août 1850), 15, 20, 46, 94, 142, 210.  
 Barlaam, 90.  
 Barrow (1630-1677), 126, 142.  
 Bartels, 242.  
*Barycentrique (calcul)*, 230, 231.  
 Bassani, 24.  
 Beaumont (Elie de), 205.  
 Beaune (de, 1601-1652), 116, 121.  
 Bède le Vénérable (675-735), 68.  
 Bellavitis (1803-1880), 230.  
 Beltrami, 246.  
 Benedetti (J.-B.), 96.  
 Berkeley (1684-1753), 160.  
 Berlinus, 80.  
 Bernoulli (famille des), 161.  
 Bernoulli (Jacques), 40, 161, 163.  
     — (Jean), 162, 163, 176.  
     — (Nicolas), 161, 172.  
 Bertrand (Joseph) (né le 11 mars 1822), 113, 142, 179.  
 Beyer (Hartmann J.), 111.  
 Bezout (F.) (1730-1783), 181.  
 Bhaskara (V. 1150), 77.  
 Billy (de), 107.  
 Bion (Nicolas), 164-65, 167.  
 Boèce, 30, 54, 64-68.  
 Bolyai (1775-1856), 241, 245.  
 Bombelli (Raph.), 99.  
 Bossut (1730-1814), 44, 132, 190.  
 Boussinesq (né le 13 mars 1842), 238.  
 Bovelles (Ch. de) (1470-1553), 134.  
 Boyer (Jacques), 161, 181, 199.  
 Boyle (1626-1691), 157.  
*Brachistochrone*, 163.  
 Brahmagupta (né vers 598), 70.  
 Brennand, 72.  
 Bretschneider, 13.  
 Brianchon (1783-1864), 135, 199.  
 Briggs (1556-1630), 114.  
 Brocard (Henri), 45, 162, 240.  
 Brouncker (1620 ?-1684), 141.  
 Bryson d'Héraclée, 18.  
 Buffon (1707-1788), 31.  
 Burali-Forti, 231.  
 Burgi, 111.  
 Buteon, 99.  
 Cajori (Florian) (né le 28 février 1859), 3, 161, 188, 197, 210.  
*Calcul*. V. Barycentrique, différentiel, exponentiel, infinitésimal, intégral.  
*Calculer (machine à)*. V. *Arithmétique (machine)*.  
*Calendrier*, 81.  
 Cantor (Moritz) (né le 28 août 1829), 5, 15, 59, 66, 210.  
 Capella, 64.  
*Capillarité (théorie de la)*, 168.  
 Cardan (Jérôme), 98.  
 Carnot (Lazare), 190, 196-99. —  
*Carrés magiques*, 90-91.  
*Cascade*, 160-61.

- Cassiodore, 63.  
 Castro (Hugues de), 85.  
 Catelan (abbé de), 160.  
 Cauchy (Augustin), 211, 212-17, 220.  
*Caustiques*, 161.  
 Cavalieri (1598-1647), 114, 122, 136.  
 Cayley (né le 16 août 1821), 236.  
*Cercle* (V. *Quadrature du*).  
*Chainette*, 162.  
*Chaleur* (théorie mécanique de la), 237.  
 Chasles (Michel), 58, 66, 135, 163, 199, 239-40.  
 Châtelet (marquise du), 146, 151.  
*Chiffres*, 2, 67, 88, 111.  
 Cicéron, 31.  
*Cissoïde*, 45, 166.  
 Clairaut (Alexis, 1713-1765), 177.  
 Colen (van), 99.  
 Comberousse (C. de), 24.  
*Conchoïde*, 45.  
 Condorcet (1743-1794), 176, 182, 187.  
*Congruences*, 208, 211.  
*Coniques (sections)*: grecs, 19, 29, 39, 42; hindous, 76; arabes, 77; période moderne, 131, 132, 134-38.  
 Conon, 30, 35.  
*Continuité (principe de la)*, 216.  
*Coordonnées*, 116, 117.  
 Copernic (1473-1543), 47, 55, 112.  
*Cosécante*, 76, 102, 113.  
*Cosinus*, 76, 102.  
 Cossali (1748-1815), 59.  
*Cotangente*, 76, 102.  
 Cotes (Roger) (1682-1716), 170.  
*Courbes*: 10, 13; théorie des, 46, 119, 177, 221; V. *Coniques (sections)*.  
 Cousin (Jacques), 181.  
 Cousinery (1787-?), 197.  
 Cramer (Gabriel), 177.  
 Cremona (Luigi), 221.  
 Crelle (1780-1855), 217.  
*Crible d'Eratosthène*, 43.  
 Cridhara, 71.  
 Crouzet, 197.  
*Cube (duplication du)*, 13, 45.  
*Cubique* V. *Équations*.  
*Cubique d'Agnesi*, 181.  
 Cusa (Nicolas de) (mort en 1464), 93, 134.  
*Cycloïde*, 134, 138.  
*Cyzique (école de)*, 17-20.  
 Darboux (Jean-Gaston) (né le 14 août 1842), 226.  
*Décimale (numération)*, 3.  
*Décimales (fractions)*, 107, 111.  
 Dedekind (né en 1831), 212.  
 Delambre (1749-1822), 46, 203.  
 Democrite, 10.  
 Desargues (1593-1662), 58, 134-37.  
 Descartes, 115-121, 127.  
*Descriptive*. V. *Géométrie*.  
*Déterminants*, 181, 217.  
*Développée*, 41, 139.  
*Différentiel (calcul)*, 122, 157, 166, 174, 181.  
*Différentielles (équations)*, 179, 226.  
 Dinostrate, 19, 57.  
 Diocles, 45.  
 Dionysidore, 48.  
 Diophante, 52, 58-61, 95.  
 Dirichlet (1805-1859), 210-11.  
 Dosithée, 30.  
*Dualité (principe de)*, 231, 239.  
 Dupuy, 235.  
*Dynamique*, 146, 179, 189.  
 Eisenlohr, 4.  
 Eisenstein (1823-1852), 211.  
*Éléments d'Euclide*, 14, 19, 23-30.  
*Ellipse*, 20. V. *Coniques (Sections)*.  
*Elliptiques (fonctions)*, 166, 205, 219, 220.  
*Elliptiques (intégrales)*, 208.  
*Emission (théorie de l')*, 153.  
 Eneström (Gustaf) (né le 5 septembre 1852), 210.  
*Engrenages*, 132.  
*Epicycloïdes*, 138, 166.  
*Equations*: résolution des, 94, 220; théorie des, 94, 154, 161, 181, 218, 229, 235. V. *Algèbre*.

- Equations numériques*, 187.  
*Equipollences*, 230.  
 Eratosthène, 43, 44.  
 Euclide, 19, 28-30, 76, 241, 247.  
 Eudème, 21.  
 Eudoxe, 14, 23, 25.  
 Euler, 172-77, 183.  
*Eulériennes (intégrales)*, 174.  
 Eutocius, 52, 62.  
*Exhaustion (Méthode d')*, 19, 122.  
*Exponentiel (calcul)*, 162.  
*Exposants*, 60, 105, 141, 153.  
 Ezra (Abraham ben), 82.  
  
 Fagnano (1682-1766), 166, 218.  
 Faraday, 237.  
 Fermat (P. de), 59, 125-127, 184.  
 Ferrari, 99.  
 Ferro (Scipion) (mort en 1626), 97.  
 Fibonacci (V. Léonard de Pise),  
 Fichtenholtz (M<sup>lle</sup>), 242.  
 Finé (Oronce) (mort en 1555), 96,  
 100.  
 Fiore, 97.  
*Fluxions (calcul des)*, 142, 149,  
 153, 171.  
*Fonctions : théorie*, 189, 218, 222.  
     *V. abélienne, hyperelliptique,*  
     *potentiel.*  
 Fontenelle (1657-1757), 142.  
 Foucault (1819-1868), 139.  
 Fourier (1768-1830), 237.  
 Fourrey, 91.  
*Fractions*, 5, 107, 111, 188, 232.  
 Francon de Liège, 80.  
 Fresnel (Aug.) (1788-1827), 139,  
 206, 216.  
 Fuss, 176.  
  
 Galilée, 112, 138.  
 Galois (Evariste), 232-36.  
 Gauss, 207-10.  
 Geber-ibn-Aphla, 82.  
 Geminus, 45, 49.  
*Géodésie*, 47, 50, 74, 99, 111.  
*Géométrie : antiquité orientale*, 1,  
     4; grecque, 9, 17, 21, 23, 49, 58;  
     romaine, 63; hindoue, 69-72;  
     arabe, 76; moyen âge, 79; mo-  
     derne, 175, 177, 190, 217, 238-  
     41.  
*Géométrie analytique*, 115, 119,  
     121, 153, 175.  
*Géométrie cinématique*, 241.  
*Géométrie descriptive*, 190-97.  
*Géométrie différentielle*, 231.  
*Géométrie du triangle*, 240.  
*Géométrie euclidienne*, 23-30, 238-  
     41.  
*Géométries non-euclidiennes*, 241-  
     47.  
*Géométrie perspective*, 197.  
*Géométrographie*, 240-41.  
 Gérard de Crémone, 83.  
 Gerbert ou Sylvestre II, 78-80.  
 Gergonne, 214.  
 Göpel, (1812-1847), 219.  
 Gouraud, 133, 204.  
 Goursat, 221, 225.  
 Grassmann (Hermann) (1809-  
     1877), 230-31.  
*Gravitation universelle (théorie de*  
*la)*, 134, 150.  
 Green (1793-1841), 237.  
 Grynæus, 30.  
 Guldin (Paul) (1577-1643), 57, 125.  
 Gunther, 114.  
  
 Hachette (1769-1834), 197.  
 Hadamard, 211.  
 Halley (1656-1742), 42.  
 Halphen (1844-1889), 225.  
 Hamilton (1805-1865), 229.  
 Harriot (Th.) (1560-1621), 111.  
 Heiberg (né le 27 novembre 1854),  
     30.  
 Heilbronner, 64.  
*Hélice*, 35.  
 Henrion, 112.  
 Henry (Charles) (né en 1856), 93.  
 Hériser, 80.  
 Hermite, 219, 221.  
 Hermotime de Colophon, 25.  
 Héron d'Alexandrie, 47.  
*Hexagramme mystique*, 132.  
 Hipparque, 44, 46.  
 Hippias d'Elée, 19.  
*Hodographe*, 211.

- Hippocrates, 14, 23, 24.  
 Hoefcr (F.) (1811-1878), 37, 75, 138, 187.  
*Homographie*, 231, 239.  
 Honcin-ben-Ishak, 30.  
 Hôpital (M<sup>is</sup> de l'), 160.  
 Huygens (Christian), 138, 140, 149.  
 Hypatia, 52, 61.  
*Hydrodynamique*, 187, 238.  
*Hyperbole*, 20, 42, 110. V. *Coniques*.  
*Hyperelliptiques (fonctions)*, 225.  
 Hypsicles, 45.  
 Ibn-Younis, 76.  
*Imaginaires (quantités)*, 98, 169, 180, 230.  
*Incommensurables (grandeurs)*, 14, 19, 28.  
*Indéterminée (analyse)*, 61.  
*Indivisibles*, 122, 136.  
*Infini*, 14, 88.  
*Infinitésimale (analyse)*, 141-67, 198, 235.  
*Instruments de Mathématiques*, 164-167.  
*Intégral (calcul)*, 159, 162, 179, 181.  
*Intégrales elliptiques*, 218.  
*Interpolation*, 141.  
*Involution des six points*, 132.  
*Ionienne (école)*, 9-11.  
 Isidore de Séville (mort en 636), 68.  
*Isochrone (courbe)*, 162.  
*Isopérimétriques (figures)*, 46, 162, 174.  
 Jacobi, 210, 219.  
 Jamblique, 52, 56.  
 Jean d'Espagne, 83.  
 Jordan (Camille) (né le 5 janvier 1838), 212.  
*Jupiter (théorie de)*, 184, 203.  
 Kant, 241.  
 Kepler (1571-1630), 113.  
 Kirique, 80-81.  
 Klein (Félix) (né en 1849), 210, 222.  
 Kowalewski (Sophie), 226-29.  
 Kronecker (1823-1891), 212.  
 Kummer (1810-1893), 211.  
 Lacroix (1765-1843), 176.  
 Lagrange, 127, 163, 169, 183-90, 210, 232.  
 Lahire (Ph. de) (1640-1718), 45, 137.  
 Laisant (né le 1<sup>er</sup> novembre 1841), 24, 230, 240.  
 Lambert, 169, 180.  
 Landen (1719-1790), 172.  
 Laplace, 200-205, 210.  
 Lazzeri, 24.  
 Leffler (M<sup>me</sup>) 226.  
 Legendre, 204-205, 219, 232.  
 Leibniz, 127, 145, 154-60, 172.  
 Lejeune-Diriclet. V. *Diriclet*.  
 Lemoine (Emile), 240.  
 Léonard de Pise, 87, 105.  
 Libri, 95, 97, 126, 219.  
 Lie (Sophus), (1842-1899), 246.  
*Lieux géométriques*, 17.  
 Liouville (1803-1860), 235.  
 Lobatschewsky, 241-47.  
*Logarithmes*, 112, 113, 114.  
 Loria (Gino) (né le 19 mai 1862), 29, 181, 210.  
*Loxodromie*, 96.  
 Lulle (1235-1315), 88.  
*Lune (théorie de la)*, 178, 184, 203.  
*Lunule d'Hippocrates*, 16.  
*Machine*. V. *Arithmétique*.  
 Maclaurin (1698-1746), 170.  
*Magiques*. V. *Carrés*.  
 Mannheim, 241.  
*Marées (théorie des)*, 203.  
 Marie (Maximilien), 178, 184, 205, 215.  
 Maurolycus (1494-1575), 95.  
 Maxwell, 237.  
*Mécanique céleste*, 47, 53, 71, 143, 149, 175, 178, 200.  
*Mécanique rationnelle*, 20, 31, 33, 108, 121, 156, 159, 163, 172, 173, 188, 197, 206, 209.  
 Ménéchme, 19.  
 Menelaus, 53.

- Meré (chevalier de), 133.  
 Merrimann, 210.  
 Mersenne le P. (1588-1648), 116, 128, 139.  
 Metius (Adrien), 99.  
 Mittag-Leffler (né en 1846), 226.  
 Möbius (1790-1868), 230.  
 Mohammed-ben-Musa, 73.  
 Moivre (de), 169.  
 Monge, 130, 190-97.  
 Montmort (1678-1719), 167.  
 Morgan (A. de), 231-32.  
 Moschopoulos, 90-91.  
 Murris (Jean de) 89.  
 Musa ben Schaker, 74-75.  
 Mydorge (1585-1647), 116, 128, 136.  
  
 Napier, 109, 111-13.  
 Nasir-ed-din, 30.  
 Navier (1785-1836), 216.  
*Négatives (quantités)*, 105, 117.  
 Nemorarius, 86.  
 Nesselmann, 33, 59.  
 Neuberg, 240.  
 Newton, 56, 127, 135, 142-50.  
   — *Binôme*, 97, 133.  
   — *Lois*, 146-50.  
   — V. « *Principes* ».  
 Nicolas de Smyrne, 89.  
 Nicole (François) (1625-1695), 166.  
 Nicomache de Gêrasc, 52, 64.  
 Nicomède, 45.  
 Nieuwentyt, 161.  
*Nombres* : Egypte, 5; Babyloniens, 2; Grecs, 37, 54. V. *Chiffres*, *Notation*.  
*Nombres (théorie des)*, 49, 80-81, 126, 175, 184, 188, 205, 207-12. V. *Premiers*.  
*Non-euclidienne*. V. *Géométrie*.  
*Notation* : algèbre, 60, 111; analyse infinitésimale, 153-54, 159; arithmétique, 2, 7, 66; trigonométrie, 175.  
*Nomographie*, 231.  
 Nunez (Pedro) (1492-1577), 96.  
  
 Ocagne (Maurice d'), 222, 231.  
 Oenopides, 10.  
  
 Olbers (1758-1840), 209.  
*Ondulations (théorie des)*, 139.  
*Optique mathématique*, 29, 121, 139, 153, 174, 181, 216, 229.  
*Oscillation (centre d')*, 168.  
  
 Pachymère, 89.  
 Paccioli, 93-94.  
 Padmanabha, 71.  
 Palmos, 90.  
 Pappus, 44, 56-58, 68.  
*Papyrus d'Akkim*, 5, 7.  
*Papyrus mathématique de Rhind*, 4, 5.  
*Parabole*, 20, 35. V. *Coniques*.  
*Parallélogramme des forces*, 108.  
*Parallèles*, 14, 241-45.  
 Parent (Antoine) (1666-1716), 163.  
 Pascal, 58, 100, 127-134.  
 Peano, 231.  
 Peirce (Benjamin) (1809 - 1880), 247.  
*Pentagone étoilé*, 12.  
 Perseus, 45.  
*Perspective*, 29, 135, 197.  
 Pfaff (1795-1825), 208.  
 Pherecydes, 11.  
 Philolaus, 13.  
 Philopon, 52.  
*Physique mathématique*, 139, 163, 181, 206, 209, 226.  
*Pi* ( $\pi$ ), 4, 10, 34, 70, 99, 141, 180.  
 Piazzzi (1746-1825), 209.  
 Picard (C.-E.) (né le 24 juillet 1856), 221, 225, 236.  
 Planude, 89, 99.  
 Platon, 17-18.  
*Platon (école de)*, 17.  
 Platon de Tivoli, 83.  
 Plotin, 56.  
 Poincaré (Henri) (né le 19 avril 1854), 211, 236, 247.  
 Poinsot (1777-1859), 206.  
 Poisson (1781-1840), 206, 219.  
 Poncelet (1788-1867), 135, 199, 238-39.  
 Porphyre, 52, 56.  
*Potentiel*, 237.  
 Prætorius, 99.

- Premiers (nombres)*, 43, 211.  
 « *Principes* » de Newton, 138, 142-50.  
*Priscien*, 64.  
*Probabilités (calcul des)*, 127, 133, 162, 167, 169, 182, 204.  
*Problème de Pappus*, 57.  
     — *des trois corps*, 172, 175.  
*Proclus*, 15, 29, 30, 62.  
*Progression*, 5, 110.  
*Ptolémée*, 55-6.  
*Puiseux* (1820-1883), 220.  
*Purbach*, 35.  
*Pythagore*, 11, 23, 52.  
     — *Ecole de*, 11, 15.  
  
*Quadratrice*, 20, 57.  
*Quadrature du cercle*, 10, 18, 80, 137.  
*Quadrature des courbes*, 35, 137, 153.  
*Quaternions*, 212.  
  
*Ramus ou La Ramée* (1515-1572), 100.  
*Raoul de Laon*, 86.  
*Ratholt (Ehrard)*, 30.  
*Rebière*, 61.  
*Regiomontanus* (1436-1476), 59, 85, 92.  
*Resal (Henri)* (1828-1896), 238.  
*Rhind*. V. *Papyrus*.  
*Riccati (Jacques de)* (1676-1754), 166.  
     — *Giordano*, 166.  
     — *Vincenzo*, 166.  
*Riemann (Bernhard)*, 220-21, 245.  
     — *Surfaces de*, 221, 245-46.  
*Ritter (François)*, 106.  
*Roberval (Gilles Personnier de)* (1602-1675), 128, 136-37.  
*Rolle (Michel)* (1652-1719), 160.  
*Romain (Adrien)*, 42, 99.  
*Romains (mathématiciens)*, 63-68.  
*Rosenhain* (1816-1887), 219.  
*Rouché*, 24.  
*Roulette (problème de la)*. V. *Cycloïde*.  
  
*Saccheri*, 241.  
*Sacro-Bosco (Jean de)*, 83-85, 89.  
*Saint-Vincent (Grégoire de)* (1584), 137.  
*Saunderson*, 142, 147.  
*Schœnflies*, 241.  
*Schooten (van)* (mort en 1660), 138.  
*Schreiber de Carlsruhe*, 197.  
*Schwarz (né en 1845)*, 226.  
*Serenus*, 52.  
*Séries*, 141, 153, 168, 169, 182, 215. V. *Fourier*.  
*Servois* (1767-1847), 135, 199.  
*Sexagésimal (système)*, 3.  
*Signes (règle des)*, 61.  
*Similitude*, 25.  
*Simson (Robert)* (1687-1768), 42, 135.  
*Sinus*, 76, 102, 113.  
*Sluse (de)* (1622-1685), 122.  
*Smith (E.)*, 210.  
*Smith (Stephen)*, 211.  
*Société mathématique de Londres (fondation)*, 232.  
*Société Royale de Londres*, 157.  
*Sphérique*. V. *Trigonométrie*.  
*Spiriques*, 45-6.  
*Statique*, 108, 192, 118.  
*Steiner* (1796-1863), 230, 240, 241.  
*Stéréométrie ou coupe des pierres*, 135.  
*Stevin (Simon)*, 107, 108, 111.  
*Stewart (Mathieu)* (1717-1785), 171.  
*Stifel (Michel)* (1486-1567), 100, 112.  
*Sturm* (1803-1855), 236.  
*Surfaces (théorie des)*, 220-21, 25, 245.  
*Synthèse*, 18.  
  
*Tabit ben Korra* (836-901), 75.  
*Table de multiplication*, 12.  
*Tangentes*, 42, 76, 120, 177.  
*Tannery (Paul)* (né le 20 décembre 1843), 14, 20, 47, 52, 55, 90.  
*Tartaglia (Nicolo)* (1500?-1557), 97.

- Tautochrone (courbe)*, 138.  
 Taylor (1685-1731), 168-69.  
 Tchebycheff (né en 1821), 211.  
 Thalès de Milet, 9.  
 Theano, 11.  
 Théctète d'Athènes, 19.  
 Théodose de Tripoli, 48.  
 Théon d'Alexandrie, 47, 52.  
 Théon de Smyrne, 54.  
 Théophraste d'Erèse, 21.  
*Théorie des équations*. V. *Equations*.  
*Théorie des fonctions*. V. *Fonctions*.  
*Théorie de Jupiter*. V. *Jupiter*.  
     — *de la Lune*. V. *Lune*.  
     — *des nombres*. V. *Nombres*.  
 Theudiose de Magnésie, 25.  
 « *Timée* » de Platon 16.  
 Torroja, 222.  
*Triangle Arithmétique*. V. *Arithmétique*.  
*Trigonométrie*, 75, 105, 169.  
     — *rectiligne*, 93, 169.  
     — *sphérique*, 47, 76, 93, 102.  
*Trisection des angles*, 19, 75.  
 Tycho-Brahe (1546-1601), 112.  
 Ubaldi (Guido) (mort en 1607), 108.  
*Universités au moyen âge* : Bologne, 89; Cambridge, 89; Cordoue, 82; Grenade, 82; Oxford, 89; Paris, 82, 88; Prague, 89.  
 Vandermonde (1735-1796), 181, 217.  
 Varignon (1654-1722), 108, 163.  
 Vassilief, 242.  
 Victorius, 64.  
 Viète (François), 42, 99, 101-107.  
 Vinci (Léonard de), 91.  
 Vlacq, 114.  
 Wallis, 122, 141, 184.  
 Waring (Ed.) (1734-1798), 188.  
 Weierstrass, 221-25.  
 Werner, 112.  
 Whiston, 142.  
 Widmann (xv<sup>e</sup> siècle), 93.  
 Wœpcke, 72.  
 Xénophane, 11.  
 Young (1773-1829), 206.  
 Zénodore, 46.  
 Zéro, 68, 79, 86.
-

# TABLE DES FAC-SIMILÉS

## ET DES PORTRAITS

---

Fac-similé des <i>Acta Eruditorum</i> . . . . .	158
Instruments de mathématiques au xvii <sup>e</sup> siècle . . . . .	164-65
Instruments de mathématiques (construction et usage). Frontispice.	
Manuscrit de l' <i>Algorithmus</i> de JEAN DE SACRO-BOSCO. . . . .	84
— de l' <i>Ars Geometriæ</i> de BOËCE . . . . .	65
— des <i>Éléments</i> d'EUCLIDE. . . . .	27
Papyrus mathématique d' <i>Akhmim</i> . . . . .	7
Portrait de CARNOT. . . . .	195
— CAUCHY. . . . .	213
— DESCARTES . . . . .	117
— DU CHATELET (M <sup>me</sup> ). . . . .	151
— EULER . . . . .	173
— FERMAT. . . . .	123
— GALOIS. . . . .	233
— KOVALEWSKY (M <sup>me</sup> ) . . . . .	227
— LAGRANGE. . . . .	185
— LAPLACE . . . . .	201
— LEIBNIZ . . . . .	155
— LOBATCHEVSKY. . . . .	243
— MONGE. . . . .	191
— NAPIER. . . . .	109
— NEWTON. . . . .	143
— PASCAL. . . . .	129
— SAUNDERSON. . . . .	147
— VIÈTE . . . . .	103
— WEIERSTRASS . . . . .	223

---



## TABLE DES CHAPITRES

---

PRÉFACE. . . . .	IX
CHAPITRE PREMIER. — Les Mathématiques chez les anciens peuples de l'Orient. . . . .	1
CHAPITRE II. — Les Écoles Ionienne et Pythagoricienne. . . .	9
CHAPITRE III. — Les Écoles d'Athènes et de Cyzique : Platon, ses disciples et leurs contemporains . . . . .	17
CHAPITRE IV. — Fondation de l'École d'Alexandrie. Œuvres d'Euclide et d'Archimède. . . . .	22
CHAPITRE V. — Les travaux d'Apollonius et le développement des Mathématiques appliquées. . . . .	39
CHAPITRE VI. — Les Mathématiques en Égypte et en Grèce, du 1 <sup>er</sup> au 6 <sup>e</sup> siècle. Etablissement de la Trigonométrie sphé- rique et naissance de l'Algèbre . . . . .	52
CHAPITRE VII. — Les Mathématiques chez les Romains. . . .	63
CHAPITRE VIII. — Le développement des Mathématiques dans l'Inde. . . . .	69
CHAPITRE IX. — La Science arabe du ix <sup>e</sup> au xii <sup>e</sup> siècle. . . .	73
CHAPITRE X. — Les Mathématiques en Occident au moyen âge. Influence des Arabes. . . . .	78
CHAPITRE XI. — La fin du moyen âge et l'École Byzantine. . .	87
CHAPITRE XII. — Les précurseurs de la Mathématique moderne. .	92
CHAPITRE XIII. — Invention de l'Algèbre moderne par Viète et découverte des logarithmes par Napier. . . . .	101
CHAPITRE XIV. — La <i>Géométrie</i> de Descartes (1637). Les tra- vaux de Fermat et de Pascal. . . . .	115
CHAPITRE XV. — Découverte de l'Analyse infinitésimale par Newton et Leibniz. . . . .	

CHAPITRE XVI. — Les Mathématiciens anglais de la première moitié du XVIII <sup>e</sup> siècle et les recherches d'Euler . . . . .	168
CHAPITRE XVII. — Travaux de Lagrange. Invention de la <i>Géométrie descriptive</i> par Monge (1800). Œuvres de Laplace et de Legendre. . . . .	183
CHAPITRE XVIII. — Coup d'œil sur la Science contemporaine : Arithmétique supérieure. — Analyse et théorie des fonctions. — Algèbre et Mécanique. — Géométrie euclidienne et Géométries non euclidiennes . . . . .	207
INDEX. NOMS CITÉS ET MATIÈRES TRAITÉES. . . . .	249
TABLE DES FAC-SIMILÉS ET DES PORTRAITS. . . . .	257

**MAI 1901**

*Georges* **CARRÉ** *et* **C. NAUD**, *Éditeurs*

---

# Catalogue

DE LA

**Bibliothèque générale**  
**des Sciences**



**PARIS**

**3, rue Racine, 3**

# Avis

Envoi **franco** sur demande des Catalogues spéciaux détaillés par ordre de matières.

- I. Catalogue général.
- II. Catalogue des Livres de sciences (Mathématiques — Physique — Chimie).
- III. Catalogue des Livres de médecine et Sciences naturelles.
- IV. Catalogue technologique (Électricité — Agriculture — Industrie — Photographie).
- V. Catalogue de la Bibliothèque technologique.
- VI. Catalogue de la Collection Scientia.

MM. Georges CARRÉ et C. NAUD feront, pendant **un mois**, à toute personne qui leur en fera la demande, le **service gratuit** de leurs publications périodiques : *La Presse Médicale* et *l'Éclairage Électrique*.

---

*Tous les ouvrages annoncés sont expédiés franco aux prix marqués, en France et à l'Étranger, contre envoi d'un mandat postal, de timbres-poste ou d'une valeur à vue sur Paris. Pour les envois recommandés, envoyer 0 fr. 25, en plus, par ouvrage.*

**Expédition contre remboursement de toute commande non accompagnée du montant. —**  
*Pour l'étranger, les frais de remboursement restent à la charge du client.*

---

*IMPRESSION des ouvrages scientifiques à formules, THÈSES de médecine, de Sciences mathématiques, physiques et naturelles et de Géographie. Envoi de devis sur demande. Prix très modérés.*

(1 vol., 226 p., 50 fig.)  
Cartonnage toile anglaise.  
Prix : 5 francs.

Jacques BOYER

# *Histoire des Mathématiques*

Suivre à travers les âges, — depuis les anciens peuples de l'Orient jusqu'à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, — l'évolution des Mathématiques : tel est le but de cet ouvrage destiné principalement aux étudiants. L'auteur a voulu rester *très élémentaire*. Son récit n'est pas surchargé de formules ou d'équations. Tout luxe d'érudition a été banni de ce volume où les personnes, même peu versées dans la science des Euclide et des Newton, apprendront sans fatigue l'histoire des découvertes mathématiques les plus saillantes.

---

« L'enseignement des mathématiques est très répandu en France, mais l'étude de l'histoire des mathématiques n'existe pas. Que signifie alors l'habitude si fréquente de désigner un théorème par un nom propre, pas toujours celui de l'auteur, si on ne sait pas où et quand vivait ce mathématicien, quels sont ses travaux principaux, comment ses productions se relient aux connaissances antérieures ou à celles de ses contemporains ? Ces questions auraient intéressé bien des esprits, s'il avait été possible de les étudier dans un livre clair et bref. Aucune des histoires des mathématiques parues jusqu'à ce jour ne remplissait ce but. Cette lacune est heureusement comblée par l'ouvrage de M. Boyer dont la lecture est facile ; écrit avec élégance et précision, il fait connaître à la fois les mathématiciens et la mathématique. Imprimé avec goût, illustré d'un grand nombre de portraits, reproductions de documents authentiques, ce volume instruira en distrayant. Un index par noms cités et par matières traitées permet de trouver immédiatement le renseignement cherché. Nous conseillons vivement la lecture de ce livre à tous les élèves de mathématiques élémentaires et de mathématiques spéciales ; nous espérons qu'il sera mis dans les bibliothèques à l'usage des élèves et qu'il sera fréquemment donné comme récompense scolaire.

E. CHAILAN.  
(Polybiblion).

## TABLE DES CHAPITRES

---

### PRÉFACE.

- I. — Les mathématiques chez les anciens peuples de l'Orient.
- II. — Les écoles Ionienne et Pythagoricienne.
- III. — Les écoles d'Athènes et de Cyzique : Platon, ses disciples et leurs contemporains.
- IV. — Fondation de l'École d'Alexandrie. Œuvres d'Euclide et d'Archimède.
- V. — Les travaux d'Apollonius et le développement des mathématiques appliquées.
- VI. — Les mathématiques en Égypte et en Grèce, du premier au cinquième siècle. Établissement de la trigonométrie sphérique, et naissance de l'algèbre.
- VII. — Les mathématiques chez les Romains.
- VIII. — Le développement des mathématiques dans l'Inde,
- IX. — La science arabe du IX<sup>e</sup> au XII<sup>e</sup> siècle.
- X. — Les mathématiques en Occident au moyen âge. Influence des Arabes.
- XI. — La fin du moyen âge et l'école byzantine.
- XII. — Les précurseurs de la mathématique moderne.
- XIII. — Invention de l'algèbre moderne par Viète et découverte des logarithmes par Napier.
- XIV. — La « *Géométrie* » de Descartes (1637). Les travaux de Pascal et de Fermat.
- XV. — Découverte de l'analyse infinitésimale, par Newton et Leibnitz.
- XVI. — Les mathématiciens anglais de la première moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle, et les recherches d'Euler.
- XVII. — Travaux de Lagrange. Invention de la « *Géométrie descriptive* », par Monge. Œuvres de Laplace et de Legendre.
- XVIII. — Coup d'œil sur la science contemporaine : Arithmétique supérieure. Analyse et théorie des fonctions. — Algèbre. — Géométries euclidiennes et non euclidiennes.

INDEX. NOMS CITÉS ET MATIÈRES TRAITÉES.

(1 vol., 204 p., 48 fig., 10 pl.  
hors texte.)

Cartonnage toile anglaise.

PRIX : 5 francs.

H. BRILLIÉ

Ingénieur des Constructions navales.

# *Torpilles* *et Torpilleurs*

Les événements les plus importants survenus dans l'histoire de la marine au XIX<sup>e</sup> siècle sont l'adoption de la torpille comme engin de guerre et la création du torpilleur à grande vitesse. Le torpilleur, en permettant d'utiliser la torpille comme arme d'attaque, a profondément modifié les règles de la tactique navale ; s'il n'est pas appelé, comme le proclamaient, il y a quelque dix ans, ses partisans enthousiastes, à devenir le roi des mers, il n'en reste pas moins un adversaire redoutable avec lequel doivent compter les plus puissants cuirassés.

De l'apparition du torpilleur à grande vitesse date la révolution qui s'est opérée depuis vingt ans dans la construction des flottes européennes.

L'auteur de cet ouvrage s'occupe tout d'abord de la torpille et étudie cet engin dans ses divers emplois pour la défense des côtes et l'attaque des escadres. En second lieu, il aborde l'étude des torpilleurs et s'efforce de montrer les progrès réalisés depuis vingt-cinq ans dans la construction de leurs coques, de leurs machines et de leurs chaudières. Enfin il passe en revue les flottilles des torpilleurs des différentes puissances et le rôle que ces petits bâtiments sont appelés à jouer dans les guerres navales de l'avenir.

Ce n'est pas seulement à l'ingénieur et au marin que ce livre s'adresse ; tous ceux qui s'intéressent à l'évolution de notre marine, à ses progrès, liront ces pages avec un intérêt que les récentes modifications apportées au programme de nos divisions navales ne peuvent qu'accentuer.

(Revue du Cercle militaire).

## TABLE DES MATIÈRES

### PREMIÈRE PARTIE. — Torpilles.

CHAP. I. — HISTORIQUE : Premières mines sous-marines. — Fulton. — Défense des ports de la Baltique et de la mer Noire. — Guerre de Sécession. — Guerre du Brésil et du Paraguay. — Apparition de la torpille automobile et du torpilleur moderne. — Conflit anglo-péruvien. — Guerre gréco-turque. — Guerre du Tonkin. — La rivière Min. — Attaque de Shei-Poo. — Guerre du Chili. Perte du *Blanco Encalada*. — Révolution du Brésil. Perte de l'*Aquidaban*. — Guerre sino-japonaise.

CHAP. II. — LES MINES SOUS-MARINES : Puissance destructive de la torpille. — Substances explosibles, fulmicoton, amorces. — Classification des torpilles.

CHAP. III. — TORPILLES FIXES ET MOBILES : Torpilles fixes : torpilles dormantes ; torpilles vigilantes ; torpilles de barrage, chapelets de torpilles. — Torpilles mobiles : torpilles dérivantes ; torpilles portées ; torpilles lancées ; torpilles divergentes.

CHAP. IV. — TORPILLES AUTOMOBILES : Torpilles Whitehead : propulsion, direction, immersion, pointe percutante, mécanismes divers, inconvénients de la torpille Whitehead. — Tubes lance-torpilles. — Tubes des torpilleurs. — Tubes sous-marins. — Appareils de visée. — Torpille Howell. — Torpille Berdan.

CHAP. V. — TORPILLES DIRIGEABLES. — Torpilles Brennan. — Torpilles Patrick. — Torpilles Sims-Edison.

CHAP. VI. — VALEUR MILITAIRE DES DIFFÉRENTS TYPES DE TORPILLES.

### DEUXIÈME PARTIE. — Les Torpilleurs.

CHAP. I. — HISTORIQUE : Les premiers Torpilleurs. — Les Torpilleurs en France depuis 1874. — Torpilleurs de haute mer. — Les Torpilleurs à l'étranger. — Les Destroyers.

CHAP. II. — DESCRIPTION DES TORPILLEURS.

CHAP. III. — CONSTRUCTION : Emploi de l'acier. — Légèreté de la coque. — Emploi de l'aluminium. — Emploi d'aciers spéciaux. — Protection.

CHAP. IV. — CHOIX DES FORMES ET QUALITÉS NAUTIQUES : Choix des formes. — Qualités d'évolution. — Qualités nautiques.

CHAP. V. — GÉNÉRALITÉS SUR LES MACHINES ET CHAUDIÈRES DES TORPILLEURS : Dispositions générales. — Perfectionnements successifs apportés aux appareils moteurs et évaporatoires des Torpilleurs.

CHAP. VI. — CHAUDIÈRES DES TORPILLEURS : Chaudières tubulaires. — Chaudières multitubulaires : Chaudières du Temple, chaudières Normand, chaudières Yarrow, chaudières Thornycroft. — Fonctionnement des chaudières multitubulaires. — Avantages des chaudières multitubulaires. — Chauffage au pétrole. — Cendrier étanche système Yarrow.

CHAP. VII. — MACHINES DES TORPILLEURS : Machines des Torpilleurs Normand : Soupape de compression, réchauffeur d'eau d'alimentation, purgeurs automatiques. — Machines des Torpilleurs anglais. — Machines à quadruple expansion. — Rapidité d'allure. — Vibrations de coque. — Hélices.

CHAP. VIII. — VITESSE DES TORPILLEURS.

CHAP. IX. — TORPILLEURS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS : France. — Angleterre. — Italie. — Allemagne.

CHAP. X. — DÉFENSE CONTRE LES TORPILLEURS ET VALEUR MILITAIRE DES TORPILLEURS.

(1 vol., 182 p., 141 fig.)  
Cartonnage toile anglaise.  
PRIX : 5 francs.

**Paul BUSQUET**  
Médecin-major de 2<sup>e</sup> classe,  
Chef du Laboratoire de Bactériologie de l'hôpital  
militaire d'Alger,  
Lauréat de la Faculté de médecine de Lyon,  
Lauréat du Ministère de la guerre.

# *Les Êtres vivants*

## Organisation — Évolution

Les idées qui sont exposées dans cet ouvrage ont été énoncées, il y a plus de quinze ans, pour la première fois, par le savant professeur Kunstler. Accueillies tout d'abord avec indifférence, puis discutées vivement, elles ont enfin acquis droit de cité dans le vaste domaine de la philosophie scientifique et se trouvent aujourd'hui confirmées et soutenues par les travaux récents de M. Yves Delage, l'éminent professeur de la Sorbonne.

Dès 1882, à la conception spéciale de la « théorie cellulaire », toute puissante et acceptée universellement par les auteurs, Kunstler opposa des vues élargies et la compléta par la théorie de la sphérule, qui avait pour point de départ autre chose que de vagues conceptions hypothétiques et reposait sur de nombreux faits positifs d'observation.

Pour la première fois, la valeur morphologique de la cellule, en tant qu'individualité distincte primitive, était nettement contestée, et la théorie coloniale elle-même se trouvait ébranlée par les arguments puissants mis en avant. Soutenir que les cellules des animaux ne sont pas des éléments anatomiques à valeur primordiale fixe et immuable était une conception nouvelle.

Deux autres auteurs, Sedgwick et Whitman, tentèrent, eux aussi, d'émettre quelques objections contre la théorie cellulaire; l'indifférence générale leur répondit. Enfin, plus récemment, M. le Professeur Delage reprit ces théories et en fit le sujet d'une remarquable étude. En fournissant ainsi aux adversaires de la théorie cellulaire l'appoint précieux de son talent et l'autorité de sa situation officielle, le savant professeur de zoologie de la Sorbonne a contribué puissamment à vulgariser les idées que la trop grande modestie de Kunstler, et son peu d'empres-

sement à renouveler et à multiplier les publications sur ses conceptions théoriques, n'avaient pas assez fait connaître du grand public scientifique.

Les documents de l'auteur n'ont pas été seulement puisés à l'enseignement magistral de son maître, à ces leçons qui, s'adressant à un public plutôt inexpérimenté, sont forcément un peu abstraites et simplifiées à dessein; ils ont été, encore et surtout, recueillis dans ces conversations scientifiques d'une si agréable familiarité et d'un charme persuasif si puissant, dont une vie de laboratoire et de persévérantes habitudes de travail en commun fournissent chaque jour tant d'occasions.

---

## TABLE DES MATIÈRES

### INTRODUCTION.

CHAP. I. — Constitution générale de la matière vivante. Structure du protoplasma.

CHAP. II. — Constitution générale des êtres vivants. Différenciation et individualisation des cellules. Théorie cellulaire.

CHAP. III. — Différenciation et individualisation des êtres pluricellulaires. Théorie coloniale ou polyzoïque des êtres vivants.

CHAP. IV. — Principes généraux de la différenciation et de l'individualisation des êtres simples ou composés. Processus de la différenciation dans les cellules, les tissus, les organismes. Métamérie.

CHAP. V. — Démonstration de ces principes par l'examen des caractères tirés de la série animale : *Protozoaires, Mésozoaires, Hydraires, Échinodermes, Annelides, Turbellariés, Autres Vers, Ténias, Articulés, Vertébrés.*

CHAP. VI. — Démonstration de ces principes par l'examen de caractères tirés du développement ontogénique. Spécificité cellulaire.

CHAP. VII. — Évolution générale des êtres vivants. Transformisme.

CHAP. VIII. — Conclusions générales.

---

(1 vol., 164 p., avec fig., 1 pl.  
en chromolithographie.)  
Cartonnage toile anglaise.  
Prix : 5 francs.

R. COLSON  
Capitaine de génie,  
Répétiteur de Physique à l'École polytechnique.

# La Plaque photographique

## Propriétés, le visible, l'invisible

Après un coup d'œil général sur les propriétés de la couche sensible et sur le principe de sa préparation et de son emploi, l'auteur passe en revue dans les quatre premiers chapitres les influences chimique, lumineuse, calorifique, mécanique et électrique; on trouvera en particulier, dans les deux premiers qui contiennent la base de la photographie, une discussion approfondie sur la formation de l'image latente et l'opération du développement avec des considérations nouvelles sur le rôle de la matière organique, la gélatine.

Le chapitre v contient un exposé d'une clarté supérieure de la grande découverte du professeur Röntgen, les rayons X.

Dans le chapitre vi, l'auteur remet au jour les anciennes expériences de Niepce de Saint-Victor, relatives à l'emménagement de la lumière, qui ouvrent la voie sur un terrain immense, encore très peu exploré et bien propre à séduire les chercheurs; elles se rattachent directement à la photographie de l'invisible. Celle-ci, dans laquelle est comprise la photographie à travers des corps opaques, fait l'objet du chapitre xii, qui renferme les expériences exécutées récemment sur ce sujet.

L'auteur indique aussi certaines précautions à prendre dans la conservation et dans l'emploi des plaques.

Cet ouvrage sera utile à tous ceux qui s'occupent de photographie, en leur faisant connaître l'instrument qu'ils emploient, et à tous ceux qui s'intéressent aux nouvelles recherches, en leur fournissant, en même temps que des indications suggestives, des documents précis et mis au point.

Telle est la marche suivie par M. Colson dans son étude qu'il a voulu rendre, nous dit-il dans la préface, *intelligible à tous*. C'est en effet un volume de vulgarisation que *la plaque photographique*, mais quand un ouvrage de ce genre sort de la main d'un maître, il est de nature à intéresser non seulement les photographes amateurs, dont le nombre augmente chaque jour, et le grand public, mais aussi les spécialistes proprement dits et les savants.

(Le Cosmos).

## TABLE DES MATIÈRES

---

### PRÉFACE.

### CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

CHAP. I. — ACTIONS CHIMIQUES : *Développement* : Révélateurs. — Action de l'encre à sec. — Action du bichlorure de mercure à sec. — Théorie de l'image latente et du développement. — Réactions qui détruisent l'image latente. — Retardateurs. — Accélérateurs. — Influence de la température sur le développement. — Influence du temps sur l'image latente. — Renverseurs. — *Actions chimiques qui produisent une impression* : Image latente due à une énergie chimique. — Actions chimiques directes. — Sulfuration. — Vapeurs. — Action du zinc.

CHAP. II. — ACTIONS LUMINEUSES : *Nature de la lumière*. — *Action de la lumière* : Intensité et durée de pose. — Solarisation. — Influence des radiations de différentes couleurs. Orthochromatisme et isochromatisme. — Emploi des teintures. — Emploi d'un voile préalable. — Influence du renversement. — *Photographie des couleurs*. — *Phosphorescence et fluorescence* : Application à la photographie.

CHAP. III. — ACTIONS CALORIFIQUES ET MÉCANIQUES : Actions calorifiques. — Actions mécaniques.

CHAP. IV. — ACTIONS ÉLECTRIQUES : Forme chimique, électrolyse. — Forme lumineuse. — Forme calorifique. — Forme mécanique.

CHAP. V. — RAYONS RÖNTGEN : Rayons cathodiques. — Rayons Röntgen. — Mode opératoire. — Tubes. — Plaques. — Développement. — Durée de pose. — Application de la phosphorescence et de la fluorescence. — Résultats. — Applications. — Mode d'action sur le gélatino-bromure. — Hypothèses sur la nature des rayons Röntgen.

CHAP. VI. — EXPÉRIENCES DE NIEPCE DE SAINT-VICTOR SUR L'EMMAGASINEMENT DE LA LUMIÈRE : Considérations préliminaires. — Texte des expériences. — Discussion.

CHAP. VII. — PHOTOGRAPHIE DE L'INVISIBLE : *Photographie au travers des corps opaques* : Effet de la lumière du jour. — Expériences de M. Le Bon. — Précautions à prendre au sujet des vapeurs métalliques. — Effet de l'arc et de l'étincelle électriques. — Effet de la phosphorescence. — Radiations secondaires invisibles.

CHAP. VIII. — PRÉCAUTIONS À PRENDRE DANS LA CONSERVATION ET L'EMPLOI DES PLAQUES : Emballage des plaques. — Châssis. — Appareils. — Conservation des plaques impressionnées.

(1 vol., 284 p., 56 fig.)  
Cartonnage toile anglaise.  
PRIX : 5 francs.

J. DUGAST,  
Directeur de la Station agronomique  
et œnologique d'Alger.

# *Vinification*

## *dans les Pays chauds*

### Algérie et Tunisie

Depuis quelques années, des œnologues distingués ont publié, tant en France qu'à l'étranger, des traités de vinification très complets. À côté de ces ouvrages qui ont tous leur utilité, l'auteur a pensé qu'il y avait place pour un livre écrit spécialement pour la vinification en Algérie et en Tunisie. Il est nécessaire pour bien exposer cette partie de la science agronomique d'avoir soi-même fait des recherches de laboratoire. Il n'est pas moins utile d'avoir appris la pratique de la vinification dans le cellier. C'est parce que l'auteur a fait cette double expérience de la théorie et de la pratique qu'il s'est cru autorisé à entreprendre cette tâche.

Tout en tenant compte des travaux antérieurs, souvent cités, il a adopté un plan nouveau et s'est efforcé de faire une œuvre originale.

Quant aux conditions des fermentations dans les pays chauds, sur lesquelles l'auteur insiste particulièrement, elles sont appuyées sur les résultats des nombreuses expériences faites à la station agronomique dans cet ordre d'idées. Ce traité est un ouvrage complet, à la fois scientifique et pratique, mais sans détails inutiles, où le lecteur trouvera des faits et des opinions nettement exprimés.

Mais, avant tout, ce livre est écrit dans le but d'être utile aux viticulteurs.

## TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE. Étude du raisin.

CHAP. I. — DÉVELOPPEMENT ET ANATOMIE DU GRAIN DE RAISIN.

CHAP. II. — MATURATION. — Première période. — Deuxième période. — Troisième période.

CHAP. III. — VENDANGE. — Procédés physiques. — Mesure du sucre. — Procédés chimiques. — Mesure du sucre. — Mesure de l'acidité.

CHAP. IV. — COMPOSITION DES RAISINS MURS. — Raffe. — Peaux. — Pépins. — Moût. — Matériaux apportés à la cuve par 100 kilog. de vendange.

### Transformation du raisin en vin.

CHAP. V. — FERMENTATION ALCOOLIQUE. — Reproduction des levures. — Classification des levures. — Polymorphisme des levures. — Composition des levures. — Nutrition de la levure. — Aliments azotés. — Aliments hydrocarbonés. — Aliments minéraux. — CIRCONSTANCES QUI FAVORISENT OU ENTRAVENT LA FERMENTATION ALCOOLIQUE. — Influence des agents chimiques et physiques. — Quantité de levure. — Pression. — Concentration du moût. — Alcool. — Oxygène. — Acide carbonique. — Acidité. — Alcools sulfureux. — Produits d'excrétions. — Equation de la fermentation alcoolique. — Chaleur dégagée pendant la fermentation. — Purification des levures.

CHAP. VI. — AMÉLIORATION DE CERTAINES VENDANGES. — Manque d'acidité. — Acide tartrique. — Plâtrage. — Phosphatage. — Manque de sucre. — Levures cultivées.

CHAP. VII. — CELLIER. — Vases vinaires à fermentation. — Cuves. — Foudres et tonneaux.

CHAP. VIII. — VINIFICATION EN ROUGE. — Fouloir. — Egrappage. — Egrappoirs. — Cuvaïson. — Aération de la vendange. — Méthodes de cuvages. — Chapeau flottant. — Chapeau submergé. — Cuvage en deux temps. — Température des fermentations. — Influence de la température sur le travail des levures. — Influence de la température sur la constitution et la qualité des vins. — Influence de la température sur la tenue des vins. — Moyens pour atténuer les effets de la chaleur. — Réfrigération des moûts. — Emploi de la glace. — Réfrigérants. — Prise de la température des cuves. — Durée de la cuvaïson. — Décuvage.

CHAP. IX. — PRESSEIRS. — Épuisement des marcs fermentés par déplacement.

CHAP. X. — VINIFICATION EN BLANC. — Soufrage du moût. — Épuisement de la vendange par diffusion et déplacement. — Vinification en blanc des raisins rouges. — Vinification en blanc des raisins rouges basée sur les propriétés de l'oxydase.

CHAP. XI. — PROCÉDÉ DE VINIFICATION BASÉ SUR LA STÉRILISATION DU MOÛT PAR LA CHALEUR.

CHAP. XII. — VINIFICATIONS SPÉCIALES. — Vins rosés. — Vins de liqueurs. — Vins de liqueur naturels. — Mutage au soufre. — Vins de liqueur par maturation artificielle des raisins. — Vins de liqueur artificiels. — Mistelles. — Vins nouveaux. — Vins champagnisés. — Vins mousseux artificiels.

CHAP. XIII. — UTILISATION DES SOUS-PRODUITS DE L'INDUSTRIE VINICOLE. — Marcs. — Fabrication des piquettes. — Marcs de vins blancs. — Tartres. — Lies.

CHAP. XIV. — SOINS À DONNER AUX VINS. — Soutirage et outillage. — Conservation et vieillissement des vins.

CHAP. XV. — DÉFAUTS DES VINS. — Verdeur. — Amélioration des vins acides. — Vin plat. — Vin salé. — Vins sulfatés. — Vins sucrés. — Vin trouble. — Brunissement. — Goût de fût, de mois, etc.

CHAP. XVI. — MALADIES DES VINS. — Fleur du vin. — Ascescence. — Vinaigre de vin. — La pousse du vin. — La tourne. — La graisse. — L'amertume. — Mannite. — Casse.

CHAP. XVII. — TRAITEMENT DES VINS MALADES. — Chauffage. — Collage. — Filtrage. — Désinfection et assainissement des vases vinaires.

CHAP. — XVIII. — DÉTERMINATION DE LA VALEUR DES VINS. — Extrait sec. — Acidité totale.

(1 vol., 212 p., 10 fig.)  
Cartonnage toile anglaise.

PRIX : 5 francs.

J. Willard GIBBS  
Professeur au collège Yale, à New-Haven.

Traduit par

Henry LE CHATELIER  
Ingénieur en chef des Mines,  
Professeur au Collège de France.

# Équilibre des Systèmes chimiques

---

## EXTRAIT DE LA PRÉFACE DU TRADUCTEUR

L'œuvre thermodynamique du professeur J. Willard Gibbs comprend trois parties distinctes, qui ont fait l'objet de mémoires séparés, publiés successivement dans les transactions de l'Académie du Connecticut.

Représentation géométrique des propriétés thermodynamiques des corps (décembre 1873).

Équilibre des systèmes hétérogènes. 1<sup>re</sup> partie. — Phénomènes chimiques (juin 1876).

Équilibre des systèmes hétérogènes. 2<sup>e</sup> partie. — Capillarité et électricité (juillet 1878).

C'est le second de ces mémoires, de beaucoup le plus important des trois, dont on donne ici la traduction. Sa publication restera dans l'histoire de la chimie un événement capital. La découverte par H. Sainte-Claire-Deville de la dissociation, ou pour s'exprimer d'une façon plus précise, de la *réversibilité des phénomènes chimiques*, n'avait pas tout d'abord été appréciée à sa juste valeur par les chimistes qui avaient été beaucoup plus frappés de la limitation des réactions que de leur réversibilité. Les conséquences de cette réversibilité, et en particulier la possibilité d'appliquer à la chimie les principes de la thermodynamique, n'avaient pas été aperçus d'une façon précise. MM. Moutier et Peslin avaient seulement indiqué que les systèmes à tension fixe de dissociation devaient satisfaire à la formule de Clapeyron. C'est au professeur W. Gibbs que revient l'honneur d'avoir, par l'emploi systématique des méthodes thermodynamiques, créé une nouvelle branche de la science chimique dont l'importance, tous les jours croissante, devient aujourd'hui comparable à celle de la chimie pondérale créée par Lavoisier.

La portée des travaux du professeur W. Gibbs n'a pourtant pas été immédiatement reconnue; leur influence sur les progrès de la science n'a pas été tout d'abord ce qu'elle aurait dû être. Les chimistes se sont trop longtemps désintéressés d'idées qui leur étaient présentées sous une forme difficilement accessible. Bien peu d'entre eux étaient en état de comprendre une œuvre écrite par un mathématicien paraissant

ignorer les idées ou préjugés de ses lecteurs et dédaigner leurs préoccupations expérimentales. Des pages entières sont consacrées à l'étude de phénomènes dont la probabilité n'est qu'un infiniment petit, parfois même du 4<sup>e</sup> ordre, tandis que quelques lignes à peine sont consacrées à énoncer des lois nouvelles et d'une importance capitale s'appliquant à tous les phénomènes de la chimie; aussi ces lois ont-elles passé complètement inaperçues. Le savant professeur d'Amsterdam, Van der Waals, a découvert, dans l'œuvre de Gibbs, deux lois semblables et les a expliquées aux chimistes : la *loi des phases* et les règles relatives à l'*état critique* dans les mélanges. Il est inutile de rappeler l'importance des recherches expérimentales auxquelles ces deux lois ont conduit les savants hollandais. Mais la plupart des lois semblables n'ont été ainsi reconnues qu'après avoir été découvertes à nouveau d'une façon tout à fait indépendante. C'est ainsi que les lois de l'équilibre chimique énoncées par M. Van't Hoff et par moi ont été ensuite retrouvées par M. Mouret dans le mémoire de Gibbs. Il est probable qu'il reste encore dans ce travail bien des points à approfondir, c'est là un des motifs qui m'ont engagé à en publier une traduction française. Je me suis astreint à la faire aussi littérale que possible pour éviter de modifier à mon insu la pensée de l'auteur.

#### TABLE DES MATIÈRES

Préface du Traducteur.	
Critérium de l'équilibre et de la stabilité.	
Conditions d'équilibre de substances différentes placées en contact dans les cas où elles ne sont soumises à l'action ni de la gravité, ni de l'électricité, ni de forces de torsions, ni de tensions capillaires.	
I. Conditions relatives à l'équilibre des parties homogènes du système existant initialement.	
II. Conditions relatives à la formation de masses n'existant pas au préalable dans le système.	
Définitions et propriétés des équations fondamentales.	
Potentiels.	
Sur la coexistence des phases de la matière.	
Stabilité interne d'un fluide homogène déduite de l'équation fondamentale.	
Représentations géométriques.	
Surfaces sur lesquelles la composition du corps représenté est constante.	
Surfaces et courbes sur lesquelles la composition est variable, tandis que la pression et la température sont constantes.	
Phases critiques.	
Sur la valeur des potentiels quand la quantité d'un des constituants est très petite.	
Sur certains points relatifs à la constitution moléculaire des corps.	
Conditions d'équilibre de masses hétérogènes sous l'influence de la gravité.	
Méthode pour traiter le problème précédent en considérant les volumes élémentaires comme invariables.	
Equation fondamentale de gaz parfaits et de mélanges de ces gaz.	
Conséquences relatives aux potentiels dans les solides et les liquides.	
Mélanges gazeux avec des constituants transformables.	

Georges CARRÉ et C. NAUD, Éditeurs, 3, rue Racine, Paris. 15

---

(1 vol., 138 p., 25 fig., 10 pl.  
hors texte.)

Cartonnage toile anglaise.

Prix : 5 francs.

Alexandre HÉBERT

Préparateur à la Faculté de médecine.

# *La technique des Rayons X*

MANUEL OPÉRATOIRE

de la Radiographie et Fluoroscopie

A L'USAGE DES

Médecins, Chirurgiens et Amateurs de photographie

La découverte prestigieuse du professeur de Würzburg était à peine connue que les savants de tous les pays s'en emparaient. En quelques semaines, un nombre prodigieux de travaux furent publiés tant au point de vue philosophique qu'au point de vue expérimental.

L'étude de la question serait extrêmement laborieuse pour quiconque voudrait compiler les nombreux mémoires parus en toute langue dans les différents journaux scientifiques. De plus, ces mémoires conçus à un point de vue scientifique d'un degré très élevé, sont pour la plupart peu à la portée de la majorité de ceux auxquels les rayons X sont susceptibles de rendre service.

Un livre qui, se dégageant des vues théoriques émises, qui, coordonnant les résultats pratiques obtenus, qui, conçu et écrit très clairement, pourrait être lu avec profit par l'homme de science ou l'amateur instruit, aurait certes un grand succès.

L'ouvrage de M. Hébert que nous présentons au public est dans ce cas. Sans être ni trop complètement théorique, ni entièrement documentaire, ce livre vise surtout à être pratique et à permettre à quiconque de reproduire les belles expériences sorties de nos grands laboratoires.

Ce livre rendra des services aux médecins, chirurgiens, et mettra le grand public lui-même en état de reproduire les expériences de M. Röntgen. Le chimiste lui aussi en tirera le plus grand profit, étant donnée l'application que l'on peut faire des Rayons X à l'analyse, par exemple la recherche des falsifications du safran, des tissus, à la différenciation des pierres fausses des vraies, etc.

*(Revue de Chimie analytique appliquée).*

## TABLE DES MATIÈRES

### AYANT-PROPOS. — INTRODUCTION.

#### PREMIÈRE PARTIE. — Le matériel.

CHAP. I. — LA SOURCE D'ÉLECTRICITÉ : Les piles. — Les accumulateurs.  
— Le courant fourni par les usines centrales.

CHAP. II. — LA BOBINE.

CHAP. III. — LE TUBE DE CROOKES.

CHAP. IV. — LA GLACE ET LE CHASSIS PHOTOGRAPHIQUES.

#### DEUXIÈME PARTIE. — Les opérations.

CHAP. I. — DISPOSITION GÉNÉRALE DES EXPÉRIENCES : Cas des objets inanimés. — Cas des êtres vivants et du corps humain. — Modifications proposées aux dispositions précédentes.

CHAP. II. — DÉVELOPPEMENT DES IMAGES ET OBTENTION DES POSITIFS.

CHAP. III. — DISPOSITIF CONVENANT A LA FLUOROSCOPIE.

#### TROISIÈME PARTIE. — Les applications.

CHAP. I. — APPLICATIONS MÉDICALES ET CHIRURGICALES. — Recherche de corps étrangers introduits dans l'organisme. — Détermination de la position des appareils chirurgicaux introduits à demeure dans l'organisme. — Etude des lésions intra-osseuses. — Etude des lésions internes auxquelles les os participent. — Photographie des calculs dans le rein et dans la vessie. — Recherche de la position du fœtus chez la femme enceinte. — Observations.

CHAP. II. — APPLICATIONS DIVERSES.

#### QUATRIÈME PARTIE. — Un peu de théorie.

CHAP. I. — RAYONS CATHODIQUES.

CHAP. II. — RAYONS X.

## TABLE DES FIGURES

1. Tube de Crookes en activité. — 2. Dispositif schématisé de l'expérience de Röntgen. — 3. La pile théorique. — 4. Pile Bunsen. — 5. Batterie de piles au bichromate à treuil. — 6. Schéma du couplage en tension. — 7. Schéma du couplage en quantité. — 8. Accumulateur Planté. — 9. Montage d'une prise de courant pour l'obtention des rayons X. — 10. Bobine de Rhumkorff. — 11. Tube de Gessler. — 12. Appareil pour montrer la propagation rectiligne des rayons cathodiques. — 13. Tube de Röntgen. — 14. Tube focus. — 15. Tube focus Colardeau. — 16. Tube bianodique Séguy. — 17. Exploration d'un tube de Crookes. — 18. Schéma montrant la condensation des rayons cathodiques. — 19. Dispositif d'une expérience de fluoroscopie. — 20. Poignet d'un enfant de huit ans. — 21. Aile de faisan tué à la chasse. — 22. Poisson vivant traversé par les rayons X. — 23. Monstre humain à deux têtes. — 24. Boîte contenant une montre. — 25. Pièce de bois et vis.

## TABLE DES PLANCHES (hors texte)

1. Dispositif employé pour la photographie d'une main au moyen des rayons de Röntgen. — 2. Dispositif employé pour la photographie des os de la jambe. — 3. Squelette d'une main photographiée à travers les chairs. — 4. Lapin tué à la chasse photographié par les rayons X. — 5. Grenouille vivante traversée par les rayons X. — 6. Couleuvre vivante traversée par les rayons X. — 7. Squelette d'un rat photographié à travers les chairs. — 8. Squelette d'un pigeon photographié à travers les chairs et les plumes de l'oiseau. — 9. Fœtus humain traversé par les rayons X. — 10. Monstre humain à deux têtes photographié par les rayons X.

(1 vol., 165 pages, 11 figures.)

Cartonne à l'anglaise,

Prix : 5 francs.

A. HOLLARD

Chef de laboratoire  
de la Compagnie française des métaux.

# *La Théorie des ions et l'Électrolyse*

L'électrolyse a été, ces dernières années, l'objet d'un grand nombre de travaux, tant au point de vue théorique qu'au point de vue pratique. Ces travaux ont doté l'analyse chimique de méthodes inappréciables pour la séparation et le dosage des éléments. En outre, ils ont enrichi la métallurgie de procédés d'une grande valeur pour la préparation et la séparation des métaux et ont amené la création de nouvelles industries chimiques. Ces applications pratiques, se développent et se perfectionnent de jour en jour.

Malheureusement, en électrochimie, les recherches purement scientifiques d'une part, et celles qui ont un but uniquement pratique, d'autre part, ont été effectuées trop souvent sans contrôles réciproques. Jusqu'ici le praticien a été livré presque exclusivement à ses propres recherches; plus au courant des faits acquis par les savants, il eût évité bien des tâtonnements, qui lui ont coûté beaucoup de temps et beaucoup d'argent.

Aujourd'hui que les travaux scientifiques ont enrichi la science électrochimique d'un nombre considérable de faits nouveaux, on peut grouper tous ces faits, mettre en évidence leurs relations mutuelles; on peut, en un mot, donner une *théorie* de l'électrochimie, c'est-à-dire une interprétation générale qui, non seulement puisse expliquer les faits acquis, mais encore permettre d'en prévoir de nouveaux.

Nous nous proposons, au cours de cet ouvrage, de donner, au moins dans ses grandes lignes, un exposé de l'état actuel de la théorie des ions appliquée à l'électrolyse. Nous aurons surtout en vue, dans cette étude, les *phénomènes électrolytiques au sein des solutions aqueuses*, avec l'emploi de courants continus; nous insisterons tout particulièrement sur l'électrolyse des sels métalliques.

Les phénomènes que nous allons examiner sont tous des manifestations de l'énergie électrique, au sein des électrolytes; cette énergie, comme les autres formes de l'énergie, peut être considérée comme un produit de deux facteurs: la *quantité d'électricité* et la *tension électrique* (cette expression sera employée de préférence à celle: « différence de potentiel »). La quantité d'électricité qui est en jeu dans une électrolyse doit être considérée dans ses rapports avec la *conductibilité des électrolytes*.

Nous serons donc amené, d'après ce qui précède, à étudier la *constitution des électrolytes*, puis leur *conductibilité*, enfin la *tension électrique* et le *travail* nécessaire au fonctionnement de l'électrolyse.

## TABLE DES MATIÈRES

### LIVRE PREMIER. — CONSTITUTION DES ÉLECTROLYTES

CHAP. I. — PROPRIÉTÉ DES SOLUTIONS : Analogie entre les gaz et les solutions. — Lois communes aux gaz et aux solutions. — Dissociation des gaz et dissociation des solutions.

CHAP. II. — LES ÉLECTROLYTES, LES ANIONS ET LES CATIONS : Nature des électrolytes. — Théorie d'Arrhénius. — Produits séparés aux électrodes. — Chaleurs de dissolution et chaleurs d'ionisation. — Densités des électrolytes. — Non-électrolytes. — Influence du dissolvant.

### LIVRE II. — CONDUCTIBILITÉ DES ÉLECTROLYTES

CHAP. I. — GÉNÉRALITÉS.

CHAP. II. — CONDUCTIBILITÉ ET DEGRÉ DE DISSOCIATION DES ÉLECTROLYTES : Conductibilité moléculaire. — Loi d'Ostwald. — Rôle des ions dans les réactions chimiques. — Constante de dissociation.

CHAP. III. — CONDUCTIBILITÉ DES ÉLECTROLYTES ET CHARGE DES IONS : Loi de Faraday. — Réciproque de la loi de Faraday. — Atomicité.

CHAP. IV. — CONDUCTIBILITÉ DES ÉLECTROLYTES ET VITESSES DES IONS : Théorie de Hittford. — Loi de Kohlrausch. — Vitesse des ions. — Influence des poids moléculaires des ions sur leurs vitesses de transports.

CHAP. V. — INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE SUR LA CONDUCTIBILITÉ : Résultats généraux. — Interprétation.

### LIVRE III. — TENSION ÉLECTRIQUE

#### NÉCESSAIRE AU FONCTIONNEMENT DE L'ÉLECTROLYSE

CHAP. I. — THÉORIE DE LA DISSOLUTION DES ÉLÉMENTS ENTRANT DANS LA COMPOSITION DES ÉLECTRODES : Généralités. — Exemples des divers cas de dissolution possible (Expériences de Küster). — Chaleurs d'ionisation (1<sup>re</sup> méthode). — Tension de dissolution électrique. — Théorie des piles.

CHAP. II. — TENSION ÉLECTRIQUE : La tension du bain et la tension de polarisation. — Tension de polarisation entre une électrode et son électrolyte qui contient un de ses sels. — Tension de polarisation entre deux métaux qui sont chacun en contact avec un de leurs sels. — Théorie des piles réversibles. — Tension de polarisation aux bornes d'une cuve électrolytique. — Chaleur de réaction. — Chaleur secondaire. — Calcul de la chaleur secondaire. Vérification expérimentale du terme correctif  $T \frac{\partial e}{\partial T}$ . Siège de la chaleur secondaire.

— Mesure de la chaleur secondaire. — Calcul des chaleurs d'ionisation (2<sup>e</sup> méthode. — Courant de polarisation.

CHAP. III. — TENSIONS DE POLARISATION ET SÉPARATION DES MÉTAUX : Principes généraux. — Expériences de Nernst et Glaser relatives aux mesures des tensions de polarisation anodique et cathodique.

### LIVRE IV. — ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

CHAP. I. — ÉNERGIE EN JEU DANS UNE ÉLECTROLYSE : Énergie totale. — Nature de l'énergie. — Capacité de polarisation.

## NOTES

NOTE I. — La constante de dissociation et la mesure de l'affinité chimique.

NOTE II. — Application de la loi de Guldberg et Wange à l'équilibre dans les électrolytes entre ions et éléments non dissociés.

NOTE III. — Hydrolyse. — Conductibilité des sels hydrolysés.

NOTE IV. — Mesure de la tension électrique entre un métal plongeant dans la solution d'un de ses sels et cette solution.

NOTE V. — Mesure de la tension de dissolution exercée par un métal plongeant dans la solution d'un de ses sels.

(1 vol., 338 p., 102 fig.)  
Cartonnage toile anglaise.

PRIX : 5 francs.

R. HOMMELL

Ingénieur agronome,  
Professeur d'Agriculture à Riom (Puy-de-Dôme),  
Membre fondateur de la Société centrale d'Apiculture.

# *L'Apiculture*

par les méthodes simples

Le *Traité d'Apiculture par les méthodes simples* est l'œuvre d'un praticien qui exploite lui-même d'importants ruchers ; les débutants y trouveront un guide précieux et sûr, toujours clair et précis, qui leur évitera les tâtonnements et les fautes ; les personnes déjà versées dans l'art apicole le liront aussi avec profit et pourront ensuite apporter des modifications utiles aux procédés qu'ils emploient.

Le chapitre I est consacré à l'étude de la biologie des Abeilles, à la description des diverses races. La cire et les rayons, le miel, les plantes mellifères, le pollen, l'eau et la propolis font l'objet du chapitre II. Le chapitre III traite de l'accroissement des colonies, de la ponte et de l'essaimage naturel.

Dans les chapitres IV, V, VI, VII et VIII est étudié, avec les détails les plus minutieux, tout ce qui est relatif à l'établissement du rucher, au choix raisonné de la ruche et à sa manipulation, pour l'outillage nécessaire, le peuplement des ruches, l'essaimage artificiel, la conduite du rucher pendant toute l'année, la récolte et la vente du miel, la récolte et la purification de la cire, les falsifications et l'analyse du miel et de la cire, enfin les dérivés du miel : hydromel, cénomel, vinaigre et eau-de-vie.

Les chapitres IX et X contiennent tout ce qui est relatif aux maladies des Abeilles et à la statistique apicole.

Ce livre est avant tout un livre pratique sans pour cela être dépourvu des théories indispensables en pareille matière. La plupart des figures sont inédites et leur grand nombre en ajoutant à l'intelligence du texte lui enlève toute obscurité et toute sécheresse.

En résumé, l'ouvrage de M. Hommell est sans doute le plus complet qui existe à l'heure actuelle sur la matière ; il sera le guide indispensable de tout ceux qui se proposeront de créer et de conduire un rucher avec le minimum de travail et le maximum de produit.

## TABLE DES MATIÈRES

---

CHAP. I. — ORGANISATION DES COLONIES D'ABEILLES : I. *Les habitants de la ruche*. — II. *Races d'abeilles* : A, Races européennes ; B, Races asiatiques et du Nord de l'Afrique ; C, Races exotiques.

CHAP. II. — CONSTRUCTIONS DES ABEILLES. — SUBSTANCES RÉCOLTÉES ET ÉLABORÉES : I. *Cire et rayons*. — II. *Miel*. — III. *Plantes mellifères*. — IV. *Pollen*. — V. *Eau*. — VI. *Propolis*.

CHAP. III. — ACCROISSEMENT DES COLONIES. — PONTE. — ESSAIMAGE : I. *La ponte et le couvain*. — II. *Essaimage*.

CHAP. IV. — LE RUCHER : L'abeille au point de vue zootechnique. — Organisation de l'entreprise. — *Emplacement et établissement du rucher*. — Qualités mellifères de la région. — Étendue du vol de l'abeille. — Situation convenable pour l'établissement du rucher. — Importance de l'ombre et des arbres. — Orientation des ruches. — Ruches en plein air et ruches en pavillon. — Disposition, aplomb des ruches, supports. — Sol du rucher. — Nombre maximum de colonies à réunir dans un même rucher. — Laboratoire. — Fenêtres, armoires à cadre. — Numérotage des ruches, observations à faire.

CHAP. V. — LES RUCHES. — LES INSTRUMENTS AGRICOLES. — LES PROCÉDÉS OPÉRATOIRES : I. *Les Ruches* : A, Historique des ruches ; B, Théorie et choix de la ruche. — II. *Manipulation des ruches*. — III. *Outils de l'apiculteur*.

CHAP. VI. — PEUPLEMENT DES RUCHES : I. *Différents moyens de se procurer les abeilles nécessaires au peuplement du rucher* : A, Achat de colonies à des industriels ; B, Achat de ruches vulgaires sur place, avantage de ce procédé ; C, Achat d'essaims ; D, Capture d'essaims sauvages. — II. *Mise en ruche des colonies achetées*. — III. *Peuplement des ruches à cadres pour essaimage artificiel*. — IV. *Accroissement du rucher*.

CHAP. VII. — CONDUITE DU RUCHER : I. *Nécessité d'un apprentissage à faire*. — II. *Travaux à effectuer au rucher pendant toute l'année* : A, Opérations de printemps ; B, Opérations d'été ; C, Récolte du miel ; D, Hivernage.

CHAP. VIII. — LES PRODUITS DU RUCHER : A, Extraction et vente du miel ; B, Récolte, purification et blanchiment de la cire ; C, Falsifications et analyse du miel ; D, Falsifications et analyse de la cire ; E, Les dérivés du miel.

CHAP. IX. — MALADIES DES ABEILLES ET ANIMAUX NUISIBLES : A, Maladies ; B, Insectes nuisibles ; C, Vertébrés nuisibles ; D, Plantes nuisibles.

CHAP. X. — STATISTIQUE AGRICOLE. — COMMERCE DU MIEL ET DE LA CIRE : A, Commerce du miel ; B, Commerce de la cire ; C, Tableau des principaux succédanés de la cire d'abeille ; D, Statistique apicole.

(1 vol., 188 p., 56 fig.)  
Cartonnage toile anglaise.

PRIX : 5 francs.

Alphonse LABBÉ  
Docteur ès sciences,  
Conservateur des Collections zoologiques  
à la Sorbonne.

# *La Cytologie expérimentale*

## Essai de Cytomécanique

Cet ouvrage est la mise au point sommaire, mais précise, des expériences récentes de mécanique cellulaire, de *cytomécanique*, de cette jeune science qui veut connaître expérimentalement, non seulement ce qu'est une cellule en elle-même, mais ce que sont les divers organes cellulaires, et aussi quelles sont les relations réciproques de ces organes et les rapports de la cellule vis-à-vis du milieu ambiant ou des autres cellules.

L'auteur étudie successivement les expériences faites pour reproduire artificiellement le protoplasma et les figures karyokinétiques, l'action des agents physico-chimiques sur la structure et les mouvements des cellules ; les relations du noyau et du cytoplasma ; les modifications expérimentales de la mitose et de la segmentation de l'œuf.

Deux chapitres sont consacrés à l'adaptation au milieu et aux tropismes et tactismes. Enfin un chapitre important discute les causes de la différenciation cellulaire, question des plus graves, puisqu'elle est la base même du problème de l'hérédité et de l'évolution des espèces.

Ce livre sera utile non seulement aux naturalistes et aux biologistes qu'intéressent les grandes questions de biologie générale, mais aussi aux étudiants qui y trouveront exposée et développée l'importante partie de leur programme relative à la biologie cellulaire.

## TABLE DES MATIÈRES

---

### PRÉFACE. — INTRODUCTION.

CHAP. I. — REPRODUCTION ARTIFICIELLE DU PROTOPLASMA ET DES FIGURES KARYOKINÉTIQUES : *Mousses de Bütschli et théorie alvéolaire* : Explications expérimentales de la mitose. Théorie de Rumbler. — *Astrosphères artificielles*.

CHAP. II. — ACTION DES AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES SUR LA STRUCTURE, LE MÉTABOLISME ET LES MOUVEMENTS DE LA CELLULE : *Action des agents chimiques* : Action des gaz. — Action de diverses substances. — Chimiotropisme et chimiotactisme. — *Action des agents mécaniques* : Action de la pesanteur. — Action de la température. — Effets de la température sur le métabolisme et l'irritabilité du protoplasme. — Limites de la température vitale. — Thermotactisme et thermotropisme. — Action de la lumière. — Action de l'électricité. — Conclusions.

CHAP. III. — RAPPORTS RÉCIPROQUES DU NOYAU ET DU CYTOPLASMA : *Plasmolyse et cellules sans noyau* : Action des agents qui annihilent le cytoplasma. — Mérotomie. — Parasites karyophages. Nucléophagie. — Limites de divisibilité de la matière vivante. — Dualité nucléaire des Ciliés. — Conclusions.

CHAP. IV. — MODIFICATIONS EXPÉRIMENTALES DE LA REPRODUCTION CELLULAIRE : *Modifications expérimentales de la mitose* : Action des agents chimiques. — Action de l'électricité. — Action des basses températures. — Action d'une élévation de température. — Mitoses anormales. — *Modifications expérimentales de la segmentation* : Action de divers agents sur la segmentation. — Polarité cellulaire et orientation des blastomères. — *Fragmentation du protoplasma sans division nucléaire* : Division nucléaire sans division cellulaire.

CHAP. V. — L'ADAPTATION AU MILIEU : *Adaptation aux agents chimiques* : Adaptation au manque d'eau. Dessiccation. — Effets de la concentration du milieu. Action des solutions salines. — Adaptation aérienne. Manque d'air et augmentation de pression. — Adaptation aux températures extrêmes. — Adaptation à l'éclairement. — Adaptation aux excitations mécaniques et à la pesanteur. — Adaptation à la vie parasitaire. Cytosymbiose. — Conclusions.

CHAP. VI. — TROPISMES ET TACTISMES DANS L'ORGANISME ET DANS L'ONTOGÈNESE : *Tropismes protoplasmiques* : Cytotropismes. — Adelphotaxie. — Cytotactisme entre cellules différentes. — Cytotactisme sexuel. — Caryotropisme. — Cytotactisme parasitaire. — Cytotactisme phagocytaire. — Biotactismes.

CHAP. VII. — LA DIFFÉRENCIATION CELLULAIRE : *Préformation et épigénèse* : Indifférence cellulaire originelle. — Différenciation cellulaire. — Différenciation générale des cellules. — Différenciation des cellules germinales. — Différenciations intracellulaires. — Différenciations des protozoaires. — Localisation dans le temps et l'espace. — La notion de cellule. — Biomécanique de la différenciation.

(1 vol., 296 p., 5 fig.)  
Cartonnage toile anglaise.  
PRIX : 5 francs.

C.-A. LAISANT  
Examineur  
d'admission à l'École polytechnique,  
Docteur ès sciences.

# La Mathématique

## Philosophie — Enseignement

« Dans la première partie, la plus longue de l'ouvrage, l'auteur cherche à définir cet objet multiple, variable à l'infini, que la Mathématique doit étudier, et à élever une classification des sciences mathématiques qui soit sensiblement d'accord avec la tradition et qui soit justifiée par la nature des questions que chacune d'elles étudie.

« Toute la deuxième partie de l'ouvrage est pleine de réflexions ingénieuses, intéressantes, qui ne peuvent manquer d'être profitables à la classe nombreuse des étudiants qui, sans avoir encore approfondi aucun point de la science mathématique, ont cependant sur les principales parties de cette science des notions déjà étendues. Je signalerai plus particulièrement, et pour les louer sans réserve, les idées de l'auteur sur les nombres incommensurables, négatifs et imaginaires et celles qu'il développe à propos d'une opération générale, peut-être un peu trop négligée aujourd'hui et qu'il désigne par cette locution : *retour de l'abstrait au concret*.

Dans la troisième partie.

« L'auteur affirme que toute intelligence moyenne est apte à recueillir un enseignement mathématique assez complet pour être utilisé à un grand nombre de points de vue et pour assurer à celui qui le possède des idées raisonnables sur toute cette science mathématique jugée si faussement et si médiocrement aujourd'hui par l'immense majorité de ceux qui font cependant partie de la classe éclairée de la nation ; il pense que l'on ne saurait commencer trop tôt cet enseignement, qu'il y a tout avantage à en mener de front les diverses parties, arithmétique, algèbre et géométrie, et qu'il vaut mieux ne rien faire du tout que de consacrer une classe unique de une heure et demie par semaine à développer un tel programme ; il croit que pour cet enseignement, comme pour tout autre d'ailleurs, il faut de la continuité dans les efforts, le temps matériel de revenir au besoin en arrière, de reprendre les points difficiles et de les illustrer par des exemples jusqu'à ce qu'ils se soient gravés dans l'esprit de l'élève.

« Il faut savoir gré à M. Laisant d'avoir appelé l'attention sur ce point capital. Si son livre devait être un des facteurs essentiels d'une réforme désirable à tant de points de vue, l'auteur pourrait se vanter, non seulement d'avoir écrit dans un style éloquent et clair un livre intéressant et instructif, mais encore d'avoir rendu un éminent service à son pays ».

E. H.

(Revue des Mathématiques spéciales, Juin 1898).

## TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION : Caractères de cet ouvrage. — La Mathématique. — Philosophie. — Enseignement. — Plan général. — Observation finale.

### LA MATHÉMATIQUE PURE. — ENSEIGNEMENT.

CHAP. I. — LA MATHÉMATIQUE ET SES SUBDIVISIONS : Essais de définitions. — Origine expérimentale. — Mesure et nombre. — La définition d'Auguste Comte. — Le but de la Mathématique. — Subdivision de la Mathématique. — Essai d'une classification. — Importance de la science mathématique.

CHAP. II. — L'ARITHMÉTIQUE ET L'ARITHMOLOGIE : Caractère général de l'Arithmétique. — Le nombre. — Rapport. — Numération. — Opérations élémentaires. — Divisibilité. — Les fractions. — L'infini en arithmétique. — Les incommensurables. — Proportions. — Système des mesures. — Calculs arithmétiques d'ordre supérieur. — Arithmologie.

CHAP. III. — L'ALGÈBRE : Les fonctions. — Langage algébrique. — Classification des fonctions. — Equations algébriques. — Classification des équations. — Théories algébriques. — Extension des idées et du langage algébriques.

CHAP. IV. — LE CALCUL INFINITÉSIMAL : Importance historique. — Analyse transcendante. — Caractère général du calcul infinitésimal. — Division du calcul différentiel. — Formation des équations différentielles. — Calcul intégral. — Intégrales définies. — Calcul des variations.

CHAP. V. — LA THÉORIE DES FONCTIONS : Explication préliminaire. — Origine de la Théorie des fonctions. — Classification des fonctions. — Étude des fonctions. — L'interpolation.

CHAP. VI. — LA GÉOMÉTRIE : Origine des notions géométriques. — Les axiomes des diverses Géométries. — Divisions de la Géométrie. — La Géométrie des anciens. — La Géométrie moderne. — Les transformations géométriques. — La Géométrie projective. — La Géométrie cinématique. — La Géométrie du triangle. — La Géométrie graphique. — La Géométrie à  $n$  dimensions. — La Géométrie de situation.

CHAP. VII. — LA GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE : Les coordonnées. — Equations des lignes ; lieux géométriques. — Transformation des coordonnées ; classification des lignes. — Extension à l'espace. — Théorie des courbes planes. — Théorie des surfaces. — Coordonnées trilineaires et tétraédriques ; coordonnées tangentielles. — Le calcul géométrique. — L'introduction des imaginaires en Géométrie analytique.

CHAP. VIII. — LA MÉCANIQUE RATIONNELLE : Définition et objet de la Mécanique. — Introduction du temps ; la Cinématique. — Le point matériel. — L'inertie et les forces. — La masse. — Les unités en Mécanique. — La Statique. — La Dynamique. — La Dynamique du point matériel. — La Dynamique des systèmes. — Les limites de la Mécanique.

### LA MATHÉMATIQUE APPLIQUÉE. — PHILOSOPHIE.

CHAP. I. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

CHAP. II. — L'APPLICATION DU CALCUL.

CHAP. III. — L'APPLICATION DE LA GÉOMÉTRIE.

CHAP. IV. — L'APPLICATION DE LA MÉCANIQUE.

### ENSEIGNEMENT.

CHAP. I. — VUE GÉNÉRALE SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MATHÉMATIQUE.

CHAP. II. — ENSEIGNEMENT DE L'ARITHMÉTIQUE.

CHAP. III. — ENSEIGNEMENT DE L'ALGÈBRE ET DU HAUT CALCUL.

CHAP. IV. — ENSEIGNEMENT DE LA GÉOMÉTRIE.

CHAP. V. — ENSEIGNEMENT DE LA GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE.

CHAP. VI. — ENSEIGNEMENT DE LA MÉCANIQUE.

CHAP. VII. — LA HIÉRARCHIE DES ENSEIGNEMENTS.

Index bibliographique. — Table des noms cités.

(1 vol., 220 p., 32 fig.)  
Cartonnage toile anglaise.

PRIX : 5 francs.

H. LE CHATELIER

Professeur de Chimie minérale au Collège de France,  
Ingénieur en chef au corps des Mines.

et

O. BOUDOUARD

Préparateur au Collège de France.

# Mesure des Températures élevées

Les auteurs se sont proposé de passer rapidement en revue les différentes méthodes pyrométriques (c'est-à-dire thermométriques utilisables aux températures élevées), dont l'emploi peut être avantageux dans telle ou telle circonstance; il décrivent ensuite plus en détail chacune d'elles et discutent les conditions de leur emploi. Mais, avant tout, ils précisent dans quelles limites les différentes échelles peuvent être repérées par rapport à celle du thermomètre normal à gaz; c'est l'insuffisance de ce repérage qui, aujourd'hui encore, est la cause des erreurs les plus importantes dans la mesure des températures élevées. L'abondance des vues originales sur un sujet qui intéresse particulièrement la grande industrie rend la lecture de cet ouvrage indispensable à tous les ingénieurs des usines, fonderies, haut fourneaux et, en général, à tous ceux qu'une question aussi importante est à même d'intéresser au double point de vue théorique et pratique.

Il n'existait pas jusqu'à présent d'ouvrage complet sur la détermination des températures élevées, question intéressante au plus haut degré, aussi bien au point de vue scientifique qu'au point de vue industriel. L'ouvrage de MM. Le Chatelier et Boudouard sera donc favorablement accueilli. L'historique de la question se trouve résumé dans l'introduction, où les auteurs passent en revue les différentes échelles thermométriques employées, comparent les valeurs obtenues pour les points fixés par différents auteurs et donnent la liste des principales méthodes pouvant avoir un intérêt pratique.... Dans leur conclusion, les auteurs montrent quels sont les points dont l'étude paraît la plus urgente pour faire progresser notre connaissance des températures élevées. En terminant, MM. Le Chatelier et Boudouard font voir la relation étroite qui doit exister entre les recherches de laboratoire et les essais industriels, et indiquent les principales découvertes résultant de cette entente entre le savant et l'industriel. A. B.

(Bulletin de l'Association amicale des anciens Élèves  
de l'École de Physique et Chimie. Mai 1900.)

Nous ne pouvons songer à signaler tous les détails d'un travail de cette importance; le nom seul de M. Le Chatelier, dont la compétence dans la matière est universellement reconnue, suffit pour recommander cet ouvrage à l'attention des savants et des industriels. J. W.

(Bulletin de l'Association belge des chimistes. Juin 1900.)

## TABLE DES MATIÈRES

### INTRODUCTION.

Échelles thermométriques. — Points fixes. — Pyromètres.

ÉCHELLES NORMALES DES TEMPÉRATURES : Lois de Mariotte et Gay-Lussac. — Thermomètres à gaz. — Expériences de Regnault. — Échelle normale des températures. — Échelle thermodynamique.

THERMOMÈTRE NORMAL : Thermomètre de Sèvres. — Thermomètre de L. Callendar. — Thermomètre pour la haute température.

PYROMÈTRE A GAZ : Matière du réservoir. — Corrections et causes d'erreur : Thermomètre à volume constant. — Thermomètre à pression constante. — Thermomètre voluménomètre. — Résultats expérimentaux. — Expériences de Pouillet. — Expériences de E. Becquerel. — Expériences de Sainte-Claire-Deville et Troost. — Expériences de Violle. — Expériences de Maillard et Le Châtelier. — Expériences de Barus. — Expériences de Holborn et Wien. — Programme d'expériences. — Procédés indirects : Méthode de Crafts et Mayer. — Méthode de H. Sainte-Claire-Deville. — Méthode de H. Berthelot. — Points fixes : Soufre. — Zinc. — Or. — Argent. — Platine. — Sels métalliques. — Tableau des points fixes.

PYROMÈTRE CALORIMÉTRIQUE : Principe. — Choix du métal : Platine. — Fer. — Nickel. — Calorimètres. — Précision des mesures. — Conditions d'emploi.

PYROMÈTRE PAR RETRAIT (Wedgwood).

MONTRES FUSIBLES (Seger).

PYROMÈTRE A RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE : Principe. — Recherches de Siemens. — Recherches de Callendar et Griffith. — Recherches d'Holborn et Wien. — Loi de variation de la résistance du platine. — Dispositif expérimental. — Conditions d'emploi.

PYROMÈTRE A RADIATION CALORIFIQUE : Principe. — Expériences de Pouillet. — Expériences de Violle. — Expériences de Rosetti. — Expériences de Wilson et Gray. — Expériences de Langley. — Conditions d'emploi.

PYROMÈTRE A RADIATION LUMINEUSE : Principe. — Lois de Kirchhoff : Mesure de l'intensité totale de la radiation. — Mesure de l'intensité d'une radiation simple : Photomètre de H. Le Châtelier. — Réglage de l'appareil. — Mesures. — Détails d'une expérience. — Graduation. — Conditions d'emploi. — Mesures de l'intensité relative de radiations différentes : Emploi de l'œil seul. — Emploi du verre de Cobalt. — Lunette Mesuré et Nouel. — Pyromètre de M. Crova.

PYROMÈTRE THERMO-ÉLECTRIQUE : Principe. — Expériences de Becquerel, Pouillet, Regnault. — Expériences de H. Le Châtelier : Hétérogénéité des fils. — Choix du couple. — Procédés des mesures électriques : Méthode par apposition. — Méthodes galvanométriques. — Résistance des couples. — Galvanomètres. — Différents types de galvanomètres. — Disposition des fils du couple. — Jonction des fils. — Isolement et protection. — Soudure froide. — Graduation : Formule. — Points fixes. — Résultats d'expériences.

PYROMÈTRES ENREGISTREURS : Pyromètre enregistreur à gaz. — Pyromètre enregistreur à résistance électrique. — Pyromètre enregistreur thermo-électrique. — Enregistrement discontinu. — Enregistrement continu.

### CONCLUSION.

(1 vol., 200 p., 12 fig.)  
Cartonnage toile anglaise.  
PRIX : 5 francs.

Georges *MAUPIN*  
Licencié ès sciences mathématiques et physiques,  
Membre de la Société Mathématique de France.

# Opinions et Curiosités touchant la Mathématique

Pendant les *XVI<sup>e</sup>*, *XVII<sup>e</sup>* et *XVIII<sup>e</sup>* siècles.

Quelles opinions avaient de l'utilité des mathématiques dans les siècles précédents non seulement les savants, mais surtout les faiseurs de livres et même les ignorants? Quels avantages pensait-on en retirer pour l'éducation; quelle liaison singulière voulait-on établir entre la doctrine mathématique et la religion? Voilà ce qui est traité dans ce volume. En donnant des extraits curieux et piquants des auteurs qu'il cite, M. Maupin ne s'est permis d'y ajouter que de brefs commentaires et de courtes notes biographiques, ne voulant rien ôter de leur caractère aux textes mentionnés. Ajoutons que ce n'est pas là un ouvrage savant et que, dans ses parties les plus saillantes, on s'est efforcé de le rendre intelligible à tous ceux qui ont en mathématiques des connaissances moyennes. Ce livre a, par ailleurs, un côté documentaire qui séduira les personnes qu'intéresse l'évolution de l'esprit mathématique à travers les graves querelles d'écoles et les discussions brûlantes des dogmatistes. — Les mathématiciens trouveront un vif intérêt à cette excursion rétrospective dans le domaine de la géométrie, et les curieux, que n'effrayent pas les soutenances imprévues, prendront plaisir à l'intervention des mathématiques dans le dogme de la Présence réelle. — D'autre part, le volume de M. Maupin, en tout décidément instructif, nous donne en manière d'actualité, des aperçus originaux sur ce que pensaient de l'utilité du latin dans l'enseignement les maîtres d'autrefois. — Bien des idées que nous émettons aujourd'hui sur ce sujet sont, à la vérité, celles d'hier et nous devons au livre de M. Maupin la satisfaction de l'apprendre.

## TABLE DES MATIÈRES

- CHAP. I. — La géométrie d'Oronce Fine : sa quadrature du cercle (1556).  
CHAP. II. — Quadrature du cercle par un noble chanoine, philosophe et poète (Charles de Bovelles, chanoine de Noyon, 1566).  
CHAP. III. — « Comme nostre esprit s'empesche soy-mesmes » (Montaigne, 1580).  
CHAP. IV. — L'art de médecine. — L'art de géométrie (Fioravanti de Bologne, 1586).  
CHAP. V. — Ruse de l'historien juif Josèphe. — Quadrature du cercle (le P. Jean Leuréchon, 1624).  
CHAP. VI. — Aires de certains segments du cercle (l'éditeur Frobenius, 1627).  
CHAP. VII. — Réfutation de la quadrature du cercle donnée par *Simon a quercu* en 1584. — Avantages qu'il y aurait à enseigner les mathématiques en français et à supprimer le latin dans les collèges (J.-A. Le Tenneur, 1640).  
CHAP. VIII. — « Où il est prouvé par exemple que, si l'enfant n'a pas l'esprit et la disposition que demande la science qu'il veut apprendre, c'est en vain qu'il écoute de bons Maîtres, qu'il a beaucoup de livres et qu'il travaille toute sa vie. » (Jean Huarte, médecin espagnol, 1645.)  
CHAP. IX. — L'esprit de géométrie et l'esprit de finesse (Pascal).  
CHAP. X. — Modeste épître au lecteur. — Merveilles des mathématiques (René François, prédicateur du Roy, 1657).

CHAP. XI. — Du point géométrique. — Histoires de sorciers. — S'il est expédient aux femmes d'être savantes (Académie française, année 1667).

CHAP. XII. — La géométrie de Port-Royal. — Orgueil des géomètres. — Avantages de la géométrie pour l'éducation. — Définitions d'Euclide. — Démonstrations par l'absurde (Antoine Arnaud, Nicole, 1667).

CHAP. XIII. — Barrême l'arithméticien. — Dédicace en vers de son œuvre (Barrême, 1671 et 1673).

CHAP. XIV. — Preuve de l'existence de Dieu tirée de la considération des espaces asymptotiques (le jésuite Pardies, 1673).

CHAP. XV. — La géométrie française (quadrature du cercle) (De Beaulieu, ingénieur, 1676).

CHAP. XVI. — Essence divine du point géométrique. — Vertus du dattier, du figuier, de l'olivier (le R. P. Léon, 1679).

CHAP. XVII. — Les opinions religieuses d'un professeur de mathématiques sous Louis XIV. — Éditeurs et auteurs (Rohault, œuvres posthumes, 1682).

CHAP. XVIII. — A quel âge il faut apprendre l'arithmétique et la géométrie. — Etudes qui conviennent aux femmes (M<sup>r</sup> Claude Fleury, abbé du Loc-Dieu, 1686).

CHAP. XIX. — Les mathématiques modèrent les passions. — Leur introduction à l'Université d'Angers (Prestet, prêtre, 1689).

CHAP. XX. — Résolution sur le jeu de hasard, faite en Sorbonne le 25 juin 1697.

CHAP. XXI. — Les mathématiques et le salut de l'âme (de Neuveglise, prêtre, 1700).

CHAP. XXII. — Les mathématiques, la mathématique. — Enseignement de la philosophie dans l'Université de Paris (le P. Lamy, 1706).

CHAP. XXIII. — La contrefaçon des livres de Paris en 1706 (Jean Richard).

CHAP. XXIV. — Essai de quadrature du cercle par la courbe de Dinostrate (Remy Baudemont, 1712).

CHAP. XXV. — Problèmes curieux sur les combinaisons (Ozanam, 1725).

CHAP. XXVI. — Danger social de l'éducation monastique. — Inconvénients de l'enseignement des collèges. — Nécessité de commencer tôt l'étude des mathématiques (La Chalotais, 1763).

CHAP. XXVII. — Les mathématiques et les Pères de l'Église. — Du plaisir spirituel que donne l'étude de la géométrie. — Une méthode pour calculer  $\pi$  (le P. Lamy, de l'Oratoire, 1731 et 1738).

CHAP. XXVIII. — Introduction des mathématiques dans les classes de philosophie de l'Université de Paris (Rivard, professeur en l'Université (1738).

CHAP. XXIX. — Sauveur et M<sup>me</sup> de La Sablière. — Opinion de Bossuet sur la médecine, d'après Fontenelle. — Démonstration du carré de l'hypoténuse (Sauveur, édition posthume, 1753).

CHAP. XXX. — Dispositions naturelles des jeunes enfants pour les mathématiques. Cette étude fortifie leur raisonnement et les rend dans la suite aptes à commander (l'abbé de la Chappelle, censeur royal, 1743 et 1756).

CHAP. XXXI. — Un géomètre n'est pas forcément dénué de sens commun. — Du raisonnement géométrique. — Défectuosités des livres de géométrie. — Sécheresse d'esprit des mathématiciens (d'Alembert, 1758 et 1759).

CHAP. XXXII. — Fénelon, Bossuet et les mathématiques. — Théorèmes de Varignon sur la Présence réelle (d'après d'Alembert, Condorcet, le P. Nicéron).

CHAP. XXXIII. — L'art d'enseigner. — Manque de savoir-vivre de l'écolier. — Danger des longs sermons. — Ruse d'auteur (l'abbé de la Chappelle, 1763).

CHAP. XXXIV. — Essai de quadrature du cercle tenté sous l'invocation du Saint-Esprit (De Vausenville, 1771).

CHAP. XXXV. — Lettres à une jolie femme sur le cadastre (D. de V., 1814).

CHAP. XXXVI. — Note relative à l'état des mathématiques avant le xvi<sup>e</sup> siècle et à l'Université de Paris.

CHAP. XXXVII. — Note sur Charles de Bovelles : ses relations avec Oronce Fine et avec Loffroi, abbé d'Ourscamp.

(1 vol., 215 p., 12 fig.)  
Cartonnage toile anglaise.  
PRIX : 5 francs.

C. *PAGÈS*  
Vétérinaire de Paris et du département  
de la Seine,  
Docteur en médecine, Docteur ès sciences.

# *Méthodes pratiques en Zootechnie*

Dans cet ouvrage, l'auteur a poursuivi un triple but : 1<sup>o</sup> faire connaître à tous ceux qui désirent acquérir une instruction supérieure en cette matière ce que la Zootechnie a de définitivement acquis ; — 2<sup>o</sup> montrer aux hygiénistes les grands progrès accomplis dans l'élevage des animaux en leur indiquant tout le bénéfice qu'on peut en tirer pour l'homme ; — 3<sup>o</sup> apaiser le conflit qui existe, dans l'industrie de la vie, entre les théoriciens et les praticiens, et prouver, par la systématisation des observations empiriques, que ces derniers ont le plus souvent raison.

La première partie est consacrée à la Zootechnie générale : on y trouvera sur l'habitation, l'entraînement, l'alimentation, etc..., nombre de renseignements nouveaux. La deuxième partie traite des diverses opérations zootechniques, d'abord d'une manière générale, ensuite spécialement. Non seulement l'auteur a étudié les animaux de boucherie et les animaux moteurs, les seuls qui ont paru intéresser jusqu'ici les zootechniciens, mais encore les animaux affectueux et gardiens, tout en accordant aux premiers les plus grands développements. On y trouvera sur l'engraissement, sur l'élevage des animaux de sang, sur le chien de garde, sur les animaux de combat, des observations pratiques très importantes dont personne jusqu'ici n'avait parlé.

(*L'Éleveur*).

Nous avons lu et relu cet excellent livre, il nous apprend beaucoup sans fatigue, les faits y sont exposés avec tant de sobriété et de clarté qu'il semble que chaque phrase porte, que chaque mot était bien le mot indispensable et celui qui convenait, et nous engageons vivement nos lecteurs à se procurer ce nouvel ouvrage d'un auteur dont nous avons parlé avec grands éloges à propos de ses recherches sur le lait et les femelles laitières.

(*La Laiterie*).

## TABLE DES MATIÈRES

---

### PREMIÈRE PARTIE. — Généralités.

ACTION DE L'HOMME SUR LE MILIEU : Le sol et les eaux. — La lumière et l'air. — Habillement et habitation. — Les aliments : Modification des végétaux pendant leur vie. — Modification des végétaux après la récolte. — Division des aliments. — Cuisson des aliments. — Chauffage des aliments. — Coderc.

ACTION DE L'HOMME SUR L'ANIMAL LUI-MÊME PAR LES MÉTHODES VIOLENTES ET PACIFIQUES : Méthode chirurgicale : Castration. — Modifications subies par le mâle. — Modifications subies par la femelle. — Bistournage. — Moyens de transition. — Entraînement : Avantages et inconvénients. — Action physiologique. — Préparation à l'effort violent. — Préparation à la vitesse. — Pratique de l'entraînement. — Méthodes pacifiques : Alimentation. — Physiologie de l'alimentation : Classification nouvelle des aliments. — Distribution des boissons. — Aliments minéraux. — Dépaysement.

ACTION DE L'HOMME PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'INDIVIDU. — MODIFICATION DE LA RACE OU DE L'ESPÈCE : Reproduction : Choix des producteurs. — Beautés de la rusticité. — Beautés du nourrissage. — Beautés du sang. — Des beautés suivant les âges. — Des beautés suivant les sexes. — Consanguinité : Dégénérescence. — Rapidité et intensité de la dégénérescence. — Sélection. — Croisement. — Métissage. — Croisement des espèces. — Hybridation. — Croisement des genres. — Particularités de l'hérédité : Atavisme. — Hérédité par influence.

### DEUXIÈME PARTIE. — Principales opérations zootechniques.

DE LA SPÉCIALISATION DES FONCTIONS : Production des animaux. — Aliments : Généralités. — Du bœuf. — Du veau. — Du mouton. — De la chèvre. — Du porc. — Du cheval. — Du lapin. — Des oiseaux de basse-cour. — Des œufs et du lait. — Production des œufs. — Alimentation. — De la production de la laine. — Production des animaux de travail. — Des animaux de force : Bœuf. — Mulet. — Cheval. — Cheval de gros trait. — Cheval de trait léger. — Cheval de vitesse. — Animaux de luxe : Animaux à destination esthétique. — Coqs de combat. — Chiens de combat. — Animaux affectueux et nourriciers. — Animaux affectueux et travailleurs. — Animaux affectueux et gardiens.

(1 vol., p. 234, fig. 102.)  
Cartonnage toile anglaise.  
PRIX : 5 francs.

Georges PELLISSIER

# *L'Éclairage à l'Acétylène*

Tout le monde est intéressé à lire cet ouvrage, en premier lieu ceux qui s'occupent de la fabrication du carbure de calcium; ensuite, les ingénieurs, pour l'éclairage des phares, des voitures de chemin de fer, de tramways, etc., les architectes et propriétaires pour les installations privées, et les lampes portatives, les photographes pour les agrandissements et les projections, les médecins pour le laryngoscope éclairé à l'acétylène, les bicyclistes pour les lanternes, etc., enfin les municipalités, pour l'éclairage public.

L'ouvrage fort bien divisé comprend l'historique du nouveau gaz, l'examen des propriétés physiques et chimiques de l'acétylène, la description des fours électriques, de la fabrication et des propriétés du carbure de calcium, de la préparation de l'acétylène; l'étude et le classement des appareils générateurs, l'appréciation de l'acétylène liquéfié et comprimé, des observations sur la flamme de l'acétylène et le choix des becs, la comparaison du prix du nouvel éclairage avec les autres systèmes, les différentes applications déjà faites ou possibles et enfin des conseils sur les manipulations pratiques. — Il ne faudrait pas croire que l'auteur se borne à un exposé des systèmes qu'il décrit, il fait suivre chaque chapitre d'une synthèse dictée par une étude approfondie de la question, et par la volonté bien arrêtée de rester impartial, c'est ce qui fait le grand mérite de son travail.

*(Moniteur de l'Industrie).*

Examinant les points d'intérêt général, les conditions à réaliser pour la préparation et l'utilisation rationnelles de l'Acétylène, l'auteur étudie les applications qui paraissent réellement pratiques, il fait bonne justice des utopies et des illusions que font résonner trop haut ceux qui ont intérêt à faire de la propagande; il ramène à ses justes limites le champ d'exploitation qui reste à explorer, et finalement signale avec juste raison les dangers qu'il y a lieu de craindre et les précautions qu'il faut prendre pour les éviter.

L'ouvrage impartialement et scientifiquement écrit est le meilleur que nous possédions sur cette matière.

*(Le Constructeur).*

La partie qui traite des appareils générateurs chez M. Pellissier est très complète, et ce livre sera recherché par tous ceux qui s'occupent des applications de l'acétylène à l'éclairage.

*(L'Électrochimie).*

## TABLE DES MATIÈRES

### INTRODUCTION.

CHAP. I. — HISTORIQUE. — PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE L'ACÉTYLÈNE : L'acétylène ; historique. — Le carbure de calcium ; historique. — Propriétés chimiques de l'acétylène. — Propriétés physiques de l'acétylène ; compressibilité ; solubilité. — Accidents. — Explosibilité. — Mélanges détonants. — Attaque des métaux. — Toxicité.

CHAP. II. — FOURS ÉLECTRIQUES : Échauffement des résistances. — L'arc voltaïque. — Davy, Children, Grove. — Four de Pichon. — Expériences de Despretz, de Joule, de Thomson. — Les fours électriques modernes, W. Siemens, Faure, Lontin. — Fours Cowles. — Fours Héroult. — Fours Borchers. — Fours Moissan. — Fours Bullier. — Fours Willson. — Four de l'usine de Spray. — Four King. — Four Gearing. — Four Vincent. — Four King et Wyatt. — Four Regnoli. — Four Pictet. — Considérations générales.

CHAP. III. — LE CARBURE DE CALCIUM, FABRICATION, PROPRIÉTÉS : Préparation du carbure de calcium. — Énergie nécessaire à la préparation du carbure de calcium. — Matières premières. — Manutention. — Conduite des fours. — Résultats d'expériences. — Prix de revient du carbure de calcium. — Procédés divers. — Propriétés physiques et chimiques du carbure de calcium.

CHAP. IV. — PRÉPARATION DE L'ACÉTYLÈNE : Réaction fondamentale. — Impuretés ; purification. — Difficultés pratiques. — Régularisation de l'attaque. — Projection du carbure dans l'eau.

CHAP. V. — APPAREIL GÉNÉRATEUR ; CLASSEMENT : 1<sup>re</sup> classe : Appareils Dickerson. — Janson et Leroy. — Bon. — Souriou. — Clausolles. — Voigt. — Ducretet et Lejeune. — Gabe. — Tirolay. — D'Humilly. — Exley. — Ackermann. — Deroy. — O'Connor Sloane, Chesnay et Pillion, Frachebois. — Ragot. — 2<sup>e</sup> classe : Appareils Trouvé. — Allemanno et Stemmer. — Lequeux. — D'Arsonval. — Serpolet et Létang. — Gabe. — 3<sup>e</sup> classe : Appareils Dickerson. — Campe. — Maréchal. — Lequeux. — Bullier. — Pictet. — Thivert. — Beau et Bertrand-Taillet. — Bonneau. — Leroy et Janson.

CHAP. VI. — LAMPES PORTATIVES : Considérations générales. — 1<sup>re</sup> classe : Lampes Ducretet et Lejeune. — Claveureul et Guépin. — Roszbach-Roussel. — Gossart et Chevallier. — 2<sup>e</sup> classe : Lampe O'Connor Sloane ; Trouvé. — Cerckel. — Gearing. — Allemanno et Stemmer. — Nou. — 3<sup>e</sup> classe : Lampe Claude et Hess.

CHAP. VII. — ACÉTYLÈNE LIQUÉFIÉ ET COMPRIMÉ : Conditions à réaliser. — Appareil Dickerson. — Appareil Pictet. — Bonbonnes à acétylène liquide. — Prix de revient. — Applications. — Accidents. — Les dangers de l'acétylène liquide. — Acétylène comprimé. — Procédé Claude et Hess (acétylène dissous).

CHAP. VIII. — LA FLAMME DE L'ACÉTYLÈNE ; BECS BRÛLEURS : Conditions à réaliser pour la combustion de l'acétylène en vue de l'éclairage. — Réactions de combustion. — Pouvoir éclairant de l'acétylène. — Température de la flamme. — *Becs brûleurs* : Conditions auxquelles doivent satisfaire les brûleurs. — Becs genre Manchester. — Becs bougies. — Becs papillons. — Brûleurs auto-mélangeurs. — Gazomètres auto-mélangeurs Dickerson. — Gazomètres auto-mélangeurs Thivert.

CHAP. IX. — PRIX COMPARÉ DE L'ÉCLAIRAGE A L'ACÉTYLÈNE ; APPLICATIONS : Prix du mètre cube d'acétylène. — Consommation d'acétylène par carcel-heure. — Comparaison avec les autres systèmes d'éclairage. — Applications : Usines centrales. — Carburation du gaz d'éclairage. — Installations privées. — Lampes portatives. — Projections. — Photographie. — Éclairage des phares. — Éclairage des voitures de chemins de fer, de tramways, etc. — Laryngoscope éclairé à l'acétylène. — Étalons de lumière.

CHAP. X. — MANIPULATIONS PRATIQUES : Installation des appareils. Règlements administratifs. — Manipulations pratiques. — *Gazogènes de la 1<sup>re</sup> classe* : Chargement. — Mise en marche et fonctionnement. — Nettoyage et rechargement. — *Gazogènes de la 3<sup>e</sup> classe* : Chargement. — Mise en marche et fonctionnement. — Nettoyage et rechargement.

(1 vol., 194 p., 6 fig.)  
Cartonnage toile anglaise.  
PRIX : 5 francs.

William RAMSAY  
De la Société royale de Londres,  
Correspondant de l'Institut de France.  
Traduit de l'anglais par  
Georges CHARPY  
Docteur ès sciences.

# Les Gaz de l'Atmosphère

Le livre de William Ramsay est l'exposé de la genèse des découvertes suscitées par la recherche de la nature de l'air et des propriétés des gaz qui le constituent.

Les chapitres I et II sont consacrés aux tentatives de Boyle, de Mayow et de Hales que dominaient encore les théories de l'air considéré par les anciens comme un corps simple dont l'homogénéité pouvait, à la rigueur, subir l'influence d'effluves cosmiques. — A ce point du livre, nous sommes au milieu du dix-septième siècle. — Les recherches se succédaient empreintes des idées de la scolastique et dans l'ardeur des discussions théologiques lorsque survint Black qui, en découvrant l'acide carbonique, apporte à l'analyse la contribution du fait expérimental soutenu par des mesures quantitatives précises.

Ayant ainsi fait pressentir l'avènement des lois de combinaison, William Ramsay presse son étude et nous montre tour à tour Daniel Rutherford, Priestley et Scheele découvrant l'azote et l'oxygène, et enfin le couronnement de l'œuvre par la mémorable expérience de Lavoisier qui fit s'anéantir les théories du phlogistique.

Les chapitres V, VI, VII sont consacrés entièrement à la retentissante découverte de l'argon par l'auteur et son collaborateur lord Rayleigh. — A cet égard, l'homme de science et le praticien trouveront dans ce livre les matériaux disséminés partout ailleurs, sur lesquels s'édifia la découverte de l'argon et des propriétés qui caractérisent ce nouveau gaz. — De même, tous ceux qui peuvent servir des connaissances simplement élémentaires de chimie rencontreront dans l'ouvrage de William Ramsay l'intérêt qui s'attache à l'étude d'un point si important de la science moderne.

(Revue de Chimie analytique appliquée).

La description des gaz de l'atmosphère et l'histoire de leur découverte ne pouvait guère être écrite par un homme plus au courant de la matière que le savant qui, pour son compte, a su mettre en évidence quatre de ces gaz.

Une seule chose était à craindre, c'était que trop plein de son sujet, l'auteur ne se tint à des hauteurs auxquels le vulgaire eût été incapable de le suivre. Mais il est Anglais et, comme tant d'autres savants de cette nation, il a su, sans rien perdre de la rigueur scientifique, donner à son œuvre ce cachet pratique qui rend son livre accessible à tout homme intelligent. Seuls, les deux derniers chapitres pourront paraître un peu ardu aux lecteurs insuffisamment préparés. En revanche, les autres y verront deux bonnes leçons de philosophie chimique.

En résumé, l'ouvrage est de ceux que tous peuvent lire avec plaisir et avec profit.

(*Le Cosmos*).

On sait qu'il y a deux ans, au grand étonnement des chimistes, M. Ramsay prouva que nous ne connaissons pas encore la composition de l'air atmosphérique. Il venait, en effet, de découvrir un gaz inconnu jusqu'ici, l'argon. C'est l'historique de cette découverte qu'a présentée M. Ramsay au public anglais. Et M. Charpy a eu la bonne pensée de la rendre accessible au grand public français. Ce résumé aidera à faire apprécier l'importance des travaux de l'éminent physicien anglais et initiera nos jeunes physiciens de l'avenir à une des découvertes les plus étonnantes de la fin de notre siècle.

(*Journal des Débats*).

---

#### TABLE DES MATIÈRES

CHAP. I. — Les expériences et les théories de Boyle, Mayow et Halle.

CHAP. II. — L'air fixe et l'air méphitique. — Leur découverte par Black et Rutherford.

CHAP. III. — Découverte de l'« air déphlogistiqué » par Priestley et Scheele. — Renversement de la théorie du phlogistique par Lavoisier.

CHAP. IV. — Recherches de Cavendish sur l'« air phlogistique ». — Découverte de la composition de l'eau.

CHAP. V. — La découverte de l'argon.

CHAP. VI. — Les propriétés de l'argon.

CHAP. VIII. — La place de l'argon parmi les éléments.

---

(1 vol., 225 p., 65 fig.)  
Cartonnage toile anglaise.

PRIX : 5 francs.

**X. ROCQUES**

Ingénieur-chimiste,  
Ancien chimiste principal du Laboratoire  
municipal de Paris.

# *Les Eaux-de-vie et Liqueurs*

Dans un premier chapitre, l'auteur étudie les matières premières de l'industrie des eaux-de-vie et liqueurs, c'est-à-dire les eaux-de-vie naturelles d'une part et, d'autre part, des alcools d'industrie ; puis, il compare ces deux classes d'alcools au point de vue de leur production, de leur qualité, etc. Les six chapitres suivants sont relatifs à l'étude des diverses eaux-de-vie : cognacs, marcs, eaux-de-vie de vin et de cidre, kirschs, rhum et whisky. L'auteur traite notamment avec détails la préparation des eaux-de-vie charentaises. Le chapitre VIII est relatif aux liqueurs en général, le chapitre IX aux liqueurs apéritives (absinthe, vermouth, bitter), le chapitre X aux fruits à l'eau-de-vie, le chapitre XI aux eaux aromatiques distillées, et le chapitre XII aux sirops. L'auteur termine cette partie par des considérations générales sur le commerce des liqueurs et sur les fraudes. Nous signalons tout spécialement les deux derniers chapitres du volume dans lesquels l'auteur, se plaçant à un point de vue très général, étudie les alcools dans leur rapport avec l'hygiène, la législation et le fisc. Ce livre sera lu avec grand intérêt non seulement par les spécialistes, mais aussi par toutes les personnes soucieuses de se former une opinion exacte sur une des questions qui, à l'heure actuelle, s'imposent à l'attention de tous.

(*Revue des Falsifications*, juin 1899).

## TABLE DES MATIÈRES

CHAP. I. — MATIÈRES PREMIÈRES DE L'INDUSTRIE DES EAUX-DE-VIE ET LIQUEURS : *Les alcools naturels et les alcools d'industrie* : Quantités et proportions de ces deux sortes d'alcools. — Qualités de ces alcools ; leurs impuretés et leurs bouquets. — Classification des eaux-de-vie et liqueurs.

CHAP. II. — LES EAUX-DE-VIE DE VINS : *Eaux-de-vie des Charentes* : Cépages et crus. — Choix des vins. — Distillation. — Rendement des alambics simples. — Appareils distillatoires de premier jet. — Alambic d'Alleau. — Alambic Mouille. — Alambic Deroy à triple chauffe. — Alambic Braud. — Nouvel alambic charentais d'Egrot. — Alambic des Iles. — Comparaison entre les alambics simples et les alambics à premier jet. — *Viellissement des eaux-de-vie* : Viellissement artificiel. — Viellissement par l'oxygène et par

l'ozone. — Vieillessement par le bois. — Futailles. — *Manipulations des eaux-de-vie* : Coupages. — Mouillage, sirupage, collage, filtration. — *Prix des eaux-de-vie* : Prix de revient. — Prix de vente. — *Eaux-de-vie de l'Armagnac* : Alambic du Gers. — *Eaux-de-vie de vin du Midi* ; trois-six de Montpellier : Appareils continus. — Appareil continu Deroy. — Appareil continu Egrot. — Appareil à distillation continue et fractionnée. — *Distillation des vins altérés et malades*. *Eaux-de-vie de lies*. *Eaux-de-vie de marcs* : Traitement des marcs par lixiviation. — Traitement des marcs par les calandres. — *Eaux-de-vie de marcs de Bourgogne*.

CHAP. III. — EAUX-DE-VIE DE CIDRE ET DE POIRE.

CHAP. IV. — EAUX-DE-VIE DE FRUITS A NOYAUX. KIRSCH. QUETSCH : *Kirsch* : Titre en sucre des cerises. — Titre en acidité. — *Kirsch de commerce*. — *Kirsch de fantaisie*. — *Quetsch*.

CHAP. V. — RHUM ET TAFIA : *Fabrication du rhum* : Levain artificiel. — Fermentation continue.

CHAP. VI. — WHISKY : *Scotch whisky*. — *Irish whisky*. — *Whisky d'alambic*.

CHAP. VII. — EAUX-DE-VIE DE FANTAISIE.

CHAP. VIII. — LIQUEURS : *Liqueurs par distillation* : Préparation des alcoolats. — Alcoolats composés. — Fabrication des liqueurs. — Conservation des liqueurs. — *Liqueurs par les essences* : Tableau des essences extraites des plantes aromatiques. — *Liqueurs par infusion* : Préparation du cassis. — Infusion de cerises. — *Commerce des liqueurs*.

CHAP. IX. — LIQUEURS DITES APÉRITIVES : *Absinthe*. — *Bitters et amers*. — *Vermouth*.

CHAP. X. — LES FRUITS A L'EAU-DE-VIE : *Cerises*. — *Prunes*. — *Pêches*. — *Chinois*.

CHAP. XI. — EAUX AROMATIQUES DISTILLÉES : *Eau de fleur d'oranger*. — *Eau de roses*. — *Eau de framboises*.

CHAP. XII. — SIROPS : *Sirop de sucre* : Sirops glucosés. — Sirops de fruits. — Sirop d'orgeat. — Sirop de gomme. — Sirop de grenadine. — Altération des sirops.

CHAP. XIII. — COMMERCE DES SPIRITUEUX : Importation et exportation des spiritueux.

CHAP. XIV. — FRAUDES DES EAUX-DE-VIE ET LIQUEURS : Fraudes sur la nature des eaux-de-vie. — Fraudes sur le degré alcoolique. — Fraudes sur les liqueurs. — Fraudes sur les sirops. — Fraudes sur les eaux distillées.

CHAP. XV. — LES EAUX-DE-VIE ET LIQUEURS AU POINT DE VUE DE L'HYGIÈNE : Richesse alcoolique des boissons. — Classification des eaux-de-vie et liqueurs. — Action physiologique des eaux-de-vie et liqueurs. — Alcoolisme aigu et alcoolisme chronique.

CHAP. XVI. — L'ALCOOL AU POINT DE VUE LÉGISLATIF ET FISCAL : Revenus des impôts sur les boissons. — Le monopole de l'alcool. — Réformes législatives.

# Physique et Chimie viticoles

## EXTRAIT DE LA PRÉFACE

Dans cet ouvrage, l'auteur veut appuyer ses indications sur une base solide et débute par un *Exposé de quelques principes théoriques* : il ne s'attarde pas sur les notions purement chimiques, et dès son premier chapitre, commence à entretenir son lecteur des ferments qui jouent un si grand rôle dans la production du vin.

Le deuxième chapitre est consacré aux analyses agricoles ; avec le troisième, *les vignobles et le sol*, il entre dans le vif de son sujet, il discute l'immunité contre le phylloxera que procure à la vigne la plantation dans le sable ; puis l'abondance du calcaire, comme cause de la chlorose ; de l'étude des *sols*, l'auteur passe à celle des *engrais* ; il expose ensuite les notions de *météorologie*, qu'il juge utile de faire connaître.

*Les remèdes* : tel est le titre du sixième chapitre ; j'avoue que moi, homme du Nord, qui n'appartiens pas à la région de la vigne, je suis surpris que ce chapitre vi ne soit pas intitulé : *les maladies* ; mais M. de Saporta écrit à Montpellier ; il a eu depuis si longtemps les oreilles rebattues des ravages causés par ces maladies, il a une telle horreur des phrases toutes faites et des lamentations banales, qu'il ne s'est pas senti le courage de récrire un chapitre qui a été écrit déjà plusieurs milliers de fois ; donc il suppose les maladies connues et cherche à les combattre ; il appuie notamment sur cet emploi du sulfate de fer appliqué sur les plaies de la vigne après la taille imaginée par M. Rassisguier, qui est efficace, mais dont la théorie n'est pas donnée.

La vigne a triomphé de ses ennemis, elle a mûri ses raisins, il faut faire du vin, connaître la composition des raisins, savoir le degré d'acidité qu'ils présentent, enfin suivre la fermentation. Dans notre Midi, et encore plus en Algérie, le grand ennemi de la fermentation régulière est l'élévation de la température ; aussi M. de Saporta décrit-il avec grand soin les appareils réfrigérants qui maintiennent les moûts dans des conditions favorables au travail des levures. Il indique ensuite comment on détermine la richesse en alcool du vin produit et comment on empêche les fermentations secondaires qui se déclarent souvent dans les vins peu chargés d'alcool, comme ceux que fournissent les cépages à grand rendement, qui forment presque exclusivement les vignobles du Midi.

M. de Saporta termine son ouvrage par la phrase suivante, qui indique clairement pourquoi il l'a écrit : « Autant que possible nous avons cherché à simplifier et coordonner en sacrifiant les détails et nous croyons qu'en effet l'application intelligente d'un assez petit nombre de principes généraux peut suffire au propriétaire pour éviter bien des déboires ».

On ne saurait mieux dire. La production du vin, comme toutes les industries qui mettent en œuvre les ferments, est une observation délicate, qui cesse d'être avantageuse aussitôt qu'elle est mal conduite ; un vin mal préparé ne se conserve pas, et, comme l'a écrit M. de Saporta, on n'évitera les déboires qu'en opérant régulièrement ; on y réussira en prenant pour guide *la Physique et la Chimie viticoles*.

P.-P. DEHÉRAIN,  
de l'Académie des sciences.

## TABLE DES MATIÈRES

### PRÉFACE. — AVANT-PROPOS.

CHAP. I. — EXPOSÉ DE QUELQUES PRINCIPES THÉORIQUES. — Capillarité. — Dissolutions. — Coup d'œil sur la théorie et la notation atomique. — Hydrogène. — Oxygène. — Azote. — Carbone. — Affinité chimique. — Microbes et ferments.

CHAP. II. — ANALYSES AGRICOLES. — MATÉRIELS ET MÉTHODES — Balance. — Verrerie jaugée et graduée. — Aéromètres et aérométrie. — Dosages agricoles par précipitation. — Dosages volumétriques gazeux. — Thermomètres. — Matériel d'analyse. — Réactifs.

CHAP. III. — LES VIGNOBLES ET LE SOL. — Sulfure de carbone. — Submersion. — Plantation dans les sables. — La vigne américaine. La chlorose. — Le calcaire cause de la chlorose. — Analyse mécanique et physique des terres de vignoble. — Procédés pratiques pour le dosage du calcaire. — Calcimètre de M. Bernard. — Calcimètre Trubert. — Calcimètre de M. Cléménçon. — Dosages du calcaire par le procédé Saporta. — Assimilabilité du calcaire. — Mesure de l'assimilabilité du calcaire par l'attaque aux acides faibles. — Magnésie et humus.

CHAP. IV. — LES ENGRAIS. — Exigences de la vigne. — La potasse dans le sol des vignobles. — Engrais chimiques à base de potasse. — L'acide phosphorique dans le sol des vignobles. — Engrais phosphatés. Analyse. — Dosages volumétriques de l'acide phosphorique. — L'azote dans le sol des vignobles. — Engrais azotés. — Analyse volumétrique de l'azote. — Engrais complets. Applications. Analyses.

CHAP. V. — MÉTÉOROLOGIE VITICOLE. — Baromètres. — Girouettes. — Thermométrie. — Hygrométrie. — Gelées.

CHAP. VI. — LES REMÈDES. — Remèdes internes. Sulfure de carbone. — Chlorose et sulfate de fer. — Procédé Rastignac. — Remèdes externes anticryptogamiques. Soufre. — Cuivre, mildew et black-rot. — Sulfate de cuivre. Bouillies. Verdet. — Sels de mercure. — Anthracnose. Traitements d'hiver et d'été. — Lutte contre les insectes. Échaudage. — Substances insecticides.

CHAP. VII. — LA VINIFICATION. — Constitution du raisin. — Principe sucré du raisin. — Étude de la richesse saccharine des moûts. — Méthode volumétrique gazeuse. — Distribution du sucre dans le raisin. — Distribution de l'acidité dans le raisin. — Fermentation alcoolique des liqueurs sucrées. — Produits accessoires de la fermentation. — Les levures. — Influence de la température sur la fermentation. — Influence de l'aération. — Influence de l'acidité. — Composition du vin jeune. — Egrappage. Vinification en blanc. — Avantages de la vinification en blanc. — Mutage à l'alcool. — Fermentation par les levures étrangères. — Épuisement des mares. Piquettes.

CHAP. VIII. — LE VIN. — Degré. Sa définition dans les mélanges d'eau et d'alcool. — Mesure du degré par la densité. Alcomètre légal. — Précautions et corrections spéciales à la lecture des alcomètres. — Pesée des vins aux alambics Salleron. — Appareil simplifié Trubert. — Autres principes pour doser l'alcool dans les vins. — Réfringence. Pouvoir capillaire. — Dosage de l'alcool dans les vins par la méthode ébullioscopique. Appareil Mallingand. Appareil Salleron-Dujardin. — Acidité des vins. — Extrait sec des vins. — Caractères et conditions de stabilité du vin. — Pasteurisation des vins. — Maladies des vins. — Distillation des vins. Alambics. — Analyse des lies sèches et des tartres. — Transformation des vins en vinaigre.

(1 vol., 270 p.)  
Cart. toile anglaise.

PRIX : 5 francs.

Dr Georges TREILLE

Ancien professeur d'hygiène navale et de pathologie exotique  
aux Écoles de plein exercice de la Marine,  
Inspecteur général en retraite du Service de Santé  
des colonies.

# *Principes d'Hygiène coloniale*

---

## EXTRAIT DE LA PRÉFACE

En écrivant les *Principes d'hygiène coloniale*, l'auteur a eu surtout en vue de tracer les règles générales qui paraissent les plus propres à faciliter aux Européens leur établissement dans les pays chauds.

Ce livre s'adresse donc plus particulièrement à ceux qui veulent connaître les conditions physiques de cet établissement et par là se faire une opinion qui leur serve de guide dans l'appréciation des entreprises coloniales auxquelles ils désirent se livrer.

Mais il s'adresse encore à ceux qui, sans participer personnellement à ces entreprises, entendent exercer leurs droits de citoyens à l'égard de la chose publique, et en s'inspirant de l'intérêt national, peser de leur influence sur la direction des affaires coloniales. Car l'expansion de l'Europe dans les pays tropicaux, à laquelle la France a pris une part si étendue, impose à chacun de nous des devoirs nouveaux à remplir.

Chacun, en effet, pour une part quelconque et si minime soit-elle, est intéressé aujourd'hui à suivre, à contrôler la politique coloniale, et doit puiser les principes directeurs de son jugement à toutes les sources utiles.

Encore que l'Hygiène ait, dans ces dernières années, conquis une large influence dans la sociologie européenne en raison des services qu'elle a rendus et qu'elle est appelée à rendre de plus en plus à la masse des populations, il ne serait pas tout à fait exact de mesurer à ce progrès la part d'influence qui doit revenir à l'Hygiène tropicale dans la sociologie coloniale.

Ici, le rôle de l'Hygiène, — Science générale, Science de tous, — doit être mis en place éminente, car, sans elle, rien de durable ne peut être fondé dans les colonies.

Sans l'Hygiène pratiquée dans la vie privée comme dans l'adminis-

tration publique, étendue aux personnes comme aux choses dans tout ce qui concerne l'individu aussi bien que le groupement collectif, nulle sécurité sous les tropiques.

La santé de l'Européen dans ces régions est exposée à tant d'aléas, que la sûreté des capitaux engagés dans les entreprises dont il a la charge en est elle-même incertaine. Qu'un chef de maison de commerce, qu'un chef d'exploitation agricole, entre les mains desquels reposent des intérêts primordiaux, vienne à tomber gravement malade ou à disparaître brusquement, ce peut être la ruine; c'est, à coup sûr, un trouble sérieux dans la marche des affaires. Il faut donc que l'Européen qui se fixe dans les pays chauds s'instruise des risques qu'il est exposé à y courir, et qu'en toute connaissance de leurs causes il s'entoure des moyens les plus propres à s'en garantir.

Le personnel que nos colonies tropicales attendent, — le personnel vivifiant par excellence, — c'est le négociant, l'industriel, l'agriculteur. Mais à quelque point de vue qu'on se place, l'établissement de l'Européen aux pays chauds, surtout dans le territoire de l'Afrique intertropicale, ne peut avoir des chances de succès que dans des conditions déterminées.

Ce livre a précisément pour but l'étude de ces conditions. Je me suis inspiré, pour le faire, d'abord d'une expérience personnelle déjà longue et que j'ai acquise en visitant les colonies d'Asie, d'Afrique et d'Amérique à diverses époques de ma carrière; et aussi de l'enseignement de la pathologie et de l'hygiène tropicales que j'ai pratiqué comme professeur aux anciennes écoles de plein exercice de la marine.

---

## TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE. — Du climat des tropiques en général.

DEUXIÈME PARTIE. — Action du climat intertropical sur les diverses fonctions de l'organisme : respiration, circulation, digestion, sécrétions (sueur, bile, urine); influences pathogéniques.

TROISIÈME PARTIE. — Conditions sanitaires des climats régionaux. — Climats régionaux types : Indo-Chine (Tonkin, Annam, Cochinchine, Cambodge); Afrique (Soudan, Côte d'Ivoire, Guinée, Dahomey, Congo, Madagascar); causes et influences pathogéniques.

QUATRIÈME PARTIE. — Règles d'hygiène privée et publique; habitation; emplacement; construction; distribution; hygiène domestique. — Alimentation en général; influence pathogène de l'alcool. — Aliments tirés du règne animal. — Aliments tirés du règne végétal.

CINQUIÈME PARTIE. — Régime de vie. — Caractère et avenir de la colonisation.

Georges *CARRÉ* et C. *NAUD*, Éditeurs, 3, rue Racine, Paris. 41

---

(1. vol. de 232 pages.)  
Cartonnage toile anglaise.

Prix : 5 francs.

**D<sup>r</sup> H. TRIBOULET**,  
Médecin des Hôpitaux,

et

**D<sup>r</sup> Félix MATHIEU**,  
Médecin des Bureaux de Bienfaisance.

# *L'Alcool* *et l'Alcoolisme*

Notions générales

Toxicologie et physiologie — Pathologie — Thérapeutique  
Prophylaxie.

Ce livre n'a d'autre prétention que d'être un compendium à l'usage des gens instruits qu'intéresse la question, brûlante pour tous, de l'alcoolisme.

Les auteurs ont donné quelque relief à certains côtés du sujet négligés ailleurs, tels que l'histoire de l'alcool, la fabrication des boissons alcooliques dans ses rapports avec l'intoxication, la toxicologie, la physiologie générale.

Ils ont, autant que possible, évité les raisons de sentiment, les opinions tendancieuses appuyées sur des statistiques sujettes à caution et les controverses de tout ordre, celles d'ordre extramédical, en particulier, pour ne s'attacher qu'aux faits.

Il leur eût été facile d'étendre la partie médicale; mais ils ont cru devoir se limiter. C'est ainsi que tout ce qui concerne les rapports de l'alcoolisme avec la pathologie mentale a été réservé, cela devant faire l'objet d'un travail à part. Toutefois, certains chapitres de l'exposé pathologique ont été présentés avec assez de détails pour que le lecteur, désireux d'approfondir, pût se passer du secours de traités spéciaux.

Puisse cet ouvrage être un guide de quelque utilité à ceux qui veulent pratiquer et prêcher la tempérance en connaissance de cause !

## TABLE DES MATIÈRES

CHAP. I. — NOTIONS GÉNÉRALES. — 1. **Les alcools.** Histoire du mot alcool. Définition des alcools dits d'alimentation. — 2. **Les Boissons alcooliques.** a) *Boissons fermentées* : bière, vin, cidre; b) *Boissons distillées* : alcools de consommation, eaux-de-vie. *Les impuretés des alcools et eaux-de-vie. Prophylaxie industrielle. Liqueurs. Vins aromatisés. Liqueurs sucrées. Fruits à l'eau-de-vie. Apéritifs* : Bitters et amers, absinthes.

CHAP. II. — TOXICOLOGIE DES ALCOOLS, DES AROMES ET DES BOISSONS EN GÉNÉRAL. — 2. **Intoxication aiguë.** Alcool éthylique. Alcools divers (méthyllique et supérieurs). *Impuretés. Furfurol. Aldéhyde. Alcools de consommation.* — 2. **Intoxication chronique.** — 3. **Toxicologie des boissons alcooliques aromatisées et des aromates.**

CHAP. III. — PHYSIOLOGIE DE L'ALCOOL ET DES BOISSONS ALCOOLIQUES. — 1. **Préambule.** Boissons fermentées. Boissons distillées. *L'alcool est-il un aliment?* — 2. **Physiologie générale de l'alcool éthylique.** A. Action générale de l'alcool sur les tissus vivants. B. Conditions qui font varier l'activité du toxique. — 3. **Physiologie de l'intoxication aiguë** : 1° Voies digestives : *estomac, intestin*; foie. 2° Système circulatoire : *sang*; *circulation*. 3° Respiration. 4° Excrétion. 5° Échanges organiques. 6° Système nerveux. — 4. **Appendice.**

CHAP. IV. — PATHOLOGIE. — 1. **Généralités sur les lésions par intoxication alcoolique.** Anatomie pathologique. Tube digestif. Glandes annexes, foie. Reins. Système circulatoire. Voies respiratoires. Système nerveux. Nerfs. — 2. **Étude clinique de l'Alcoolisme.** Alcoolisme aigu. *Alcoolisme chronique.* A. *Comment se prépare l'alcoolisme chronique?* Étiologie. B. *Comment se traduit l'alcoolisme chronique?* Symptomatologie : 1° Tube digestif. Glandes annexes : Cirrhose hyperthrophique. Cirrhose atrophique. Cirrhose de Laënnec. 2° Système nerveux. Troubles de la sensibilité. Troubles de la motilité. Moelle et nerf périphériques : a) Paralyse des membres inférieurs, pseudo-tabes alcooliques; b) Paralyse alcoolique généralisée. Déterminations oculaires de l'alcoolisme. Système nerveux central. Névroses. 3° Appareil circulatoire. 4° Appareil respiratoire. 5° Système génito-urinaire. 6° Nutrition et santé générale. La fin des alcooliques. *Appendice clinique* (variétés cliniques suivant l'agent toxique). 1° **Cénilisme.** 2° **Absinthisme.** Alcoolisme et absinthisme héréditaires. — 3. **Thérapeutique.** 1° *Pharmaceutique.* 2° *Morale* (générale et spéciale).

CHAP. V. — DÉMOGRAPHIE DE LA CONSOMMATION.

CHAP. VI. — PROPHYLAXIE DE L'ALCOOLISME. — 1. **Législation pénale.** — 2. **Législation civile.** — 3. **Législation spéciale** : 1° Surtaxes; Dégrevement des boissons fermentées; 3° Limitation du nombre de cabarets; 4° Suppression du privilège des bouilleurs de cru; 5° Monopole de l'État; 6° Système français; 7° Monopole des Sociétés, a) système de Goteborg, b) système de Bergen; 8° Prohibition nationale ou locale (système américain). — 4° **Initiative privée** : a) Sociétés de tempérance et d'abstinence; b) Protection et éducation de l'enfance; c) Propagande dans l'armée; d) Amélioration des salaires, du logement et de la nourriture; e) Rôle du médecin. **Conclusions.**

(1 vol., 250 p., 70 fig.)  
Cartonnage toile anglaise.  
Prix : 5 francs.

**P. TRUCHOT**  
Ingénieur-chimiste.

# *L'Éclairage* *à incandescence* par le gaz et les liquides gazéifiés

Rien n'avait été écrit jusqu'à ce jour relativement aux progrès réalisés durant ces dernières années par l'éclairage à incandescence. L'ouvrage de M. P. Truchot comble cette lacune en abordant la question au double point de vue théorique et pratique. Il est essentiel, en effet, de ne pas séparer l'interprétation des phénomènes de leurs applications, surtout lorsqu'il s'agit de faits récents qui, dans l'espèce, sont les industries nées de l'exploitation des terres rares. La vive concurrence suscitée par l'apparition des procédés d'éclairage intensifs : Électricité, Manchons à base d'oxydes rares, Acétylène, place cet ouvrage au premier rang des actualités de la Science appliquée. — L'industriel, le technicien et, en général, tous ceux dont les travaux apportent une contribution nouvelle aux perfectionnements de l'éclairage moderne, trouveront dans ce livre les documents les plus précieux, comme on peut s'en rendre compte en parcourant la table des matières ci-dessous résumée.

On sait que la question de l'éclairage a pris un essor considérable depuis quelques années ; aussi le volume de M. Truchot peut-il rendre service à beaucoup de personnes en mettant sous les yeux une foule de renseignements qui sont généralement disséminés dans des publications spéciales.

(*Journal des Usines à gaz*).

## TABLE DES MATIÈRES

CHAP. I. — THÉORIE DE LA LUMIÈRE PAR INCANDESCENCE. — PHOTOMÉTRIE. — GRANDEURS ET UNITÉS PHOTOMÉTRIQUES : Production de la lumière par incandescence. — Définition et propriétés de la lumière. — Intensité des différentes couleurs. — Photométrie. — Grandeurs et unités photométriques. — Unités de lumière. — Étalons absolus. — Étalons secondaires. — Unités photométriques. — Éclairement. — Éclat d'un foyer lumineux. — Éclairage. — Effet utile d'un foyer lumineux. — Rendement photogénique d'un foyer lumineux. — Les hautes températures et l'incandescence.

CHAP. II. — HISTORIQUE DE L'ÉCLAIRAGE A INCANDESCENCE PAR LE GAZ ET LES LIQUIDES GAZÉIFIÉS : Description des différents systèmes d'incandescence.

— Procédés anciens Frankenstein, Robert Werner, Galafer et Villy, Lumière Drummond, Chalumeaux, Becs, Sellon, Clamond. — Procédés modernes : — Auer Von Welsbach, Otto-Fehnenjehlm, Ludwig Haitinger, Barrière.

CHAP. III. — MINÉRAUX EMPLOYÉS DANS LA FABRICATION DES MANCHONS INCANDESCENTS : Cérite. — Gadolinite. — Thorite. — Monazite et sables monazités. — Xénotime. — Zircon.

CHAP. IV. — LES CORPS INCANDESCENTS : 1° Corps incandescents à base de métaux et d'alliages métalliques. 2° Corps incandescents à base d'oxydes réfractaires. — 1<sup>re</sup> classe : Corps incandescents obtenus par moulage. — 2<sup>e</sup> classe : Corps incandescents obtenus par imprégnation de tissus de fibres organiques. — 3<sup>e</sup> classe : Corps incandescents obtenus par filage. — Pouvoir éclairant des manchons incandescents. — Coloration de la lumière émise par les manchons.

CHAP. V. — DESCRIPTION DES DIVERS BRÛLEURS MODERNES A INCANDESCENCE. — Incandescence par le gaz de houille, le gaz d'eau, etc. — Description et propriétés d'un brûleur Bunsen. — Bunsen Lecomte. — Brûleurs et becs ordinaires. — 1<sup>re</sup> classe : Brûleurs utilisant le bec rond. — 2<sup>e</sup> classe : Brûleurs utilisant le bec papillon. — 3<sup>e</sup> classe : Becs intensifs. — Théorie des becs intensifs. — Brûleurs Bandsept. — Bunsen à gaz chaud Bandsept. — Brûleurs Denayrouse. — Brûleur Lecomte. — Brûleur Saint-Paul. — Éclairage à incandescence par le gaz.

CHAP. VI. — RÉGULATEURS DE PRESSION. — RHÉOMÈTRES. — MANOMÈTRES.

CHAP. VII. — ALLUMAGE DES BECS A INCANDESCENCE.

CHAP. VIII. — INCANDESCENCE PAR LE PÉTROLE ET L'ESSENCE DE PÉTROLE.

CHAP. IX. — INCANDESCENCE PAR L'ALCOOL ET PAR L'ACÉTYLÈNE.

CHAP. X. — APPLICATIONS DE L'ÉCLAIRAGE A INCANDESCENCE PAR LE GAZ ET LES LIQUIDES GAZÉIFIÉS.

CHAP. XI. — CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES.

CHAP. XII. — BREVETS FRANÇAIS CONCERNANT L'ÉCLAIRAGE A INCANDESCENCE PAR LE GAZ ET LES LIQUIDES GAZÉIFIÉS.

---

(1 vol., 315 p., 6 fig.)  
Cartonnage toile anglaise.  
PAIX : 5 francs.

P. TRUCHOT  
Ingénieur-chimiste.

# Les Terres rares

## Minéralogie, Propriétés, Analyse

Cet ouvrage fixe le détail des connaissances physiques et chimiques que l'on possède actuellement sur les métaux des terres rares. Leurs applications à l'éclairage et le grand nombre de documents qu'elles fournissent à l'analyse en font un sujet d'une puissante actualité scientifique.

En résumé, cet ouvrage est utile aux chimistes et à tous ceux qu'intéressent les découvertes récentes et les travaux remarquables de MM. Delafontaine, Etard, Lebeau, Langfeld, Moissan, Urbain, etc., sur ce point de la chimie moderne où se spécialisent chaque jour de nouvelles et fécondes industries.

---

« Voici un livre qui paraît à son heure et qui sera lu certainement avec un vif intérêt par toutes les personnes qui suivent attentivement les progrès de l'éclairage à incandescence, et qui désirent se rendre compte des avantages qu'on peut en retirer. Il n'existait encore en France ni à l'étranger, aucun ouvrage complet écrit sur cette matière dont l'actualité, pourtant si manifeste, mérite d'exciter sérieusement l'activité des inventeurs et des praticiens. Les seuls renseignements qu'on possédait étaient épars dans des mémoires lus devant des Sociétés techniques, ou dans des articles de journaux et — disons-le — surtout des journaux allemands ou anglais. Nous constatons avec satisfaction que le premier livre écrit sur l'incandescence et les terres rares qui en sont la base est l'œuvre d'un Français qui a su, dans ce domaine spécial, se faire une notoriété incontestable ».

(*Le Gaz*, 15 mai 1899).

---

### TABLE DES MATIÈRES

#### PREMIÈRE PARTIE. — Minéralogie.

- I. — TABLEAU MINÉRALOGIQUE DES MINÉRAUX DES TERRES RARES.  
II. — DESCRIPTION DES MINÉRAUX DES TERRES RARES : Aeschynite. — Cérîte. — Émeraude. — Beryl. — Aigue-marine. — Eucolyte. — Fergusonite. — Euxénite. — Gadolinite. — Monazite. — Sables monazités. — Mosandrite. — Orthrite. — Samarskite. — Thorite. — Xénotime. — Zircon. — Situation géographique des principaux gisements.

#### DEUXIÈME PARTIE. — Chimie générale.

- I. — TABLEAU DES CONSTANTES PHYSIQUES DES MÉTAUX RARES.  
II. — MÉTAUX DIATOMIQUES : *Glucinium* : Historique. — Sels à radicaux halogénés. — Sels à radicaux oxygénés. — Sels à radicaux organiques.

III. — MÉTAUX TRIATOMIQUES : Groupe cérique. — *Cérium* : Historique. — Etat naturel. — Sels céreux. — Sels à radicaux halogénés. — Sels à radicaux oxygénés. — Sels cériques. — Sels céreux à radicaux organiques. — *Lanthane* : Historique. — Etat naturel. — Sels à radicaux halogénés. — Sels à radicaux oxygénés. — Sels à radicaux organiques. — *Didyme* (ancien) : Historique. — Néodyme. — Praséodyme. — Sels à radicaux halogénés. — Sels à radicaux oxygénés. — Sels à radicaux organiques. — *Samarium* : Historique. — Etat naturel. — Propriétés. — Sels à radicaux halogénés. — Sels à radicaux oxygénés. — Sels à radicaux organiques. — *Decipium* : Historique. — Etat naturel. — *Gadolinium* : Historique. — Etat naturel. — Groupe Yttrique. — *Yttrium* : Historique. — Etat naturel. — Propriétés. — Sels à radicaux halogénés. — Sels à radicaux oxygénés. — Sels à radicaux organiques. — *Terbium* : Historique. — Etat naturel. — Propriétés. — *Erbium* : Historique. — Etat naturel. — Propriétés. — Sels à radicaux oxygénés. — Sels à radicaux organiques. — *Ytterbium* : Historique. — Etat naturel. — *Scandium* : Historique. — Etat naturel. — Propriétés. — Sels à radicaux halogénés. — Sels à radicaux oxygénés. — Sels à radicaux organiques. — *Thulium* : Historique. — Etat naturel. — Propriétés. — *Holmium* : Historique. — Etat naturel. — Propriétés. — *Dysprosium* : Historique. — Etat naturel. — Propriétés. — *Philippium* : Historique. — Etat naturel. — Propriétés. — Sels à radicaux oxygénés. — *Métal Σ* : Historique. — Etat naturel. — Propriétés. — *Lucium* : Historique. — Etat naturel. — Propriétés.

IV. — MÉTAUX TÉTRATOMIQUES : *Zirconium* : Historique. — Etat naturel. — Propriétés. — Sels à radicaux halogénés. — Sels à radicaux oxygénés. — Sels à radicaux organiques. — *Thorium* : Historique. — Etat naturel. — Propriétés. — Sels à radicaux halogénés. — Sels à radicaux oxygénés. — Sels à radicaux organiques. — *Germanium* : Historique. — Etat naturel. — Propriétés. — Sels à radicaux halogénés. — Sels à radicaux oxygénés. — Sels à radicaux organiques.

### TROISIÈME PARTIE. — Analyse.

I. — ANALYSE SPECTRALE. MODE OPÉRATOIRE : Spectres d'étincelle et spectres d'absorption. — Observation et identification des spectres. — Bibliographie spectroscopique. — Longueurs d'onde des raies du spectre solaire. — *Spectres d'étincelle* : 1<sup>o</sup> Groupe thorique : Thorium. — Zirconium. — 2<sup>o</sup> Groupe cérique : Cérium. — Lanthane. — Dydime. — Samarium. — 3<sup>o</sup> Groupe yttrique : Yttrium. — Erbium. — Ytterbium. — Thulium. — Scandium. — Gadolinium. — Spectres d'absorption. — Didyme (ancien). — Néodyme. — Praséodyme. — Samarium. — Erbium. — Holmium. — Dysprosium. — Thulium.

II. — MÉTHODE DE FRACTIONNEMENT DES TERRES RARES. — GÉNÉRALITÉS : Traitement de la célite. — Procédé Marignac. — Procédé Mosander. — Procédé Debray. — Procédé Auer von Welsbach. — Procédé Schultzenberger. — Procédé de Wyronboff et Verneuil. — Procédés Berzélius, Bunsen, Czudnowicz. — Procédés Mosander, Brauner, Popp. — *Traitement de la gadolinite* : Procédé Auer von Welsbach. — *Traitement de l'orthite* : Procédé Bettendorff. — *Traitement des sables monazités* : Procédé Schutzenberger et Boudouard. — Méthode Drossbach. — Procédé Dennis et Chamot. — Méthode Lecoq de Boisbaudran. — Bibliographie des méthodes de fonctionnement.

III. — RÉACTION CARACTÉRISTIQUE DES SELS : Glucinium. — Zirconium. — Thorium. — Germanium. — Cérium. — Lanthane. — Didyme. — Scandium. — Yttrium.

IV. — Dosage et séparation du glucinium. — Dosage et séparation du zirconium. — Dosage et séparation du thorium. — Dosage et séparation du germanium. — Dosage et séparation du cérium. — Dosage et séparation du lanthane. — Dosage et séparation du didyme. — Dosage et séparation de l'yttrium.

V. — ANALYSES SPÉCIALES : Analyse des sables monazités. — Analyse des nitrates de thorium commerciaux. — Méthode Drossbach. — Méthode de l'oxyde de thorium, dans les sables monazités. — Méthode Denuis. — Méthode Glasser.

(1 vol., 272 p., 45 fig.)  
Cartonnage toile anglaise.  
PRIX : 5 francs.

Commandant VALLIER

# *L'Artillerie*

## Matériel — Organisation

France, Allemagne, Angleterre, Autriche-Hongrie, Italie,  
Espagne, Russie, Turquie, États-Unis, Japon, etc.

Le livre du commandant Vallier est la mise au point documentée et précise de l'état actuel de l'Artillerie des puissances européennes. Les États-Unis et le Japon figurent également dans cette étude, tant à cause des événements militaires récents qui ont révélé les armements de ces puissances, que du rôle actif qu'elles se préparent à jouer dans les règlements qui sont à l'ordre du jour des chancelleries. La partie principale du volume est entièrement consacrée à l'examen critique de l'Artillerie des diverses puissances, que renforcent de nombreux tableaux comparatifs. Les figures, toutes inédites, mettent sous les yeux du lecteur des documents entièrement nouveaux. Ce livre n'est pas un inventaire des progrès de l'Artillerie, ce n'est pas davantage une thèse sur ce qu'elle devrait être ; — c'est exactement un état de ce qu'elle est. A ce titre, il s'adresse à tous ceux qui s'intéressent aux graves questions de la défense nationale. Le texte, que n'encombre pas une terminologie fatigante, est d'une lecture aisée pour tous, et nous croyons que nulle part encore on n'a présenté sous une forme aussi attachante une question d'un intérêt général aussi puissant.

*(Revue du Cercle militaire, janvier 1899).*

L'auteur consacre un quart environ du volume à des généralités sur la bouche à feu, la poudre, le projectile, l'affût. Cela fait, il traite en détail de l'organisation actuelle, au point de vue tant du personnel que du matériel, de l'Artillerie de chacune des puissances : France, Allemagne, Angleterre, Autriche-Hongrie, Italie, Russie, Belgique, Danemark, Suède et Norvège, Espagne, Hollande, Portugal, Suisse, Bulgarie, Roumanie, Serbie, Grèce, Turquie, États-Unis, Japon.

Bien que le livre ne renferme aucune indiscretion sur les mystérieux canons en cours de fabrication de divers côtés, il peut être considéré comme un inventaire de l'état des artilleries à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle.

## TABLE DES MATIÈRES

### PREMIÈRE PARTIE. — Généralités sur l'artillerie.

I. — BOUCHE À FEU : Du métal à canon. — Des canons rayés. — De la fermeture de culasse, fermeture à piston, fermeture à coin, fermeture à vis excentrée. — De l'obturateur. — Du frettage.

II. — AFFÛT : Du recul. — Affûts spéciaux.

III. — POUDRES : Poudres sans fumée.

IV. — PROJECTILES : Bombes et obus. — Organisation du projectile au point de vue des effets à produire. — Projectiles destinés à agir contre les troupes ou de dispersion : obus ordinaire, obus à fragmentation systématique, obus à couronnes, obus à couronnes de balles, obus à mitraille, obus à balles proprement dit ou shrapnel, boîte à mitraille, obus brisant. — Projectiles de destruction. — Projectiles de rupture. — Fusées : fusées percutantes, fusées à double effet.

QUALITÉS NÉCESSAIRES AUX DIVERSES ARTILLERIES : Artillerie de campagne. — Artillerie de montagne. — Artillerie de siège. — Artillerie de place. — Artillerie de côte. — Artillerie de bord.

NOTIONS SUR LE TIR : Définitions préliminaires : Ligne de tir, vitesse initiale, vitesse restante, ligne de mire, angle de tir, angle de chute, plan de tir, dérivation, dérive, zones dangereuses, influence de la forme du terrain. — Tir de plein fouet avec pointage direct des batteries de siège, de place et de côte. — Tir à démonter. — Tir en brèche : exécution des brèches par le tir direct, tir en brèche à grandes distances. — Tir de rupture. — Tir direct de l'artillerie de place. — Tir indirect. — Tir plongeant : emploi du tir plongeant par l'artillerie de siège ; emploi du tir plongeant par l'artillerie de place. — Tir vertical, pointage de mortiers.

EMPLOI DE L'ARTILLERIE DE CAMPAGNE : 1° L'artillerie dans le combat offensif : choix des positions d'artillerie, conduite du feu. — Rôle de l'artillerie dans la seconde période de préparation : conduite de l'artillerie au moment de l'assaut. — 2° L'artillerie dans le combat défensif : L'artillerie doit garder en réserve une partie de ses pièces. — Avantage de la défense dans le choix des positions d'artillerie. — Conduite du feu. — Passage à l'offensive ou retraite. — Remarque.

### DEUXIÈME PARTIE. — Artillerie des diverses puissances.

**France.** — I. — ORGANISATION ET SERVICES TECHNIQUES : Etablissements de l'artillerie. — Ecoles d'artillerie. — Cours pratiques de tir. — Recrutement des officiers : Ecole polytechnique, Ecole d'application, Ecole militaire de l'artillerie, du génie et du train à Versailles. — De l'artillerie de la marine.

II. — TROUPES : Organisation de l'artillerie de campagne. — Composition de l'artillerie d'un corps d'armées mobilisé : batteries, sections et munitions, parcs d'artillerie. — Artillerie à pied : batteries à pied, compagnies d'ouvriers, compagnie d'artificiers. — Equipages de siège. — Artillerie de montagne. — Résumé et conclusion.

III. — MATÉRIEL : Matériel de 90 et 80 de campagne : canon, affût, avant-train, munitions, projectiles et gargousses, obus à mitraille, obus allongé, boîte à mitraille, gargousse, étouille, canon de 120 court de campagne, shrapnel spécial du canon de 120 court. — Matériel de montagne : canon de 80 millimètres, modèle 1878. — Matériel de siège et de place : canon de 95 millimètres, canons de 120 millimètres, modèle 1878, canon de 155 long, modèle 1877, canon de 220 millimètres, mortier rayé ou canon court de 155, modèle 1882, mortier rayé de 220 millimètres, mortier rayé de 270 millimètres. — Matériel de place : bouches à feu des équipages de siège, bouches à feu de petit calibre affectées à la défense des places. — Matériel de côte : canon de 24 centimètres en fonte, modèle 1876, canon de 240 millimètres en acier. — Bouches à feu de la marine : matériel modèle 1881, artillerie, modèle 1887, artillerie, modèle 1891, artillerie, modèle 1893, affûts. — Note sur les poudres françaises.

IV. — LES USINES FRANÇAISES : Forges et chantiers de la Méditerranée. — Usines du Creusot (Schneider et C<sup>ie</sup>). — Société Nordenfolt. — Etablissements Hotchkiss : canons-revolvers, canons à tir rapide Hotchkiss.

**Allemagne.** — I. GÉNÉRALITÉS. — II. TROUPES : Recrutement des officiers. — Régiments. — Artillerie à pied. — III. MATÉRIEL : 1. Matériel de campagne. — 2. Matériel léger de siège : canon de 12 centimètres, obusier de 15 centimètres, mortier de 21 centimètres. — 3. Matériel de place. — 4. Artillerie de côte et de bord. — IV. USINE KRUPP : Artillerie Krupp C/80. — Artillerie C/87, C/88, C/89. — Artillerie à tir rapide de campagne. — Tableaux relatifs au matériel Krupp. — Canon de 75 millimètres L 28 C/95 (Krupp) : 1<sup>o</sup> le coin ; 2<sup>o</sup> la plaque d'appui ; 3<sup>o</sup> la vis de fermeture ; 4<sup>o</sup> la manivelle avec clavette et goupille ; 5<sup>o</sup> l'éjecteur ; 6<sup>o</sup> le percuteur avec son ressort. Affût. — Munitions.

**Angleterre.** — I. GÉNÉRALITÉS. — II. TROUPES. — III. MATÉRIEL : Matériel de campagne. — Construction du matériel. — IV. USINES ANGLAISES : Etablissements Armstrong. — Etablissements Maxim Nordenfolt à Erith : canon à tir rapide de 75 millimètres, Mitrailleuses Maxim.

**Autriche-Hongrie.** — I. ORGANISATION : Etablissements. — II. TROUPES : Artillerie de campagne. — Artillerie de forteresse. — Artillerie technique. — III. MATÉRIEL : Matériel de campagne. — Matériel de siège. — Matériel de place. — Matériel de côte et de bord.

**Italie.** — I. ORGANISATION GÉNÉRALE ET SERVICES TECHNIQUES : Services centraux. — Commandements de l'artillerie. — Etablissements d'instruction : corps d'instruction, académie militaire, école d'application de l'artillerie et du génie, école des sous-officiers. — Etablissements de construction : employés de l'artillerie, gardes d'artillerie, chefs techniques de l'artillerie et du génie, compagnies d'ouvriers, compagnies d'artificiers, compagnies d'armuriers. — II. TROUPES : Artillerie de campagne. — Artillerie de forteresse. — III. MATÉRIEL : Matériel de campagne. — Matériel de siège, de place et de côte. — Matériel de bord.

**Russie.** — I. ORGANISATION GÉNÉRALE ET SERVICES TECHNIQUES : Grand-maitre de l'artillerie. — Direction générale de l'artillerie au Ministère de la guerre. — Comité de l'artillerie. — Directions d'artillerie des circonscriptions. — Ecoles d'officiers : école d'artillerie Michel et Constantin, académie d'artillerie Michel. — Etablissements de l'artillerie : établissements de construction, dépôts d'artillerie. — II. TROUPES : Artillerie de campagne : Troupes de réserve. — Artillerie de forteresse. — III. MATÉRIEL : Mode de construction. — Matériel de campagne actuel : nouvel affût de campagne, nouvel affût à bêche de crosse. — Matériel de siège et de place. — Matériel de côte et de bord.

**Belgique.** — I. ORGANISATION : Etablissements. — Écoles. — II. TROUPES. — III. MATÉRIEL.

**États scandinaves : Danemark.** — I. ORGANISATION ET TROUPES : État-major. — Artillerie technique. — Ecoles. — Artillerie de campagne. — Artillerie de forteresse. — II. MATÉRIEL.

**Suède et Norvège.** — I. ORGANISATION ET TROUPES. — II. MATÉRIEL.

**Espagne.** — I. ORGANISATION : Service de l'artillerie dans les places. — II. TROUPES. — III. MATÉRIEL.

**Hollande.**

**Portugal.** — I. ORGANISATION. — II. TROUPES. — III. MATÉRIEL.

**Suisse.** — I. ORGANISATION : Commandements de l'artillerie. — Etablissements. — Officiers. — II. TROUPES. — III. MATÉRIEL.

**Puissance des Balkans : Bulgarie. — Roumanie. — Serbie.**

**Royaume de Grèce.**

**Turquie.** — I. ORGANISATION : Grande maîtrise de l'artillerie. — II. TROUPES. — III. MATÉRIEL.

**États-Unis.** — I. SERVICES TECHNIQUES. — II. TROUPES. — III. MATÉRIEL : Canons pneumatiques.

**Japon.** — ORGANISATION ET MATÉRIEL.

**Tableaux numériques.**

## TABLE ALPHABÉTIQUE

---

BOYER (J.). — Histoire des Mathématiques.....	3
BRILLIÉ (H.). — Torpilles et Torpilleurs.....	5
BUSQUET (P.). — Les Êtres vivants (Organisation. Évolution).....	7
COLSON (R.). — La Plaque photographique.....	9
DUGAST (J.). — La Vinification dans les pays chauds.....	11
GIBBS (W.). — Équilibre des Systèmes chimiques.....	13
HÉBERT (A.). — La Technique des Rayons X.....	15
HOLLARD (A.). — La Théorie des Ions et l'Électrolyse.....	17
HOMMEL (R.). — L'Apiculture par les méthodes simples.....	19
LABBÉ (A.). — La Cytologie expérimentale.....	21
LAISANT (C.-A.). — La Mathématique (Philosophie. Enseignement).....	23
LE CHATELIER (H.). — Mesure des Températures élevées.....	25
MAUPIN (G.). — Opinions et Curiosités touchant la Mathématique.....	27
PAGÈS (C.). — Les Méthodes pratiques en Zootechnie.....	29
PELLISSIER (G.). — L'Éclairage à l'Acétylène.....	31
RAMSAY (W.). — Les Gaz de l'atmosphère.....	33
ROCQUES (X.). — Les Eaux-de-vie et liqueurs.....	35
SAPORTA (A. de). — Physique et Chimie viticoles.....	37
TREILLE (G.). — Principes d'Hygiène coloniale.....	39
TRIBOULET (H.) et MATHIEU (F.). — L'Alcool et l'Alcoolisme.....	41
TRUCHOT (P.). — L'Éclairage à incandescence.....	43
— Les Terres rares.....	45
VALLIER. — L'Artillerie (matériel, organisation).....	47

---

# SCIENTIA

Exposé et Développement des Questions scientifiques  
à l'ordre du jour.

RECUEIL PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION  
de MM.

APPELL, CORNU, D'ARSONVAL, HALLER, LIPPMANN, MOISSAN, POINCARÉ, POTIER  
Membres de l'Institut.

POUR LA PARTIE PHYSICO-MATHÉMATIQUE

ET SOUS LA DIRECTION  
de MM.

D'ARSONVAL, FILHOL, FOUQUÉ, GAUDRY, GUIGNARD, MAREL, Membres de l'Institut,  
F. HENNEGUY, Professeur au Collège de France,

POUR LA PARTIE BIOLOGIQUE

---

Chaque fascicule comprend de 80 à 100 pages in-8° écu, avec cartonnage spécial.

Prix du fascicule : 2 francs.

On peut souscrire à une série de 6 fascicules (*Série Physico-mathématique*  
ou *Série Biologique*) au prix de 10 francs.

---

## Fascicules parus.

### Série Biologique.


ARTHUS (M.). *La coagulation du sang.*  
BARD (L.). *La spécificité cellulaire.*  
BOHN (G.). *L'Évolution du pigment.*  
BONNIER (P.). *L'Orientalisme.*  
BORDIER (H.). *Les actions moléculaires  
dans l'organisme.*  
COURTAGE. *L'irritabilité dans la série  
animale.*  
FRENKEL (H.). *Les fonctions rénales.*  
GRIFFON. *L'Assimilation chlorophyl-  
lienne et la structure des plantes.*  
LE DANTEG (F.). *La Sexualité.*  
MARTEL (A.). *Spéologie.*  
MAZÉ (P.). *Évolution du carbone et de  
l'azote.*

### Série Physico-Mathématique.


APPELL (P.). *Les mouvements de rou-  
lement en dynamique.*  
BARBILLION (L.). *Production et emploi  
des courants alternatifs.*  
COTTON (A.). *Le phénomène de Zeeman.*  
FREUNDLER (P.). *La stéréochimie.*  
HADAMARD (JACQUES). *La Série de Tay-  
lor et son prolongement analytique.*  
LAURENT. *L'Élimination.*  
MAURAIN (CH.). *Le magnétisme du fer.*  
POINCARÉ (H.). *La théorie de Maxwell  
et les oscillations hertziennes.*  
RAOULT. *Tonométrie.*  
VILLARD. *Les Rayons cathodiques.*  
WALLERANT. *Groupements cristallins.*

·  
C  
E  
E  
I  
I  
I  
L  
L  
M  
P  
P  
R  
R  
S  
T  
T<sub>1</sub>  
T<sub>2</sub>  
·  
V<sub>A</sub>











THE  
LIBRARY OF THE  
MUSEUM OF  
COMPARATIVE ZOOLOGY  
AT HARVARD UNIVERSITY  
CAMBRIDGE, MASS.